

R. BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.

RACCOLTA
VILLAROSA

B
789

NAPOLI



Racc. Vill. B. 789

5434
STORIA
NATURALE

(10)

GENERALE, E PARTICOLARE

DEL SIGN.

DE BUFFON

INTENDENTE DEL GIARDINO DEL RE,
DELL' ACCADEMIA FRANCESE, E DI
QUELLA DELLE SCIENZE, EC.

Trasportata dal Francese.

T O M O X.



N A P O L I



MDCCLXXV.

PRESSO I FRATELLI RAIMONDI
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

1913

1913

1913

1913

INDICE

Di ciò , che si contiene in questo
Decimo Tomo.

Delle Tigri pag.1

Animali dell'antico Continente 7

Animali del nuovo Mondo 43

*Animali comuni ai due Continen-
ti* 59

La Tigre 97

*La Pantera, la Lonza, o piccola Pan-
tera, e 'l Leopardo* 116

Il Jaguar 145

Il Cugar 154

La Lince, o lupo Cerviero 159

Il Caracal 176

L' Iena 181

La Civetta, e 'l Zibetto 197

La Ginetta 220

Il

<i>Il Lupo nero</i>	223
<i>L' Ondatra, e 'l Desman</i>	225
<i>Il Pecari, e il Tajacu</i>	241
<i>Il Can-volante, il Rossotto, o sia il Can-volante dal collo rosso, e'l Vampiro</i>	249
<i>La Polatuca</i>	264
<i>Il Petit-gtis</i>	273
<i>Il Palmista, il Barbaresco, e lo Sviz- zero</i>	282
<i>Il Tamanoir, il Tamandua, e'l For- michiere</i>	289

STORIA NATURALE

DELLE TIGRI.



Essendo il nome di *tigre* un nome generico, ch'è stato applicato a molti animali di specie differenti, bisogna cominciare a distinguerli fra di loro. I leopardi, e le pantere, presi sovente, e scambiati l'un per l'altro, furono tutti e due denominati *tigri* dalla maggior parte de' Viaggiatori: la lonza, o l'onza (a), ch'è una specie di pantera, che s'addimestica facilmente, e di cui gli Orientali valgonfi per la caccia, è stata presa per la pantera, e dinotata, com'essa, col nome di *tigre*. La lince, o sia lupo-cerviero, o il provveditor del leone, che i Turchi appellano *Ka-Tom.X.* A *ta-*

(a) Questo è un nome con cui i Portoghesi corrottamente chiamano la *Lince*.

sackoulah, e i Persiani *siyahgush*, hanno pur essi avuto talora il nome di pantera, o di lonza. Tutti questi animali son ovvj in Africa, e in tutte le parti meridionali dell'Asia; ma la vera tigre, quella sola, che dee portar questo nome, è un animale raro, poco noto agli antichi, e mal descritto da' moderni. Aristotele, che in fatto di Storia Naturale è la guida di quelli, e di questi, non ne fa alcuna menzione: Plinio (a) dice solamente, che la tigre è un animale d'una velocità terribile, *tremenda velocitatis animal*, e che a' suoi tempi era assai più raro della pantera; poichè Augusto fu il primo, che presentò una tigre ai Romani in congiuntura della dedizione del teatro di Marcello, laddove fin dal tempo di Scauro, quest' Edile aveva mandate cencinquanta pantere (b), e Pompeo ne aveva in appalto fatte venir quattrocento dieci, ed Augusto quattrocento venti per gli spettacoli di Roma; ma Plinio non ci dà veruna descrizione, e neppure ci dinota alcun de' caratteri della tigre. Oppiano (c) e Solino, che hanno scritto dopo

(a) Vedi Plin. *Hist. Natural.* lib. VIII. cap. XVIII.

(b) *Idem*, *ibid.* lib. VIII. cap. XVII.

(c) Vedi Oppian. lib. I. *de Venatione*, dove di.

dopo Plinio, par che siano stati i primi a dire, che la tigre era segnata di lunghe liste, e la pantera di macchie rotonde: e questo è in fatti uno de' caratteri, che distingue la vera tigre, non solamente dalla pantera, ma da molti altri animali, che sono stati poi denominati *tigri*. Strabone (b) cita Megastene a proposito della vera tigre, e dice dopo di lui, che nell' Indie vi sono tigri una volta più grosse de' leoni: dunque la tigre è una bestia feroce, d'una velocità portentosa, col corpo segnato a lunghe strisce, e di statura più grande del leone. Ecco le sole nozioni, che gli Antichi ci han date intorno a un animale tanto considerevole: i Moderni, come Gesnero, e gli altri Naturalisti, che hanno parlato della tigre, non hanno aggiunto quasi niente al poco, che gli Antichi ne dissero.

Nella nostra lingua s'è dato il nome di *pelli di tigre*, o sia di *pelli tigrate* a tutte le pelli di pelo corto, che si son trovate variate da macchie rotonde, e divise: i Viag-

A 2 gia-

dice: *Orynges alios decorari taniis oblongis tigrum instar, alios vero rotundis, ut panthera. Tigres (ait Solinus) bestias insignes maculis notæ, & pernitas memorabiles reddiderunt: fulvo nitent: hoc fulvum nigricantibus segmentis inter undatum.*

(b) Vedi Strab. lib. XV.

giatori, attenutisi a questa falsa denominazione, hanno pur nominati *tigri* tutti gli animali di rapina, e che avessero la pelle *tigrata*, val a dire, segnata di macchie separate. I Signori dell' Accademia delle Scienze son andati a seconda del torrente, e han pur essi chiamati *tigri* gli animali di pelle tigrata, ch' eglino notomizzarono, i quali per altro sono differentissimi dalla vera tigre.

La cagione più generale degli equivoci, e delle incertezze, che si son tanto moltiplicate nella Storia Naturale, deriva come accennai nel precedente articolo, dalla necessità, in cui si fu di dar nome alle ignote produzioni del nuovo mondo. Gli animali, quantunque per la maggior parte in ispecie, ed in natura diversissimi da quei dell' antico continente, han ricevuti gli stessi nomi di quelli, ~~subito che vi fu sco-~~perta qualche relazione, o simiglianza. Erasi dapprima errato in Europa nel denominar *tigri* tutti gli animali d' Asia, e d' Africa, che avean pelle tigrata; e questo errore trasportato in America, vi si raddoppiò, mentre, essendosi trovati in quella nuova terra animali con pelle segnata di macchie rotonde, e separate, fu loro assegnato il nome di *tigri*, quantunque non fosser essi nè della specie della vera tigre, nè pur d' alcuna di quella degli animali a pelle tigrata dell' Asia, o dell' Africa, a quali erasi già

già impropriamente applicato questo nome; e siccome gli animali di pelle tigrata, che si son trovati nell'America, sono in molto gran numero, e non si è tralasciato di dare ad essi tutti il nome comune di *tigre*, benchè fossero diversissimi dalla *tigre*, e diversi pure tra loro: così trovasi, che in vece d'una sola specie, che portar dee questo nome, ve ne son nove o dieci: e che per conseguenza la storia di questi animali è imbrogliatissima, e difficilissima a comporsi, avendo i nomi confuse le cose, ed essendosi spesse volte nel far menzione di questi animali detto di alcuni ciò, che dir si dovea degli altri.

Per prevenir dunque la confusione, che risulta da queste denominazioni mal applicate alla maggior parte degli animali del nuovo Mondo, ed a quegli specialmente, che furono falsamente chiamati *tigri*, io ho pensato, che il mezzo più sicuro sia quello di fare una comparativa enumerazione degli animali quadrupedi, nella quale io distinguo, 1. quei che son naturali, e proprj all'antico continente, cioè all'Europa, all'Africa, ed all'Asia, e che non si son mica trovati in America, quando se ne fece la scoperta: 2. quei, che son naturali, e proprj al nuovo continente, e che non eran conosciuti nell'antico: 3. quei, che trovandosi egualmente in tutt'e due i continenti senz'esservi stati trasportati dagli

6 *Storia Naturale delle Tigri.*

uomini, hannosi a riguardare come comuni all'uno, e all'altro. Per far ciò, è stato necessario raccogliere, ed unire quanto si trova sparso ne' Viaggiatori, e nelle primitive storie del nuovo Mondo riguardo agli animali; e tali ricerche noi esporremo qui in succinto, non senza qualche fiducia, che sian per esser ben accolte, poichè esse ci pajono utili per l'intelligenza di tutta la Storia Naturale, e particolarmente di quella degli animali.



ANIMALI

DELL' ANTICO CONTINENTE.

GLi animali più grandi son anche i meglio conosciuti, e quelli generalmente, riguardo a' quali vi sono meno equivoci, od incertezze: quindi noi ci atterremo a questa particolarità nella presente enumerazione, indicandoli presso a poco per ordine di grandezza.

Gli elefanti appartengono all'antico continente, e non trovansi nel nuovo: i più grandi sono in Asia, in Africa i più piccioli: tutti son originarj de' climi i più caldi; e quantunque possan essi vivere nelle regioni temperate, non vi si posson però propagare: essi non fan razza nemmeno nel lor paese natio, quando son privi della libertà; pure la specie vi è molto numerosa, quantunque interamente ristretta ai soli climi meridionali dell'antico continente; e non solamente ella non si trova in America, ma quivi non si trova pure animale alcuno, che se gli possa paragonare nè per grandezza, nè per figura.

Lo stesso può dirsi del rinoceronte, la cui specie è molto men numerosa di quella dell'elefante: esso non trovasi, che nei deserti

dell' Africa, e nelle foreste dell' Asia Meridionale, nè v'è in America alcun animale, che gli somigli.

L'ippopotamo abita le spiagge de' gran fiumi dell' India, e dell' Africa: questa specie è forse anche men copiosa di quella del rinoceronte, e non si trova affatto in America, e neppure ne' climi temperati dell' antico continente.

Il cammello, e' l' dromedario, le specie de' quali, benchè vicinissime, son però differenti, e che tanto comunemente si trovano in Asia, in Arabia, e in tutte le parti Orientali dell' antico continente, erano incogniti nell' Indie occidentali, come lo son l' elefante, l' ippopotamo e' l' rinoceronte. Dunque assai impropriamente s'è dato il nome di cammello al lama (a), ed al pacos (b) del Perù, che sono d' una specie tanto diversa.

(a) *Camelus dorso levi, gibbo pectorali*. Linnaeus. *System. natur. edit. X. pag. 65.* : *Camelus pilis brevissimis vestitus*. . . *Camelus Peruanus*, il Cammello del Perù. Brisson, *Regn. animal. pag. 56.* : *Ovis Peruana*. Marcgrav. *Hist. Bras. pag. 243.*

(b) *Camelus tophis nullis, corpore lanato*. Linnaeus, *Syst. natur. edit. X. pag. 66.* : *Camelus pilis prolixis toto corpore vestitus*. La Vigogne. Brisson, *Regn. animal. pag. 57.* *Ovis Peruana pacos dicta*. Marcgrav. *Hist. Brasil. pag. 244.*

verfa da quella del cammello, che s'è creduto di poter loro dar anche il nome di *montoni*, sicchè altri gli han chiamati *cammelli*, e altri *montoni* del Perù, benchè il Pacos non abbia altro di comune col nostro montone, che la lana, ed il lama non fomigli al cammello in altro, che nella lunghezza del collo. Gli Spagnoli (a) trasportarono una volta i veri cammelli nel Perù: eglino gli avean da prima deposti nell' Isole Canarie, di dove poi li levarono per passargli in America, ma bisogna dire, che il clima di quel nuovo mondo non si confaccia loro affatto, mentre, quantunque abbian essi fatta razza in tale terra straniera, non vi si son però moltiplicati, e non vi sono stati mai, che in pochissimo numero.

La giraffa (b), o sia il *camelo-pardalis*, animale grandissimo, grossissimo, e assai ragguardevole, sì per la singolare sua forma, come per l'altezza della sua statura, per la lunghezza del collo, e delle gam-

A 5 be

(a) Vedi la Storia Naturale delle Indie, di Giuseppe Acosta, tradotta da Roberto Renaud. Parigi 1600. dalla pag. 44. fino alla pag. 208. Vedi pure la Storia degl' Incas Parigi 1744. Tom. II. pag. 266., e sequent.

(b) Giraffa, quam Arabes Zarnapa, Graeci, & Latini Camelo-pardalia nominant. Bellon. obs. pag. 118.

be davanti , non s'è ritrovato affatto in America : egli abita in Africa , e soprattutto in Eriopia , e non s'è giammai diffuso al di là dei tropici nei climi temperati dell'antico continente .

Noi abbiamo osservato nell' articolo precedente , che il leone non si trova affatto in America , e che il Puma del Perù è un animale di una specie diversa . Noi osservarem parimenti , che la tigre , e la pantera non si trovano , che nell'antico continente , e che gli animali dell' America meridionale , a' quali si son dati questi nomi , sono di specie differenti . La vera tigre , l'unica , che dee portar questo nome , è un animal terribile , e da temersi forse più del leone : la sua ferocia formidabile non ha paragone , ma della sua forza si può giudicarne dalla statura , ch'è ordinariamente di quattro a cinque piedi d'altezza , e di nove , dieci , e fin a tredici e quattordici di lunghezza , senza comprendervi la coda : la sua pelle non è già *tigrata* , cioè sparsa di macchie rotonde ; essa ha solamente sopra un fondo di pelo fulvo delle liste nere , che si stendono trasversalmente per tutto il corpo , e che formano degli anelli sulla coda per quanto è lunga : questi soli caratteri bastano per distinguerla da tutti gli animali di rapina del nuovo Mondo , i più grandi tra' quali arrivano appena alla statura de' nostri mastini , o de' nostri levrieri . Il Leopardo , e la Pantera dell' Africa , o dell'

dell' Asia non arrivan punto alla grandezza della tigre, e nondimeno sono ancor più grandi degli animali di rapina delle parti meridionali dell' America. Plinio, della cui testimonianza non si può qui dubitare, poichè le Pantere eran sì ovvie a' tempi suoi, che venivan tutt' i giorni esposte in grau numero negli spettacoli di Roma; Plinio, dico, ne indica i caratteri essenziali, così dire, che il pelo è biancastro, e che il lor mantello è da pertutto seminato (a) di macchie nere, in figura d'occhi: egli aggiugne, che la sola differenza, che passa tra il maschio, e la femmina, si è, che la femmina ha il mantello più bianco. Gli Animali d' America, ai quali si è dato il nome di Tigri, rassomigliano molto più alla Panthera, che alla Tigre; ma essi ne varian però tanto, che basta a poter chiaramente conoscere, che niun d' essi è precisamente della specie della pantera. Il primo è il jaguar, o jaguara, o janowara, che trovavasi nella Guiana, nel Brasile, e nelle al-

A 6 tre

(a) *Pantheris in candido breves macularum oculi variat... & pardos, qui mares sunt appellant in eo omni genere celeberrimo in Africa, Syrisque; quidam ab iis Pantheras candore solo discernunt, nec adhuc aliam differentiam inveni.* Plin. Hist. Nat. lib. VIII, cap. XVII.

tre parti meridionali dell' America . Ray avea con qualche ragione nominato questo animale Pardo (a) o *lince del Brasile* ; i Portoghesi l' hanno chiamato *onze*, o *lonza*, perchè essi avean precedentemente dato certamente questo nome alla lince, e di poi alla picciola pantera dell' Indie ; e i Francesi l' hanno chiamato *tigre* (b) senza verun fondamento di relazione, non avendo egli analogia alcuna con quest' animale . Egli differisce parimente dalla pantera nella grandezza del corpo, nella posizione, e nella figura delle macchie, nel colore, e nella lunghezza del pelo, ch' è riccio in gioventù, e sempre men liscio di quel della pantera : esso ne varia eziandio nel naturale, e ne' costumi, essendo più selvaggio, e non si potendo addimesticare ec. Ma queste varietà non tolgon per altro, che il *jaguar* del Brasile non somigli alla pantera più d' ogni altro animale dell' antico continente . Il secondo è quello, che noi chiameremo *coguar*, per contrazione del suo nome brasiliano *cugachara* (a), che pronunziassi *cougouacou-
ata*,

(a) *Cardus*, an *Lynx Brasiliensis*, jaguara di. *Ela*, Marcgravii . Ray, *Synops. quadrup.* pag. 166.

(b) Grossa tigre della Guiana . Desmarchais, *Tom III. pag. 299.* La tigre d' America, Briffon, *Regn. animal. pag. 270.*

ara, e che i Francesi hanno pur impropriamente chiamato *tigre rossa*: egli differisce in tutto dalla vera tigre, e molto dalla pantera, mentre ha il pelo d'un color rosso, uniforme, e senza macchie, e la testa pure di diversa struttura, col muso più allungato di quel, che l'hanno la tigre, e la pantera. Una terza specie alla quale si è parimente dato il nome di tigre, e che n'è tanto lontana, quanto lo sono tutte le precedenti, è il *jaguaretto* (b), ch'è della statura press'a poco del jaguar, e che gli somiglia pure nelle naturali inclinazioni, variandone però in alcuni caratteri esteriori: gli si è dato il nome di *tigre nera*, perchè ha il pelo nero sopra tutto il corpo, con macchie ancor più nere, che sono separate, e sparse quà, e là come quelle del jaguar. Oltre queste tre specie v'è forse anche una quarta, ch'è più picciola degli altri animali, ai quali è stato posto il nome di *tigri*, trovasi pure in America

un

(a) *Cuguacu-ara*, Pison, *Hist. Nat. Ind.* pag. 104. La tigre rossa: Barrere, *Hist. Fr. equin.* pag. 165. La tigre rossa: Brisson, *Regn. animal.* pag. 272.

(b) *Jaguarete*, Pison, *Hist. Nat. Ind.* pag. 103. — *Once*, specie di tigre, Desmarchais *Tom. III.* pag. 300. — La tigre nera, Brisson, *Regn. animal.* pag. 271.

un animale, che puossi ad esse paragonare, e che parmi sia stato meglio denominato; quest'è il gatto-pardo, che partecipa del gatto, e della pantera, e che si può più facilmente indicare con questo nome composto, che col suo nome messicano *tlacoo-sclott* (a): questo è più picciolo del jaguar, del jaguaretto, e del cugar, ma nel tempo stesso più grande d'un gatto selvatico, cui rassomiglia nella figura, con questa sola differenza, ch'egli ha la coda molto più corta e'l mantello sparso di macchie nere, lunghe sul dorso, e rotonde sotto il ventre. Il jaguar, il jaguaretto, il cugar, e'l gatto-pardo son dunque gli animali d'America, a' quali si è impropriamente dato il nome di *tigre*. Noi abbiain veduto vivo il coguar, e'l gatto-pardo, e ci siam pertanto assicurati esser ciascuno d'essi d'una specie tra loro differente, e molto più ancora da quella della tigre, e della pantera: quanto poi al puma, ed al jaguar, egli è manifesto dalle descrizioni di coloro, che gli hanno veduti, che il puma non è già un leone, nè il ja-

(a) Vedi Hernandez, *Histor. Mexiq.* pag. 512. ... Chat-pard. Storia dell'Accademia delle Scienze, o Memorie per servire alla Storia degli animali. Tom. III. Part. I. pag. 109. Chat-pard., Brisson, *Regn. animal.* pag. 273.

jaguar una tigre; quindi noi possiam senza scrupolo dire, che il leone, la tigre, ed anche la pantera non si son trovati in America, come nè anche l'elefante, il rinoceronte, l'ippopotamo, la giraffa, e'l cammello. Tutte queste specie avendo bisogno d'un clima caldo per propagarsi, e non avendo mai abitato nelle terre del Settentrione, non han potuto aver comunicazione coll' America, nè portarvisi. Questo fatto generale, di cui par, che non si farebbe tampoco dubitato, è tanto importante, che convien corredarlo di tutte quelle prove, che posson servire a sempre più dimostrarlo; continuiam dunque a tal effetto la nostra comparativa enumerazion degli animali dell'antico con quei del nuovo continente.

Ognun sa, che i cavalli non solamente recaron maraviglia, ma fecer anche spavento agli Americani quando li videro per la prima volta: essi han fatta buona riuscita in quasi tutt' i climi del nuovo mondo, e presentemente vi sono tant' ovv) quanto nell' antico (a).

Lo stesso è degli asini, ch' eran quivi egual-

(a) Tutt' i cavalli, dice Garcilasso, che sono nelle Indie Spagnole, derivano da cavalli, che furon trasportati dall' Andalusia, primieramente nell' Isola di Cuba, e in quella di

egualmente incogniti, e che hanno pur egualmente fatta riuscita ne' caldi climi di quel nuovo continente; e v'hanno anche prodotti de' muli, che son più utili dei lama per portar fomme in tutte le parti montuose del Chili, del Perù, della nuova Spagna ec.

Il zebro (a) parimenti è un animale del-

di San Domingo, quindi a quella di Barlovento, ove si moltiplicarono per modo, che se ne sparfero nelle terre inabitate, nelle quali divennero selvaggi, e vi pullularono in grandissima copia, perchè non trovavansi in quelle isole animali feroci, che potessero nuocerli, e perchè in que' luoghi si trova erba verde in tutto l'anno. *Storia degl' Incas. Parigi 1744.* I Francesi son quei, che han popolate l'isole Antille di cavalli; gli Spagnuoli non ve n'avevan lasciato affitto, come nelle altre isole, e nella terra ferma del nuovo continente. Il Sig. Ambert, secondo Governator della Guadalupa, cominciò in quell'isola la prima prateria, e vi fece condurre i primi cavalli. *Storia generale delle Antille, del P. du Terre 1667. Tom. II. pag. 289.*

(a) Zebra, Ray, *Synops. quadr. pag. 69.* — Edwards, *gleanings of natural history. Londra 1758. pag. 27. e 29.* — Il zebro, o l'afino a strisce. Briffon, *Regn. anim. pag. 101.* — Afino selvaggio, Kolbe, *Tom. III. p. 22.*

l' antico continente, e che non fu forse mai trasportato, nè veduto nel nuovo: par ch' egli richiegga un clima particolare, e non ritrovasi, che in quella parte dell' Africa, che si stende dall' Equatore fino al Capo di Buona-Speranza.

Il bue non s'è ritrovato nè nell' isole, nè nella terra ferma dell' America Meridionale: poco dopo la scoperta di quelle nuove terre, gli Spagnuoli vi trasportarono dall' Europa i tori, e le vacche. Nel 1550. si lavorò per la prima volta il terreno co' buoi (a) nella valle di Cusco. Questi animali moltiplicarono prodigiosamente in quel continente, come pure nell' isole di San-Domingo, di Cuba, di Barlovento ec. ed in molti luoghi divennero anche selvatici. La specie di bue, che s'è trovata nel Messico, nella Lunigiana ec. (b), e che noi nominammo *bue selvaggio*, o *bisone*, non è giammai derivata da' nostri buoi: il bisone esisteva in America, prima che vi si fosse trasportato il bue d' Europa, ed è egli tanto diverso da questo, che basta per riguardarlo, come formante una specie separata: quello ha una gobba sulle spalle, il suo

(a) Vedi la Storia degl' Incas, Parigi 1744. Tom. II. pag. 266. e segu.

(b) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di Giovanni di Laet, Leida 1640. lib. X. cap. IV.

suo pelo è più morbido della lana , più
 lungo nel davanti , che nel di dietro del
 corpo , e riccio sul collo , e pel lungo della
 spina del dorso ; è di color bruno , ed oscu-
 ramente segnato d'alcune macchie bianca-
 stre . Il bisone in oltre ha le gambe corte ,
 ricoperte , come la testa e 'l petto , d'un
 lungo pelo : il maschio ha la coda lunga ,
 con un fiocco di pelo sull'estremità , come
 osservasi nella coda del leone . Quantunque
 queste differenze siano a me , e a tutti gli
 altri Naturalisti parute sufficienti per far
 del bue , e del bisone (a) due specie diffe-
 renti , pur io non pretendo di ciò assicu-
 rare affermativamente ; poichè , siccome il
 solo carattere , che diversifica , o identifica le
 specie , è la facoltà di produrre individui ,
 che abbian pur essi quella di generare al-
 tri loro simili : nè alcuno ci ha fatto sapere
 se il bisone possa far razza col bue , anzi è
 probabile , che niuno abbia mai pensato ad
 unirli insieme , così noi non siamo in
 istato di definire su questo particolare .
 Io son tenuto al Sig. de la Nux , antico
 Consigliere nel Real Consiglio dell' Isola
 di Borbone , e Corrispondente dell' Accade-
 mia delle Scienze , per avermi egli con una
 sua

(a) Vedi il Settimo tomo di questa Storia Na-
 turale all' articolo del bue .

sua lettera (a) scritta dall'Isola di Borbone sotto i 9. d'Ottobre 1759., significato, che il bisono, o sia bue con gobba dell'Isola di Borbone, genera co' nostri buoi d'Europa, e confesso ch'io per me tengo questo bue gob-

(a) *Estratto della Lettera scritta dal Sig. de la Nux al Sig. de Buffon.* Non deggio trascurare di farvi sapere, che, se la gobba, che i *Bisoni* hanno sulla giuntura degli ossi delle spalle è il solo carattere, che li distingue da' buoi, essi non sono certamente una specie particolare e diversa da questi, come sembra che voi ne siate persuaso (nel Tomo settimo della vostra Storia Nat.). In quest' Isola, ove già da più di trent'anni ho veduti buoi di Bretagna, buoi Indiani, e bisoni, siamo pienamente assicurati, ch'essi sono animali della medesima specie, che essendosi dopo tal tempo trammischiati, hanno prodotti individui, i quali pure ne han prodotti degli altri, di cui le nostre favane sono attualmente coperte. (*Sono le favane que' territorj, che rimangon per pascolo agli animali dopo essersene mietute le biade*). Ebbi fra le altre una vacca di Bretagna, che fu presso di me lo stipite di varie generazioni, e non n'ebbi mai nè tori indiani, nè di Bretagna, ma soltanto bisoni interi. I primi bastardi del miscuglio dei bisoni colle razze di Bretagna, hanno la loro gobba molto piccola; ve n'ha parimente di

gobbo dell' Indie piuttosto per un bisone, che per un hue. Io non potrò mai troppo ringraziare il Sig. de la Nux per avermi comunicata questa osservazione; e sarebbe a desiderarsi, che ad imitazione di lui, le persone stabilite in lontani paesi facessero di simili esperimenti sopra gli animali; con che parmi sarebbe facile a' nostri abitanti della Lunigiana il tentare di congiungere il bison d' America colla vacca d' Europa, e'l toro

di quelli, che ne son quasi senza, e in essi si trova soltanto il disopra delle omoplate più carnosio, che nei buoi di Bretagna, o indiani; in oltre dopo varj framschiamenti di tre razze bastarde il tutto svaniva: ed io ho attualmente varie bestie giovani, che non hanno la menoma apparenza delle gobbe già somamente diminuite sulle madri, ch'esse poppano. In quello paese noi ci serviamo de' buoi, di qualunque razza e' siano, per portar grani, o altri carichi; l'asprezza delle nostre montagne non permette di far uso nè di aratri, nè di carri; perciò la razza de' bisoni quì si ha in maggior conto; e alla maggior parte de' nostri vecchi castaldi increbbe il veder la diminuzion progressiva delle gobbe; eglino fanno quanto possono per conservare gli stipiti forniti di maggior gobba; in fatti nelle difficili discese liffatta gobba serve a ritenere il carico; ciò non ostante io veggo per prova e per

toro d'Europa colla femmina del bisone, onde forse farebbero razza insieme, ed allora faremmo assicurarci, che il bue d'Europa, il bue gobbo dell'Isola di Borbone, il toro dell'Indie orientali, e'l bisone d'America non formerebber tutti che una sola, e medesima specie. Dalle sperienze del Sig. de la Nux risulta non esser la gobba un carattere veramente essenziale, mentr'essa dileguasi dopo alcune generazioni; e oltracciò
io

e per esperienza già di varj anni, che la privazion della gobba non rende i nostri buoi meno acconci a siffatto uso. Otto mesi sono mi son privato d'un *bue da carico*, nato bastardissimo in casa mia, che aveva servito per lo spazio di più di quattro anni, e che non aveva la menoma apparenza di gobba; ne conservò tuttavia la madre, che ha la gobba, e che giunta di già all'età di diciott'anni produce ancora de' vitelli di buona corporatura. Questi buoi da carico son guidati, e governati pel naso, che vien loro forato; tra le narici si fa passare nell'apertura un ferro curvo a foggia di luna crescente, alquanto aperto alle due estremità, alle quali attaccansi due anelli: siffatta specie di briglia è sostenuta da un frontale, che passa dietro le corna, e le orecchie. La corda, che serve per guidare, e ch'è lunga di quindici in sedici piedi, è attaccata ad uno degli anelli; ordinariamen-
te

io stesso, per mezzo d'un'altra osservazione, ho conosciuto, che quella gobba, o gozzo, che si vede al cammello come al bison, è un carattere, benchè ordinario, non però costante, e deesi riguardare per una fortuita differenza forse dipendente dalla grossezza del corpo: poichè io vidi un cammello magro, e malato, che non avea pur la minima insegna di gobba. L'altro carattere del bison d'America, d'aver il pelo più lungo, e molto più morbido di quello del bue nostrale, sembra eziandio non esser altro, che una varietà derivante dall'influsso del clima, come vedesi nelle capre, ne' gatti, e ne' conigli nostrali, quando confrontinsi colle capre, co' gatti, e coi conigli d'Angora, i quali, benchè differentissimi nel pelo, sono però della specie medesima; quindi si potrebbe con qualche verisimiglianza supporre, (soprattutto se il bison

te il bue va innanzi a chi lo guida. Mi dimenticava di farvi notare, che i bisonti intesi si sono sempre fra noi trovati più deboli non solo dei tori di Bretagna, ma dei bastardi eziandio della razza di Bretagna. M'accorgo bene, che si vorrebbe sapere se ciò egualmente avvenga negl'individui provenuti da un toro, e da una vacca bisona, e in quelli provenuti da un bison. A questo non sono in istato di rispondere ec.

son d' America generasse colle nostre vacche d' Europa) che il bue nostrale fosse in addietro passato dalle terre del Nord contigue in quelle dell' America settentrionale, e che, disceso poi nelle temperate regioni di quel nuovo mondo, fusse col tratto del tempo soggiaciute alle impressioni del clima, e di bue fosse diventato bisone. Ma finattanto che il fatto essenziale, val a dire, la facoltà di far razza insieme, non sia dimostrato, noi ci crediamo in obbligo di dire, che il bue nostrale è un animale, che all' antico continente appartiene, e che non esisteva mica nel nuovo, prima ch'egli vi fusse stato trasportato.

In America v'eran altresì meno pecore (a) che buoi: elleno vi furon recate d'Europa, e son riuscite bene in tutt' i climi caldi, e temperati di quel nuovo Mondo; ma benchè stan esse quivi molto prolifiche (b), son però d' ordinario più magre, e i montoni han generalmente la carne meno succosa, e men tenera di que' d' Europa: il clima del Brasile è a chiare pruove quello, che più lor si confà, mentre in tutto il Mondo nuovo solamente sotto quel clima s' in-

(a) Vedi la Storia degl' Incas. Parigi 1744. Tom. II. pag. 322.

(b) Vedi la Storia del Brasile, di Pison, e Marcgrave.

ingrassano al maggior segno (a). Si son trasportate nella Giamaica non solamente le pecore d' Europa , ma i montoni ancora della Guinea (b), che vi son parimente riusciti: queste due specie, che ci sembrano diverse l' una dall' altra , spettan pur unicamente al continente antico .

Lo stesso è delle capre , che delle pecore: elleno non esistevano in America ; e quelle, che vi si trovan oggidì , che sono in gran numero , vengon tutte dalle capre , che vi furon d' Europa trasportate . Esse non si son nel Brasile (c) moltiplicate tanto , come le pecore : ne' primi tempi , quando gli Spagnoli le trasportarono nel Perù , erano da principio tanto rare , che si vendevano fin a cento dieci ducati l' una (d) ; ma poi vi si propagarono tanto prodigiosamente , che si davano quasi per niente , e non si facea conto, che della pelle . Elleno producono quivi tre , quattro , e fino a cinque capret-

ti

(a) Vedi la Storia del nuovo Mondo , di Giovanni di Laet , Leida 1640. lib. XV. cap. XV.

(b) *Ovis Guineensis* , seu *Angolensis* , Marcgravi , lib. VI. cap. X. Ray , *Synops.* pag. 75. Vedi la Storia della Giamaica , di Hans Sloane , Londra 1707. Tom. I. pag. 73. dell' Introduzione .

(c) Vedi la Storia del nuovo Mondo lib. XV. cap. XV.

(d) Vedi la Storia degl' Incas , Tom. II. pag. 322.

ti in un parto solo, laddove in Europa non ne fanno, che uno, o due. L' Isole grandi, e le piccole dell' America sono tanto popolate di capre, quanto lo sono le terre del continente: gli Spagnuoli ne han portate fin nell' isole del mare del Sud, e ne avean popolata anche l' isola di Gian-Fernandez (a), dove s' eran propagate assai ma siccome venivasi a dar così un soccorso ai Corsari Americani, che scorsero in appresso quei mari, gli Spagnuoli pertanto determinarono di distrugger le capre in quell' isola; al qual effetto lasciaronvi scorrer de' cani, i quali anche moltiplicatisi, distrusser le capre in tutte le parti accessibili dell' isola; e que' cani son poi diventati sì feroci, che presentemente assaltano anche gli uomini.

Il Cinghiale, il porco domestico, il porco di Siam, ovvero porco della China, che tutti e tre non forman, che una sola e stessa specie, e che tanto facilmente, e in sì gran copia si moltiplicano in Europa, e in Asia, non furon trovati nell' America: il Tajacu (b),

Tom.X.

B

che

(a) Vedi il Viaggio intorno al Mondo, di Anson, lib. II. pag. 101.

(b) Tajacu, Pison. Ind. pag. 98. — Tajacu, apud Mexicanus moschiferus. Ray, Synops. quadrup. pag. 97. — Il cinghiale del Messico

che ha una fessura sul dorso, è l'animale di quel continente, che più ad essi somiglia: noi l'abbiam avuto vivo, e abbiám inutilmente tentato, che generasse col porco d'Europa, da cui per altro esso varia per tanti altri caratteri, onde abbiám tutto il fondamento d'asserire, ch'ei sia d'una specie diversa.

I porci trasportati d'Europa in America, v'han fatta riuscita migliore, e vi sono moltiplicati ancor più delle pecore, e delle capre. Dice Garcilasso (a), che nel Perù le prime scrofe si venderter a più caro prezzo delle capre. La carne del bue, e del montone, dice Pison (b), non è già sì buona nel Brasile, come l'è in Europa; i soli porci son colà migliori, e vi si moltiplicano assai; e secondo Giovanni di Laet (c) son essi divenuti migliori a San-Domingo, che in Europa. Può dirsi dunque in generale, che tra tutti gli animali domestici trasportati d'Europa in Ame-

fico. I Francesi della Guiana lo chiamano *cochon noir*, cioè *porco nero*. Brisson, *Regn. animal.* pag. 111.

(a) Vedi la Storia degl' Incas. Parigi 1744. Tom. II. pag. 266. e seguenti.

(b) Vedi Pison, *Histor. Nat. Brasil. cum app. Marcgravii*.

(c) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di Giovanni di Laet. Leida 1640. cap. IV. pag. 5.

America, il porco è quello, che vi è meglio, e più universalmente nutrito . Tanto nel Canadà, che nel Brasile, cioè nei climi freddissimi, e caldissimi di questo nuovo Mondo, il porco genera e propagasi, e la sua carne è tutta egualmente buona a mangiarsi. La specie della capra al contrario non s'è moltiplicata che ne' paesi caldi, o temperati, e non ha potuto sussistere nel Canadà, ove bisogna far di quando in quando venire d' Europa de' becchi, e delle capre per rinnovarne la specie, che per questa ragione v'è poco numerosa . L' Asino, che moltiplica, nel Brasile, nel Perù ec., non ha potuto moltiplicare nel Canadà, ove non si veggono nè muli, nè asini, quantunque sianvisi in varj tempi trasportate molte coppie di questi ultimi animali, ai quali par che il freddo tolga quella forza di temperamento, quell'ardor naturale, che in questi climi gli distingue cotanto dagli altri animali . I cavalli hanno presso a poco moltiplicato egualmente ne' paesi caldi, e ne' freddi dell' America; par solamente, che sian essi diventati più piccioli (a); ma questo è loro comune con tutti gli animali, che sono stati trasportati d' Europa in America: poichè i buoi, le ca-

B 2

pre,

(a) Vedi la Storia della Giamaica, di Hans Sloane. Londra 1707., e 1725.

pre, i montoni, i porci, i cani, son più piccioli nel Canada, che in questi nostri climi: e ciò che parra forse anche più strano è, che tutti gli animali d'America, quelli perfino, che sono naturali al clima, son generalmente molto più piccioli di que' dell'antico continente. Sembra dunque, che la Natura siasi in quel nuovo Mondo servita d'una differente scala di grandezza; l'uomo è il solo, ch'ell' ha misurato col medesimo modello. Ma prima d' esporre i fatti, su' quali io stabilisco quest'osservazione generale, bisogna dar fine alla nostra enumerazione.

Il porco dunque non si trovò in America, ma vi fu trasportato; e non solamente s'è quivi propagato nello stato di domestichezza, ma in molti luoghi ancora è diventato selvaggio (a), vivendo, e moltiplicandosi ne' bolchi, come i nostri cinghiali, senza l'ajuto dell'uomo. Si è trasportata altresì dalla Guinea nel Brasile (b) un'altra sorta di porco, diversa da quella d'

Eu-

(a) I porci dell'Europa si sono assai moltiplicati in tutte le Indie occidentali; son colà divenuti selvaggi, e si fa di loro la caccia, come del cinghiale, del quale hanno essi adottata la natura, e la ferocia. *Storia Naturale delle Indie, di Giuseppe Acosta. Parigi 1600. pag. 44. e seguenti.*

(b) Vedi Pison, *Hist. Nat. Brasil. cum. app. Marcgravii.*

Europa , che vi si è moltiplicata . Questo porco della Guinea , più picciolo di quel d' Europa , ha gli orecchi molto lunghi , e molto aguzzi , la coda parimente lunghissima , e che tocca quasi a terra ; non è coperto di lunghe setole , ma d' un pelo corto ; e par ch' ei formi una specie separata , e distinta da quella del porco d' Europa , mentre a noi non costa , che nel Brasile , ove l' ardor del clima influisce cotanto alla propagazione in qualsivoglia genere , sianfi queste due specie congiunte fra loro , nè che abbian poi generati de' bastardi , o de' gl' individui fecondi .

I cani , le cui razze sono tanto diverse , ed in tanta copia diffuse , non si sono , per così dire , trovat' in America , che come alcuni segni difficili a paragonarsi , ed a rapportarsi al totale della specie . Eranvi a San-Domingo certi piccioli animali chiamati *gosques* , simili a' piccioli cani ; ma non vi eran però cani simili a quei d' Europa , dice Garcilasso , il quale soggiugne (a) che i cani d' Europa , che furono trasportati a Cuba , e a San-Domingo , essendo divenuti salvatici , diminuirono in quell' isole la quantità del bestame , che s' era pur fatto selvaggio : che tai cani vanno in truppa dieci o dodici insieme , e sono fieri

B 3

co-

(a) Vedi la Storia degl' Incas ; Parigi 1744.
Tom. II. pag. 322. e segu.

come lupi . Giuseppe Acoſta (a) dice ,
 che nell' Indie occidentali non v' erano veri
 cani , ma ſolamente animali ſomiglianti
 a piccioli cani , che nel Perù chiamavanſi
alco ; e queſti alco vanno dietro ai loro pa-
 droni , e hanno preſſo a poco il naturale del
 cane . Se ſi ha da credere al Padre Char-
 levoix (b) , il quale in queſto propoſito
 non cita le autorità alle quali s' è appog-
 giato , i *goſchi* di San-Domingo eran pic-
 „ cioli cani muti , che ſervivan di traſtul-
 „ lo alle Dame (c) , ed alla caccia ezian-
 „ dío per far levare altri animali : eſſi
 „ eran buoni a mangiarſi (d) , e furono di
 „ gran ſollievo agli Spagnuoli nelle prime
 „ careſtie , che patirono ; e la loro ſpecie
 „ farebbe in quell' iſola venuta meno , ſe
 „ non ve ne foſſero ſtati da molte parti
 „ del continente recati degli altri . Ve n'
 „ erano di più forte : altri avean la pelle
 „ af-

(a) Vedi la Storia Naturale delle Indie , di
 Giuſeppe Acoſta , pag. 46. e ſegu. Vedi pa-
 rimente la Storia del nuovo Mondo , di
 Gioanni di Laet. Leida 1640. lib. X. cap. 5.

(b) Vedi la Storia dell' Iſola di San-Domingo,
 del Padre Charlevoix. Parigi 1730. Tom. I.
 pag. 35. e ſegu.

(c) Eranvi delle Dame a San-Domingo, quan-
 do ſe ne fece la ſcouverte ?

(d) La carne del cane non è buona a man-
 giarſi .

„ affatto liscia, altri eran interamente cover-
„ ti d'una lana assai morbida: i più non
„ avean altro, che una specie di lanugine
„ assai tenera, e rara: quella stessa varie-
„ tà di colore, che ne' cani nostrali si offer-
„ va, in quelli ancora osservavasi, e tan-
„ to maggiore, quanto che vi si trovavan
„ tutt' i colori, finanche i più vivi. “Se la
specie di questi goschi ha giammai esistito
colle singolarità che il P. Charlevoix gli attri-
buiscè, or perchè gli altri autori non ne
fann' eglino menzione alcuna? e perchè
questi animali, che, secondo lui, eran
non solamente nell' isola di San-Domingo
disseminati, ma in molti altri luoghi an-
cora del continente, non sussiston essi più
oggiorno? ovvero, se sussistono, come
mai han essi perdute tutte queste belle
singolarità? Egli è probabile, che il goschi
del P. Charlevoix, di cui dic' egli non
aver trovato il nome, che nel Padre Pers,
sia il *gosques* di Garcilasso; e può darsi
ancora, che il *gosques* di San-Domingo e
l' *alco* del Perù non sian poi, che uno stes-
so animale: sembra però certo esser questo
animale quello, tra gli altri d'America, che
ha maggior relazione col cane d'Europa.
Alcuni Autori l' hanno considerato per un
vero cane: Gioanni di Laet. (a) dice

B 4 espres-

(a) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di Gio:
di Laet, lib. XV. cap. XV.

espressamente, che al tempo della scoperta dell' Indie, eravi a San-Domingo una picciola razza di cani, de' quali facevasi uso nella caccia, ma ch' erano assolutamente muti. Noi abbiain veduto nella Storia del cane (a), che nei paesi caldi questi animali perdono la facoltà d' abbajare, ma che al latrato vien poi sostituito un certo urlo; e ch' essi non sono giammai assolutamente muti, come questi animali, che si trovaron in America. I cani trasportati d' Europa sono presso a poco riusciti egualmente ne' paesi più caldi, che ne' più freddi dell' America, nel Brasile, nel Canadà ec., e questi sono tra tutti gli animali quei, che i Selvaggi prezzano maggiormente (b); intanto par ch' essi abbian cambiata natura, avendo perduta la loro voce ne' paesi caldi, la grandezza della corporatura ne' freddi, e avendo quas' in ogni dove gli orecchi ritti. Essi han dunque degenerato, o, per meglio dire, si sono accostati alla loro primitiva specie, ch' è quella del can da pastore, del cane dagli orecchi ritti, il quale abbaja meno di tutti gli altri cani. Si
posson

(a) Vedi l' ottavo Tomo di questa Storia Naturale, all' articolo del cane.

(a) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di Gio: di Laet, lib. XV. cap. XV. pag. 513.

posson dunque riguardare i cani per unicamente appartenenti al continente antico, dove la loro natura non s'è del tutto sviluppata, fuorchè nelle regioni temperate, e dove par ch'ella siasi variata, e perfezionata per quanto l'uomo vi ha coll' assistenza sua contribuito; mentre in tutt' i paesi non colti, e in tutt' i climi eccessivamente caldi, o freddi, essi son egualmente e piccioli, e brutti, e pressochè muti.

L' Iena (a), ch' è a un di presso della grandezza del lupo; è un animale noto agli Antichi, e che noi abbiain veduto vivo; egli è singolare per la bocca, e per le glandole, che sono situate, come quelle del tasso, dalle quali esce un umore d' un odor puzzolentissimo: egli è parimente considerabilissimo per la sua lunga chioma, che stendesi lungo il collo, e l' garrot: per la sua voracità, che lo porta a disotterrare i cadaveri, e divorar le carni le più putride ec. Questa bestia immonda non esiste, che in Arabia, e nelle altre provincie meridionali dell' Asia, non già in Europa, nè se n'è trovata nel nuovo Mondo.

Lo Sciacal (b), che fra tutti gli animali,

B 5

non

(a) *Hyena*. Aristotelis. *Hist. animal.* ... *Dabul Arabum*. Charleton, *Exer. pag.* 15.

(b) *Lupus aureus* Jaskall. Ray, *Synops.*
qua

non eccettuato nemmeno il lupo, è quello la cui specie fembraci, che più s'avvicini alla specie del cane, ma che però ne varia per caratteri essenziali, è un animale comunissimo in Armenia, in Turchia, e che trovasi anche in molte altre provincie dell'Asia, e dell'Africa, ma ch'è assolutamente straniero al nuovo continente. Egli è ragguardevole pel colore del suo pelo, ch'è d'un giallo risplendente; è della grandezza presso a poco d'una volpe; e quantunque la sua specie sia molto numerosa, ella non s'è però diffusa fino in Europa, nemmeno fin al Settentrione dell'Asia.

La Genetta (a), ch'è un animale ben conosciuto dagli Spagnoli, poichè è originaria della Spagna farebbe stata senza dubbio notata, s'ella si fosse trovata in America; ma siccome niuno de' loro Storici, o de' loro Viaggiatori ne fa motto, egli è chiaro, che questo pur è un animale particolare all'antico continente, nel quale abita
le

quadrup. pag. 174. Asiaticum animal, Adil nuncupatum. Bellon. Obs. pag. 160. ... Canis flavus... Il Lupo dorato. Brisson, Regn. animal. pag. 237.

(a) Genetta, Bellon, *Observ. pag. 76. ... Genetta. Catus Hispanie Genethocatus. Charleton, Exerc. pag. 20. La Genette; Brisson; Regn. Animal. pag. 252.*

le parti meridionali dell' Europa , e quelle dell' Asia, e che sono presso a poco sotto la medesima latitudine.

Quantunque siasi preteso, che il Zibetto esistesse nella nuova Spagna, noi crediamo però non esser questi il Zibetto dell' Africa e dell' Indie, dal quale cavas' il muschio, che vien mischiato, e manipolato con quello, che parimente cavasi da un' animale, che si chiama *Hiam* nella China; e noi consideriamo il vero Zibetto per un animale delle parti meridionali dell' antico continente, che non s' è disseminato verso il Nord, e che non ha potuto passare nel nuovo.

I gatti erano, come i cani, totalmente stranieri al nuovo Mondo; ed io son presentemente persuaso, che la loro specie non esisteva affatto colà, non ostante, ch'io abbia allegato un passo (a), dal quale par che si rilevi, che un uomo del seguito di Cristoforo Colombo avesse trovato, ed ammazzato un gatto selvaggio sulla costa di quelle nuove terre: io non era allora così istruito, come lo sono al presente di tutti gli abusi, che si son fatti de' nomi, e confesso, che non avea peranco bastevol cognizione degli animali per distinguer con certezza nelle testimonianze de' Viaggiatori i nomi usur-

B 6

pa-

(a) Vedi il Tomo VIII. di questa Storia Naturale, all' articolo del gatto.

pati, le denominazioni mal applicate, tolte in prestito, o fittizie; e di ciò peravventura niuno si maraviglierà, poichè i Nomenclatori, le ricerche de' quali son limitate a questo solo scopo, in vece d'aver rischiarata la materia, l'hanno anzi più imbrogliata per via d'altre denominazioni, e di frasi relative a' metodi arbitrari, anche più fallaci, che lo sguardo, e l'ispezione. La naturale inclinazione, che noi abbiamo a paragonar le cose, che noi veggiamo per la prima volta, a quelle, di cui abbiain già cognizione, unita alla difficoltà quasi insuperabile, che vi era a pronunziar i nomi dati alle cose dagli Americani, sono le due cagioni di tale impropria applicazione di denominazioni, che ha prodotte poi tante fallacie, e tanti errori. Egli è, per esempio, assai più agevole il dare a un animal nuovo il nome di *cinghiale* (a), o di *porco nero*, che il pronunziare il proprio suo nome messicano *quauh-coyameht*: così, era più facile di denominarne

un

(a) Vedi il Viaggio di Desmarchais, Tom. II. cap. 112.; ed il Saggio sopra la Storia Naturale della Francia equinoziale, di Barre-re, Parigi 1740., colla Storia del Messico, di Hernandez, pag. 637.; e la Storia della nuova Spagna, di Fernandez pag. 8.

un altro *volpe americana* (a), che di conservargli il suo nome brasiliano *tamandua-guacu*; di nominar parimente *montone* o *cammello del Perù* (b) animali, che in quella lingua eran chiamati *pelon iehiathoquitli*: si è per la stessa ragione appellato *porco d'acqua* (c) il *cabiai* o *cabionara*, o *capybara*, benchè sia questo un animale diversissimo da un porco: il *carigueibeju* è stato detto *lontra*. Lo stesso è di quasi tutti gli altri animali del nuovo Mondo, i cui nomi erano sì barbari, e strani agli Europei, ch'essi procurarono di porre loro altri per mezzo di simiglianze (talvolta proprie) cogli animali dell'antico continente, ma spesse volte ancora per semplici rapporti, troppo rimoti per ben fondare l'applicazion di siffatte denominazioni. Si sono scambiati per lepri, e conigli cinque, o sei specie d'animaletti, che non hanno altra relazione colle lepri, e coi conigli, fuorchè d'aver com'essi, la carne buona a mangiarsi. Fu dato il nome di *vacca*, o *elano* a un animale senza corna, che gli Americani chiamavan *tapiereze* nel Brasile, e *manipouris* nella Guiana; che i Portoghesi poi hanno denominato *anta*, e che
non

(a) Vedi Desmarchais, Tom. III. pag. 307.

(b) Vedi Hernandez, Stor. del Messico pag. 66.

(c) Vedi Desmarchais, Tom. III. pag. 314.

non ha altro rapporto colla vacca, o l'elano, che quello di un po' di simiglianza nella struttura del corpo. Alcuni hanno paragonato il *pak* o l'*paca* al coniglio, ed altri han detto, ch'esso era simile a un porco di due mesi (a). Alcuni hanno tenuto il *filandro* per un topo; e l'han chiamato *topo de' boschi*; altri poi l'hanno preso per una picciola volpe (b). Ma non è necessario d'insister quì più a lungo su questo proposito, nè d'espore più minutamente le false denominazioni da' Viaggiatori, dagli Storici, e da' Nomenclatori applicate agli animali dell'America, poichè noi procureremo d'indicarle, e di correggerle, per quanto le nostre forze porteranno, nel tratto successivo del presente discorso, ed allorchè tratteremo d'ognuno di questi animali in particolare.

Egli è chiaro, che tutte le specie de' nostri animali domestici d'Europa, e i più grandi animali selvaggi dell'Africa, e dell'Asia mancavano nel nuovo Mondo; come pure molte altre specie di minor considerazione, delle quali noi siam ora per far menzione il più succintamente, che ci sarà possibile.

Le

(a) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di Giovanni Laet, pag. 484. e seguenti.

(b) Vedi Klein, de quadrup. pag. 59.; e Barre, Storia della Francia equinoziale p. 166.

Le Gazzelle , che sono di molte specie differenti , quali nell' Arabia , quali nell' India orientale , e quali nell' Africa , hanno press' a poco tutte bisogno d' un clima caldo per sussistere , e propagarsi : non si son esse dunque mai estese ne' paesi settentrionali dell' antico continente , per passar poi nel nuovo , dove parimente non si sono trovate le predette specie dell' Africa , e dell' Asia ; solamente pare , che vi sia stata trasportata la specie , che fu chiamata *gazzella d' Africa* , e che da Hernandez vien intitolata *algazel (a) ex Aphrica* . L' animale della nuova Spagna , che lo stesso Autore chiama *temamacame* , che Seba dinota col nome di *ceruus* , Klein con quello di *tragulus* e Mr. Brisson (b) con quello di *gazzella della nuova Spagna* , sembra tuttavia , che nella specie sia diversa da tutte le gazzelle del vecchio continente .

Potrebbeasi facilmente credere , che la camozza , che ama le nevi delle alpi , non avrebbe temuto affatto i ghiacci del Setten- trione , e che di là avrebbe potuto passare in America : e pure non vi fu ella in ve- run conto trovata . Par che questo animale non richiegga solamente un clima , ma an-

(a) Vedi Hernandez, *Stor. del Messico* pag. 512 ,

(b) Vedi il *Regno animale* del Sig. Brisson , pag. 70 .

anche una situazione particolare ; poichè , stando attaccato alle cime delle alpi , de' pirenei ec. , non solo non s'è disseminato ne' paesi lontani , ma non è giammai disceso nelle pianure poste appiè delle suddette montagne. Egli non è però il solo animale , che s'attenga di continuo ad un paese , o sia ad una particolar situazione , mentre la marmotta , il becco selvatico , l'orso , la lince o sia lupo-cerviero , son essi pure animali montagnuoli , che rinvengonsi rarissime volte nelle pianure .

Il bufalo , animale de' paesi caldi , è reso bastantemente domestico in Italia , somiglia meno ancora del bue al bisone d' America , e non s'è trovato affatto in quel nuovo continente .

Il becco selvatico trovasi nelle sommità delle più alte montagne dell'Europa , e dell'Asia , ma non fu veduto mai sulle Cordiliere .

L' Animale (a) da cui cava' il muschio , e ch'è quasi della grandezza d'un daino , non abita che alcune particolari contrade della China , e nella Tartaria Orientale : il cavriuolo (b) , che vien dinotato col nome

(a) *Hiam. Animal musci* : Boym. *flor. sinen.* 1656. --- *Animal moschiferum* : Ray , *Synops. quadrup.* pag. 127.

(b) *Chevrotain* , Brisson , *Regn. animal.* p.95.

me di picciol cervo della Guinea, sembra che sia rilegato in alcune provincie dell' Africa, e dell' Indie Orientali ec.

Il coniglio, che tira la sua origine dalla Spagna, e che s'è diffuso in tutte le regioni temperate dell' Europa, non esisteva in America: gli animali di quel continente ai quali fu posto il nome di coniglio, sono di specie differenti, e tutt' i veri conigli, che quivi sono oggidì, furonvi recati d' Europa (a).

I furetti, trasportati d' Africa in Europa, dov' essi non posson sussistere senza le cure dell' uomo, non furon trovati in America: perfino i nostri topi, ed i nostri forci eran colà sconosciuti, e vi sono passati co' nostri vascelli (b), e sonosi prodigiosamente moltiplicati in tutt' i luoghi abitati di quel nuovo Mondo.

Ecco dunque a un di presso gli animali dell' antico continente: l' elefante, il rinoceronte, l' ippopotamo, la giraffa, il cammello, il dromedario, il leone, la tigre, la pantera, il cavallo, l' asino, il zebro, il bue, il bufalo, la pecora, la capra, il porco, il cane, l' iena, lo sciacal, la ginetta, il zibetto, il gatto, la gazzella, la ca-
moz-

(a) Vedi la Storia degl' Incas. 1744. Tom. II. pag. 322. e segu.

(b) Idem, ibidem.

42 *Animali dell' antico continente.*

mozza, il *becco selvatico*, il *cavriuolo*, il *coniglio*, il *furetto*, i *ratti*, e i *forci*: niun d'essi esisteva in America quando se ne fe' la scoperta. Lo stesso s'ha a dire de' *ghiri*, dei *lerotti*, o *ratti bianchi*, delle *marmotte*, delle *mangoste*, de' *tassi*, de' *zibellini*, degli *armiellini*, della *gerboise*, dei *makis*, e di molte specie di scimie ec., niuna delle quali esisteva in America all'arrivo degli Europei, e che sono per conseguenza tutte proprie, e particolari all' antico continente, come noi procurerem di provarlo in succinto, quando s'avrà a trattare di ciascuno di questi animali in particolare.



A N I M A L I

DEL NUOVO MONDO.

GLi animali del nuovo Mondo erano tanto sconosciuti agli Europei, quanto i nostri agli Americani. I soli popoli mezzo inciviliti di questo nuovo continente erano i Peruviani, e i Messicani: questi ultimi non avean affatto animali domestici; i Peruviani soli aveano due specie di bestiame, il *lama* e'l *pacos*, ed un picciol animale, ch'essi chiamavan *alco*, ch'era famigliare in casa, come lo sono i nostri piccioli cani. Il *pacos*, e'l *lama*, che Fernandez nomina *peruich-catl* (a), cioè (in Inglese) *bestiame peruviano*, amano, come la camozza, una situazione particolare. Essi non ritrovansi, che nelle montagne del Perù, del Chili, e della nuova Spagna; e quantunque fossero divenuti domestici presso i Peruviani, e per conseguenza gli uomini ab-

(a) *Peruich catl*. Fernandez, *Hist. nov. Hisp.* pag. 11. — *Camelus Peruanus*, *glama dictus*. Ray, *Synops. quadrup.* pag. 145. *Camelus*, seu *Camelo-congener Peruvianum*, *lanigerum*, *pacos dictum*. Idem *ibid.* p. 147.

abbiano data mano alla lor moltiplicazione, e trasportatigli o condottili nelle vicine contrade, essi non si sono però in niuna parte propagati: anzi sono scemati fin nel lor paese natio, ove la specie n'è presentemente men numerosa di quel, ch'ell'era prima, che vi si fosse trasportato il bestiar d'Europa, che ha fatta un'ottima riuscita in tutte le regioni meridionali di quel continente.

Parrà strano, se vi si rifletta, che in un mondo quasi tutto composto di naturali selvaggi, i costumi de' quali s'avvicinavano più de' nostri a que' delle bestie, non vi fosse nè alcuna società, nè molto meno abitazione alcuna tra quegli uomini selvaggi, e gli animali, che loro stavan dintorno; e giacchè non si son trovati animali domestici, che presso popoli di già resi colti, ciò non prova forse chiaramente, che l'uomo, nello stato selvaggio, non è altro che una specie d'animale incapace di comandare agli altri? e che, non avendo, com'essi, che le facoltà individuali, valsi di queste, com'essi pur fanno, per procacciarsi la sua sussistenza, e provvedere alla sua sicurezza coll'abbattere i deboli, e fuggire i forti, senz'aver alcuna idea della sua potenza reale, e della sua superiorità di natura sopra tutte le altre sostanze, ch'ei non cerca affatto di assoggettarli? Dando uno sguardo a tutt'i popoli inciviliti in tutto, od anche in parte noi
tro-

troveremo dappertutto animali domestici: fra di noi, il cavallo, l'asino, il bue, la pecora, la capra, il porco, il cane, e'l gatto; il bufalo in Italia, il renne presso i Lapponi; il lama, il paco, e l'alco tra i Peruviani; il dromedario, il cammello, ed altre specie di buoi, di pecore, e di capre tra gli Orientali; l'elefante ancora presso i popoli del mezzodì: a tutti è stato imposto il giogo, tutti ridotti in servitù, ovvero ammessi nella società; laddove il selvaggio, cercando appena la società della sua femmina, teme o sdegna quella degli animali. Egli è vero, che di tutte le specie, che noi abbiain rese domestiche in questo continente, niuna n' esisteva in America; ma se gli uomini selvaggi, de' quali essa era popolata, si fossero anticamente uniti, e prestatisi reciprocamente i lumi, ed i soccorsi scambievoli della società, essi avrebbero soggiogata, e ridotta per lor proprio uso, e comodo la maggior parte degli animali del lor paese; essendo essi quasi tutti d'un' indole dolce, mansueta, e timida, pochi che faccian male, e quasi niuno, che sia da temersi. Or non è già per ferezza di natura, nè per indocilità di carattere, che quegli animali han conservata la lor libertà, e schivata la schiavitù, o la domestichezza, ma bensì per la sola impotenza dell'uomo, che nulla può in fatti, se non in virtù delle forze della società, da cui sia la sua propagazione, e

la moltiplicazion sua dipende. Le immense terre del nuovo Mondo non eran, per così dirè, che sparse quà e là di qualche poco numero d' uomini, quasi feminati a pugno; ed io credo, che si potrebbe dire, che quando si fece la scoperta dell' America, non si trovavan in essa tutta quant'è grande, tanti uomini quanti oggidì se ne contano nella metà dell' Europa. Questa scarshezza nella specie umana produceva l'abbondanza, cioè, il gran numero in ciascuna specie d' animali naturali del paese; essi avevan, quanto meno nemici, tanta maggior estensione: quindi tutto contribuiva alla loro moltiplicazione, e ciascuna specie era relativamente numerosissima d' individui: non era però lo stesso riguardo al numero assoluto delle specie, ch' erano in poca copia; e quando se ne faccia paragone del numero con quelle del vecchio continente, si troverà, che il loro non arriva al quarto, o al più al più al terzo di questo. Se noi contiamo dugentò specie d' animali quadrupedi (a) in tutta la terra
abi-

(a) Il Sig. Linneo, nella sua ultima edizione, *Holm.* 1758, non ne conta, che cento sessanta sette. Il Sig. Brisson, nel suo *Regno animale*, ne addita dugentò sessanta, ma bisogna levarne forse più di sessanta, che non sono che varietà, e non già specie distinte, e differenti.

abitata, o scoperta, ne troverem più di centotrenta nell'antico continente, e meno di settanta nel nuovo; e quando poi se ne togliessero le specie comuni a tutti e due i continenti, val a dire, quelle soltanto, che per loro natura posson resistere al freddo, e che dalle terre settentrionali del nostro continente abbiano potuto passare nell'altro, non si troveranno, che circa quaranta specie d'animali proprj, e naturali delle terre del nuovo Mondo. Quivi la natura vivente è dunque men attiva, molto meno varia, e, puossi anche dire, molto men forte: poichè noi vedremo, nel far l'enumerazione degli animali dell'America, che non solamente sono quivi le specie in picciol numero, ma che tutti gli animali generalmente sono senza paragone più piccioli di quei dell'antico continente, e che non ve n'ha alcuno in America, che possa paragonarsi all'elefante, al rinoceronte, all'ippopotamo, al dromedario, alla giraffa, al bufalo, al leone, alla tigre ec. Il più grosso fra tutti gli animali dell'America Meridionale è il *tapir* o *tapiere* *te* del Brasile (a), e quest'animale più gran-

(a) *Tapiiereie Brasiliens.* Pison, *Hist. Nat.* p. 101. *Marcgraviu*, *Hist. Brasit.* pag. 229. *Muyssonry*. *Manipouris*, *Barriere*, *Hist. Fr.* *equin.*

grande di tutti gli altri, questo elefante del nuovo Mondo, è grosso finalmente come un vitello di sei mesi, o come un picciolissimo mulo, co' qualr due animali è stato confrontato, quantunque loro non somigli per nulla, non essendo nè solipede, nè di piè forcuti, ma fessipede irregolare, con quattro dita a' piè davanti, e tre a que' di dietro: ha il corpo di struttura presso a poco eguale a quella del porco, colla testa però in proporzione più grossa, senza zanne, o denti canini, e col labbro superiore molto allungato, e mobile a piacere. Il lama, di cui abbiain parlato, non è grosso quanto il tapir, e non par grande, che per la lunghezza del collo, per l'altezza delle gambe. Il pacos è ancor più picciolo.

Il cabiai (a), che dopo il tapir è il più grosso animale d'America, non lo è tuttavia più d'un porco di mezzana grandezza: varia egualmente, che i precedenti, da tutti gli animali dell'antico continente; poichè, sebbene siaglisi dato il nome

me

equin. pag. 161. Il tapir o manipouvis. Briffon, Regn. animal. pag. 119. I Portoghesi l'appellano Anta.
 (a) *Capybara Brasiliensis. Marcgravii, Hist. Brasil. pag. 230.*

me di *porco di palude* (a), o *porco d'acqua*, è nondimeno diverso dal porco per caratteri essenziali, ed evidentissimi: egli è fessipede, ed ha, come il tapir, quattro dita a' piè davanti, e tre a que' di dietro: ha gli occhi grandi, il muso grosso, e ottuso, gli orecchi piccioli, corto il pelo, ed è senza coda. Il *tajacu* (b), ch'è più piccolo ancora del *cabiai*, e che si rassomiglia assai più al porco, massimamente nell'esterno; è per altro assai diverso da questo per la forma delle parti interiori, per la figura dello stomaco, per la forma de' polmoni, e finalmente per la grossa glandula, e per un'apertura, che ha sul dorso ec.; egli è dunque, da quel che abbiain detto, d'una razza differente da quella del porco: e non si trovano nè il *tajacu*, nè il *cabiai*, nè il *tapir* in alcuna parte del vecchio continente. Lo stesso è del *tamandua-guacu*, o *ouarivì*

Tom. X.

C

(a),

(a) *Sus maximus palustris*. Barrere, *Hist. Fr. equin.* pag. 160. --- Porco d'acqua. Viaggi di Desmarchais, Tom. III. pag. 314.

(b) *Tajacu*. Pison, *Hist. Nat.* pag. 98. --- *Tajacu, caaguara Brasiliensibus*. Marcgrave, *Hist. Brasil.* pag. 229. --- *Coyameti*. Fernandez, *Hist. nov. Hisp.* pag. 8.

(a), e del *ouatirion* (b), che noi chiamamo *formichieri*, o *mangiatori di formiche*: questi animali, i più grossi tra' quali son d'una corporatura più al di là della mediocre, sembrano particolari alle terre dell'America meridionale: son essi però molto singolari perchè non han denti, e perchè han la lingua cilindrica, come quella dell'uccello, che noi chiamiamo *gazza*: la squarcatura della bocca picciolissima, colla quale non posson nè mordere, nè quasi pur affer rare: solamente caccian fuori la lingua, ch'è lunghissima, e la mettono in positura tale, che le formiche vi possan montar sù: la tiran poi dentro, quando n'è ben carica; nè posson nutrirsì altrimenti, che con siffatta industria.

Il pigro (c), che i Brasiliani chiaman *ai* o *hui*, per ragione del grido lamentevole *ai*, ch'egli fa continuamente, crediam che sia pur esso un animale, che appartiene al nuovo continente soltanto: egli è più picciolo ancora de' precedenti, non essendo lungo, che circa due piedi, ed è singolarissimo

(a) *Tamandua guacu sive major*. Brisson, *Hist. Nat.* pag. 320. --- Il formichiere tamanoir. Brisson, *Regn. animal.* pag. 24.

(b) *Tamandua minor flavescens*. *Ouatirionacu*. Barrere, *Hist. Fr. equin.* pag. 163.

(c) *Ai*, o pigro. Desmarchais, *Tom. III.* pag. 300. --- *Onaikare*. Barrere, *Hist. equin.* pag. 154.

simo per la maniera di camminare, più lenta di quella della testuggine, per non aver, che tre sole dita tanto a' piedi davanti, che a que' di dietro, e le gambe davanti molto più lunghe di quelle di dietro, cortissima la coda, e per esser senza orecchi. In oltre il pigro, e'l tatou sono i soli tra' quadrupedi, che non avendo nè denti incisivi, nè denti canini, hanno solamente i denti molarî cilindrici, e rotondi sull' estremità, press' a poco alla maniera di que' d' alcuni mostri marini, come, per esempio, del maschio della balena.

Il cariacu della Guiana, che noi abbiamo avuto vivo, è un animale della natura, e della grandezza de' nostri cavriuoli più grandi: il maschio porta un corno simile a quei de' cavriuoli nostrali, e che gli cade ogni anno, come a questi stessi avviene: la femmina non ne ha: a Cajenna lo chiaman *cerva de' boschi*. Avvi anche un'altra specie, cui danno il nome di *piccol cariacu*, o sia *cerva delle paludi*, o dei *palétuviers*, ch'è notabilmente più piccola della prima, e nella quale il maschio non ha corna affatto. Attesa la somiglianza del nome, m'è venuto un sospetto, che il cariacu di Cajenna potess' essere il *cuguacu* (a), o sia

C. 2

con-

(a) *Cuguacu-ete*. *Cuguacu-apara*, Pison, *Hist. Nat.*

cougonacua-para del Brasile; ed avendo confrontate le notizie dateci da Pison, e da Marcgravio intorno al cuguacu, coi caratteri del cariacu, ci sembra, che sia un medesimo animale, che non ostante è tanto diverso dal cavriuolo nostrale, che, basta per dire, ch'ei forma una specie differente.

Il tapir, il cabiai, il rajacu, il formichiere, il pigro, il cariacu, il lama, il pacos, il bisone, il puma, il jaguar, il coguar, il jaguaretto, il gatto-pardo ec. son dunque i più grandi animali del nuovo continente: i mediocri e i piccioli sono i cuandus o gouandous (a), gli aguti (b), i coati, i pacas (c), i filandri (d), i porci d'

Nat. pag. 97, Marcgr. Hist. Brasil. pag. 235. Cerva dei pantani, cerva dei boschi. Barrere, Hist. Fr. equin. pag. 151.

(a) *Cuandu Brasiliensibus*. Pison, Hist. Nat. pag. 99. Marcgravii. Hist. Brasil. p. 233. *Gouandou*. Barrere, Hist. Fr. equin. p. 153. ... Gatto spinolo. Desmarchais, Tom. III. p. 303. L'istrice d'America, Brisson Regn. animal. p. 129.

(b) Vedi nel Tomo IX. l' articolo dell'aguti, e quello del coati.

(c) *Paca*. Pison, Hist. Nat. pag. 101. *Paca Brasiliensibus*. Marcgrav. Hist. Brasil. pag. 224. *Ouvana. Pak*. Barrere, Hist. Fr. equin. pag. 152.

(d) *Corigueya Brasiliensibus*. Marcgrav. Hist. Brasil.

d' India (a), gli aperea (b), e i tatou o armadilli (c), che io credo tutti originari proprj del nuovo Mondo, benchè i re-
centi Nomenclatori parlino d'una specie di tatous dell' Indie orientali, e d'un'altra dell' Africa. Siccome da noi s'è fatta men-
zione di questi armadilli Africani, e orien-
tali sulla sola testimonianza dell'autore del-
la descrizione del Gabinetto di Seba, av-
vertiamo non esser essa poi di tant' autori-
tà, che basti a farvici prestar fede, sapendosi
ciò che d'ordinario avviene d'alcuni pic-
cioli sbagli, e d'alcune confusioni di nomi,
e di paesi, quando si forma una collezio-
ne di Storia Naturale: si compera talvolta
un animale sotto'l nome di *pipistrello di*
Ternate, o d' America, e un altro sotto
quello di *tatou o armadilli dell' Indie orien-*
tali, e sotto tai nomi s'annunziano in ap-
presso in un' Opera, che contiene la descrizio-

C. 3

ne

Brasil. pag. 222. Opoffum. Gioanni de

Laet pag. 82. Il filandro. Brisson.

Regn. animal. pag. 286., e seguenti.

(a) Vedi nel Tomo IX. di questa Storia
Naturale, l'articolo del *porco d'India*.

(b) *Aperea Brasiliensibus. Marcgrav. Hist.*
Brasil. pag. 223. Il coniglio del Brasi-
le. Brisson. Regn. animal. pag. 149.

(c) *Tatou, armadillo, ayotochtli. Hernandez,*
Hist. Mex. pag. 314.

ne di tal Gabinetto, e da quell' opera pat-
 to tai nomi nelle line de' Nomenclatori;
 quando poi esaminando il fatto più da vi-
 cino, trovali, che siffatti pipistrelli di Ter-
 nate, o d' America son par pipistrelli di
 Francia (a), e che que' cotai armadilli
 dell' Indie, o dell' Africa, potrebbon esser
 forse anche armadilli d' America.

Noi non abbiain finora detto nulla del-
 le scimie, perchè la loro istoria esige una
 discussione a parte. Siccome il vocabolo
scimia è un vocabolo generico, che s'appli-
 ca ad un gran numero di specie differenti
 l'una dall'altra, egli non è strano, che siasi
 detto, che si trovavan delle scimie in gran
 quantità ne' paesi meridionali dell' uno, e
 dell' altro continente; ma il punto, che si
 tratta, è di sapere, se gli animali, che in
 Asia, e in Africa si chiamano *scimie*, siano
 gli stessi animali, cui s'è posto questo me-
 desimo nome in America: si tratta eziand-
 o di vedere, e d' esaminare, se di più di
 trenta specie di scimie, che noi abbiain avu-
 te

(a) Vedi nel Tomo IX. di questa Storia
 Naturale, l'articolo de' *pipistrelli*. Vedi
 altresì la descrizione del Gabinetto di Se-
 ba; Tom. I. pag. 47., ov' egli dà le figu-
 re dell' armadillo, o tatou d' Africa, e la
 pag. 62., ove dà quella dell' armadillo
 orientale.

te vive , se ne trovi pur una sola egualmente in tutti e due i continenti.

Il *Satirus* (a), che si trova nel boschi, che per la sua struttura tien più dell' *homo*, che della scimia, non trovasi, che in Africa, e nell' Asia meridionale, e non si trova affatto in America.

Il gibbone (b), le cui gambe anteriori, o sia le braccia, sono tanto lunghe, quanto tutto il corpo, compresevi anche le gambe di dietro, si trova nell' Indie maggiori, e non già in America. Queste due specie di scimie, che noi abbiamo avute vive, non hanno coda.

La scimia (c) propriamente detta, il cui pelo è d' un color verdastro, mescolato d' un pò di giallo, e che non ha coda, trovasi in Africa, e in alcuni altri luoghi del vecchio continente, ma non già nel nuovo. Lo stesso è pure delle scimie *Cinocéfale*,

C 4

del-

(a) *Satirus Indicus*, *Ourang-outang Indis*, *homo sylvest. dictus*. Charleton, *Exer.* pag. 16. L' uomo dei boschi. Brisson, *Regn. animal.* pag. 189.

(b) Questa scimia, che noi avemmo viva, e che il Sig. Dupleix aveva portata da Pondichery, non trovasi indicata da verun nomenclatore.

(c) *Simia simpliciter dicta*, Ray, *Synops. quadrup.* pag. 149.

delle quali s'ha notizia di due, o tre specie: il lor muso è più corto di quello dell'anzidette, ma, com'esse non hanno coda, si torto, che si stenta a vederla. Tutte queste scimie senza coda, quelle specialmente dal muso corto, e la cui faccia per conseguenza s'avvicina molto a quella dell'uomo, sono le vere scimie; e le cinque o sei specie, che ora abbiain accennate, son tutte naturali, e particolari ai climi caldi dell'antico Mondo, e non si trovano in alcuna parte del nuovo. Si può dunque dire fin da ora non esservi affatto vere scimie in America.

Il babuino (a), animale più grosso d'un alano, e'l cui corpo è raccorciato, e in se ristretto, quasi come quel dell'iena, è molto diverso dalle scimie, di cui abbiain ora discusso: egli ha la coda cortissima, e sempre ritta, il muso allungato, e largo all'estremità, nude le natiche, e a color di sangue, le gambe assai corte, e le unghie dure, ed aguzze. Quest'animale, ch'è fortissimò egualmente, che maligno, non si trova, che ne' deserti delle parti meridionali dell'antico continente, ma non già in quei d'America.

Tut-

(a) *Papio*. Ray, *Synops. quadrup.* pag. 258. *Babio*. Charleton, *Exer.* pag. 16. *Cebus-papio*. Babon. *Hyana Gesneri*. Klein, *de quadrup.* pag. 89. *Babouin*. Mem. di Kolbe, Tom. III. pag. 55. *Babouin*. Brisson, *Regn. anim.* pag. 192.

Tutte le specie di scimie, che non han coda, o cortissima, non rinvengonsi dunque che nel vecchio Mondo; e tra le specie, che hanno lunghe code, quasi tutte le scimie grandi si trovano in Africa: poche ve ne sono in America, che sian d'una mezzana grandezza, ma gli animali, che col nome generico di *picciole scimie con coda lunga* son disegnati, son quivi numerosissimi; queste specie di picciole scimie con coda lunga sono i sapajous, i sagouini, i tamarini ec. Nella Storia particolare, che noi faremo di questi animali, vedremo, che tutte le accennate scimie d'America sono diverse da quell'altre d'Africa, e d'Asia.

I makis (a), de' quali ne conosciamo tre, o quattro specie o varietà, che non poco somigliano alle scimie dalla coda lunga, avendo, com'esse, mani, col muso però più allungato, e più aguzzo, son essi pure animali particolari al vecchio continente, e non trovati nel nuovo. Così parimente tutti gli animali dell'Africa, o dell'Asia meridionale, che sono stati dinotati col nome di *scimie*, non trovansi in America, come neppur vi si trovano gli elefanti, i rinoceronti, o le tigri. Quante
C 5 mag-

(a) *Simia sciurus lanuginosus fuscus* Gr. Gazophil. Petiver; Tab. XVII. fig. V. *Prosimia fusca*. Il maki. Brisson, Regn. animal. pag. 220., e segg.

maggiori ricerche, ed esatte comparazioni su questo proposito si faranno, si vedrà sempre più chiaramente, che gli animali delle parti meridionali di ciascun continente non esistevan affatto nell'altro, e che il picciol numero di que', che oggidì vi si veggono, sonovi stati trasportati dagli uomini, come la pecora della Guinea, ch'è stata trasportata nel Brasile; il porco d'India, che al contrario è stato dal Brasile trasportato nella Guinea, e forse anche alcune altre specie di piccioli animali, la traslazione de' quali può essere stata agevolata dalla vicinanza, e dal commercio di queste due parti del mondo. Dalle coste del Brasile a quelle della Guinea vi sono circa cinquecento leghe di mare: da quelle del Perù a quelle dell'Indie orientali ve ne son più di due mila; dunque, tutti quegli animali, che per lor natura non possono resistere al clima del Nord, e quegli eziandio, che, potendovi resistere, non vi si posson però propagare, son da due o tre lati rinchiusi da mari, ch'essi non son capaci di traversare, e da un altro poi da terre troppo fredde, ch'essi non posson abitare senza perdervi la vita. Non bisogna dunque più oltre maravigliarsi di questo fatto generale, che a prima vista sembra molto strano, e di cui prima di noi non erasi tampoco immaginato, cioè, che niun animale della zona torrida dell'uno de' continenti fu trovato nell'altro.

Ani-

A N I M A L I

COMUNI AI DUE CONTINENTI:

Abbiam veduto dall'enumerazione precedente, che non solamente gli animali de' climi i più caldi dell'Africa, e dell'Asia mancano all'America, ma che vi mancano pure per la maggior parte queglii ancora de' climi temperati d'Europa. Non è già così degli animali, che possono facilmente resistere al freddo, e propagarsi ne' climi del Nord, mentre di questi se ne trovano molti nell'America Settentrionale; e benchè ciò non accada mai senza qualche differenza assai notabile, non si può ciò non ostante non considerarli, come gli stessi, e s'ha a credere, ch'eglino sian passati dall'uno all'altro continente per le terre del Nord forse tuttavia incognite, o piuttosto da tempo antico sommerse; e questa prova ricevuta dalla Storia Naturale dimostra la contiguità quasi continua de' due continenti verso il Nord, meglio di tutte le conghietture della Geografia speculativa.

Gli orsi degl'Illinesi, della Lunigiana ec. par che sian gli stessi degli orsi nostrali, con questo divario solamente che quei son più piccioli, e più neri.

Il cervo del Canada, quantunque più piccolo del nostrale, non ne varia nel resto, che per la maggior altezza delle corna, che son anche più ramosi, e per la coda, ch'è più lunga.

Lo stesso è del cavriuolo, che rinviensi al mezzodì del Canada, e nella Lunigiana, ch'è parimente più picciolo, ed ha la coda più lunga del cavriuolo d'Europa, e anche dell' *Originale*, ch'è un animale simile all' *elano*, ma che non è però tanto grande.

Il renne di Lapponia, il daino di Groenlandia, e l' *karibu* del Canada, parmi che sian tutti un solo, e medesimo animale. Il daino o cervo di Groenlandia, descritto, e disegnato da Eduardo (a), ha troppa somiglianza col renne, perchè si possa riguardarlo, come componesse una specie diversa, e quanto poi al *karibu*, di cui non trovasi in verun luogo alcuna esatta descrizione, noi siam di parere, appoggiati a tutti quegli indizj, che potemmo raccogliere, esser questo lo stesso animale, ch'è il renne. Mr. Brisson (b) ha stimato doverne fare una specie diversa, riportando il *karibu* al *cervus Burgundicus* di Jonston; ma questo *cervus Burgundicus* è un animale inco-

(a) Vedi *A Natural History of birds*, By George Edwards. Londra 1743. pag. 51.

(b) Brisson, *Regn. animal.* pag. 91.

incognito, e che sicuramente non esiste nè in Borgogna, nè in Europa. Questo non è che un semplice nome dato a qualche testa di cervo, o di daino, che avesse strane corna; o veramente potrebb'esser, che la testa del Karibu veduta da Mr. Brisson, le corna del quale non erati dall'una, e dall'altra parte composte, che da un sol tronco diritto, lungo dieci pollici, con un ramo vicino alla base voltata innanzi, sia in fatti una testa di renne femmina, oppure una testa giovine d'uno o due anni; poichè si sa, che nella specie de' renni, la femmina porta un corno come il maschio, ma molto più picciolo, e che sì nell'uno, che nell'altra la direzione de' primi rami sporge all'innanzi; e finalmente, che in questi animali l'estensione, e le ramificazioni delle corna corrispondono esattamente alla progression degli anni, come avviene di tutti gli altri animali, che portan le corna.

Le lepri, gli scojattoli, i ricci, i ratti moscati, le lontre, le marmotte, i topi, i topo-ragni, i pipistrelli, le talpe son parimenti specie, che si potrebbero considerare come comuni ai due continenti, quantunque in tutti questi generi non abbiavi alcuna specie, che sia perfettamente simile in America a quelle d'Europa; e ben si vede ch'egli è molto difficile, per non dir impossibile, il decidere se queste sian positivamente-

mente specie diverse, o varietà soltanto della medesima specie, divenute costanti per l'influenza del clima.

I castori d'Europa pajon gli stessi di quei del Canada: questi animali aman meglio i paesi freddi, ma posson anche sussistere, e propagarsi ne' temperati: ve ne sono alcuni anche in Francia, nell'isole del Rodano, e per lo passato ve n'eran in molto maggior numero: e par, ch'essi amin ancor meno i paesi troppo popolati, che i troppo caldi, non fissando eglino mai il lor soggiorno, che in deserti segregati da ogni abitazione; e pur nel Canada, che s'ha parimente a considerare per un vasto deserto, si son eglino ritirati lungi dagli abitanti di tutta la Colonia.

I lupi, e le volpi son essi ancora animali comuni ai due continenti: trovansene in ogni parte dell'America settentrionale, ma con qualche dissimiglianza: sonovi soprattutto delle volpi, e de' lupi neri, e tutti sono colà ordinariamente più piccioli, che in Europa, come lo sono poi anche tutti gli altri animali, tanto i naturali al paese, quanto que', che vi furon trasportati.

Quantunque la donnola, e l'armellino frequentino i paesi freddi nell'Europa, son essi nondimeno rarissim' in America: non è però assolutamente lo stesso delle martore, delle faine, e delle puzzole.

La martora del Nord dell'America par
la

la stessa che quella del nostro settentrione: il vison del Canada rassomiglia molto alla faina: e 'l gatto selvatico vergato dell' America Settentrionale non è forse, che una varietà della specie del gatto selvatico d' Europa.

La lince, o lupo-cerviero, che trovasi in America egualmente, che in Europa, ci sembra un'istesso animale: questo abita più volentieri i paesi freddi, ma non lascia però di vivere, e di propagarsi sotto i climi temperati; e d'ordinario sta ne' boschi, e sulle montagne.

La foca, o sia vitello-marino sembra confinato, e circoscritto a' paesi del Nord, e pure trovasi egualmente sulle coste settentrionali d' Europa, e d' America.

Ecco, presso a poco tutti gli animali, che si possono considerare come comuni ai due continenti del mondo antico, e del nuovo; e da questo numero, che, come ben si vede, non è poi troppo grande, bisogna levarne forse anche più d'un terzo, le specie de' quali, benchè molto simili in apparenza, potrebbero forse esser realmente diverse. Ma ammettendo pure, che tutti questi animali fossero specificamente gli stessi di que' d' Europa, si vede molto bene, che il numero di tali specie comuni ai due continenti è assai picciolo in paragone di quello delle specie, che son proprie, e particolari a ciascuno dei due: vedesi in oltre, che tra tutti questi

questi animali , i soli , che abitano , o frequentano le terre del Nord , sono comuni ai due mondi , e che niuno di quelli , che non possono moltiplicarsi , che ne' paesi caldi o temperati , esiste in tutti e due ad un istesso tempo .

Non è più dunque da dubitarsi , che i due continenti non s'iano , o non s'iano stati contigui verso il settentrione , e che gli animali , che lor sono comuni , non s'ian passati dall' uno all' altro per terre , che a noi sono incognite . Si potrebbe creder con fondamento , soprattutto dopo le nuove scoperte dei Russi al Nord di Kamtschatka , che l' America abbia comunicazione coll' Asia per terre contigue ; e sembra al contrario , che il Nord dell' Europa sia ora , e lo sia stato sempre disgiunto e separato per mari bastevolmente vasti , poichè niuno animal quadrupede ha potuto varcarli : e pure gli animali del settentrione dell' America non sono precisamente quei del Nord dell' Asia , ma s' assomiglian piuttosto a que' del Nord d' Europa . Lo stesso è degli animali delle regioni temperate : l' argali (a) , il
zi-

(a) *Argali*, animal di Siberia , di cui il Sig. Gmelin da una bella descrizione nel primo Tomo de' suoi viaggi , pag. 368. , e ch' egli creder esser lo stesso che il *musimon*, o *mousson* degli Antichi . Di questo animale ha parlato Plinio , e Gesnero ne fa menzione della sua Storia dei quaprupedi , pag. 934. e 935.

ribellino, la talpa dorata della Siberia, il muschio della China non si trovano affatto alla baja d'Hudson, nè in alcun'altra parte del Nord-ouest del nuovo continente: trovansi al contrario nelle terre del Nord-est dell' America non solamente gli animali comuni, ~~quelle del~~ Settentrione dell' Europa, e dell' Asia, ma quegli ancora, che par, che sian particolari all' Europa sola, come l' elano, il renne ec. Ciò non ostante bisogna confessare, che le parti, orientali del Nord dell' Asia sono tuttavia sì poco cognite, che non puossi asserir con certezza se gli animali del Nord dell' Europa vi si trovino, o nò.

Noi abbiain osservato come cosa singolarissima, che nel nuovo continente gli animali delle provincie meridionali son picciolissimi riguardo a que'de' paesi caldi del continente antico. In fatti non v'è paragone alcuno tra la grandezza dell' elefante, del rinoceronte, dell' ippopotamo, della giraffa, del cammello, del leone, della tigre ec., tutti animali naturali e proprj all' antico continente, e la grandezza del tapir, del cabiai, del formichiere, del lama, del puma, del jaguar ec., che sono gli animali i più grandi del nuovo mondo: i primi son quattro, sei, otto, e fin dieci volte più grandi de' secondi. Un'altra osservazione, che convalida sempre più questo fatto generale, si è, che tutti gli animali, che sono stati tra-

spor-

sportati d'Europa in America, come i cavalli, gli asini, i buoi, le pecore, le capre, i porci, i cani ec., tutti questi animali, dico, son quivi diventati più piccioli; e che quei, che non vi sono stati trasportati, ma vi si sono trasferiti da se stessi, quegli in somma, che son comuni ai due mondi, come i lupi, le volpi, i cervi, i cavriuoli, gli elani, sono parimente molto più piccioli in America, che in Europa, e ciò senz'alcuna eccezione.

Dunque nella combinazion degli elementi, e delle altre cagioni fisiche, evvi nel nuovo mondo qualche cosa di contrario all'ingrandimento della Natura vivente: sonovi degli ostacoli allo sviluppamento, e forse alla formazione de' gran germi: quegli anche, che, per le sole influenze d'un altro clima, hanno ricevuta la loro forma compiuta, e la totale loro estensione, si racchiudono, s'impiccioliscono sotto quell' avaro cielo, e in quella rozza terra, ove l'uomo in picciol numero era sparso, errante; ove, lungi dal farla da padrone in quel territorio, come di suo dominio, egli non avea impero alcuno; ove, non avendosi mai assoggettati nè gli animali, nè gli elementi, non avendo nè domati i mari, nè diretti i fiumi, nè lavorata la terra, egli non era in se stesso, che un animale del prim'ordine, e non esisteva riguardo alla natura, che come una sostanza inconseguente, una specie d'
auto-

automa impotente, incapace di riformarla, o di ricondurla: essa l'avea trattato più da matrigna, che da madre, avendogli negato il sentimento d'amore, e'l vivo desiderio di moltiplicarsi. Poichè, quantunque il selvaggio del nuovo mondo sia presso a poco d'eguale statura a quella dell'uomo del nostro, ciò non basta, perchè possa egli far un'eccezione al fatto generale, che risguarda la natura vivente impiccolita in tutto quel continente: il selvaggio è debole, e piccolo per gli organi della generazione: non ha nè pelo nè barba, nè ardor veruno per la femmina: benchè più leggiere dell' Europeo, perchè è più abituato al corso, egli è nondimeno assai più debole di corpo; egli è parimente molto meno sensibile, ma tuttavia più pauroso, e codardo: egli non ha nè vivacità, nè attività alcuna nell'anima; quella del corpo può meglio chiamarsi una necessità d'azione cagionata dal bisogno, che un esercizio, un movimento volontario: toglietegli la fame, e la sete, voi distruggerete nel punto stesso il principio attivo di tutt'i suoi movimenti; egli resterà stupidamente in riposo sulle sue gambe, o coricato per lo spazio di giorni interi, Non fa d'uopo cercar più da lungi la cagione della vita errante, e dispersa de' selvaggi, e della loro alienazione per la società: egli no, fuon privati della più preziosa scintilla del fuoco della Natura; essi mancano di calore

lore per le loro femmina , e conseguentemente d'amore pe' loro simili : non conoscendo l'affetto, l'attaccamento il più vivo, e'l più tenero di tutti, gli altri loro sentimenti di questo genere son languidi, e freddi: essi aman debolmente i loro padri, e i figliuoli: la società la più intima di tutte, quella della stessa famiglia, non ha dunque tra loro, che deboli legami; la società d'una famiglia con un'altra non ne ha poi pur uno: quindi niuna unione, niuna repubblica, niuno stato sociale. Il fisico dell'amore fa tra loro il moral de' costumi: il loro cuor è agghiacciato, la società è fredda, e l'impero è duro. Essi non riguardano le loro femmine, che come altrettante schiave condannate, o come bestie da soma, ch'essi caricano, senza riguardo, del peso della lor caccia, e che sforzano senza pietà e senza mercede a servigi talvolta eccedenti le loro forze: essi non hanno, che pochi figliuoli, e di questi pigliansi poca briga: tutto risente del loro principal difetto; egli-
no sono indifferenti, perchè possono poco, e quest'indifferenza pel sesso è la macchia originale, che munge la Natura, che le vieta di dilatarsi, e che, distruggendo i germi della vita, taglia nel tempo istesso la radice della società.

L'uomo non fa dunque eccezione alcuna in questo caso. La Natura, avendogli ricusate le potenze dell'amore, lo ha più maltrat-

trattato, e più impicciolito d' ogni altro animale: ma prima d' esporre le cagioni di quest' effetto generale, noi non dobbiam in verun conto dissimulare, che se la Natura ha impiccioliti nel nuovo mondo tutti gli animali quadrupedi, par, ch' ell' abbia mantenuti i rettili, e ingranditi gl' insetti; poichè quantunque nel Senegal fianvi tuttavia delle lucertole più grosse, e de' più lunghi serpenti che nell' America meridionale, non v' è però a un di presso la medesima differenza tra questi animali, come tra i quadrupedi; il più grosso serpente del Senegal non è già grande il doppio della gran biscia di Cajenna, laddove un elefante è forse dieci volte più grosso del tapir, che, come già dicemmo, è il più gran quadrupede dell' America meridionale; ma riguardo agl' insetti, si può dir che in niuna parte son essi così grandi, come nel nuovo mondo. I più grossi ragnateli, i più grandi scarafaggi, i bruchi più lunghi, e le più larghe farfalle trovansi nel Brasile, a Cajenna, e nell' altre provincie dell' America meridionale: essi sorpassano quasi tutti gl' insetti del vecchio mondo non solamente per la grandezza del corpo, e delle ali, ma eziandio per la vivezza de' colori, pel lor miscuglio, per la varietà delle forme, pel numero delle specie, e per la prodigiosa moltiplicazione degl' individui di ciascuna. I rospi, le rane, e le altre bestie di tal genere, sono parimenti grossi-

lissi-

fissime in America. Noi non farem quì parola degli uccelli, nè de' pesci, perchè potendo essi passar da un mondo all' altro, faria quas' impossibile distinguere quali propriamente appartegano all' uno, e quali all' altro; quando al contrario gl' insetti, e i rettili sono presso a poco come i quadrupedi, circoscritti ciascuno nel proprio continente.

Veggiamo dunque, perchè in quel nuovo continente i rettili son così grandi, gl' insetti coranto grossi, i quadrupedi piccoli, e gli uomini così freddi. Ciò dipende dalla qualità della terra, dalla condizion dell' aria, dal grado di calore, e da quello d' umidità, dalla situazione, e dall' altezza delle montagne, dalla quantità delle acque correnti, o stagnanti, dall' estensione delle foreste, e soprattutto dallo stato rozzo in cui vi si vede la Natura. Il calor è generalmente molto minore in quella parte di mondo, e molto maggiore l' umidità: se si paragona il freddo e' l' caldo in tutt' i gradi di latitudine, troverassi che a Québec, val a dire sotto la latitudine di Parigi, l' acqua de' fiumi gela tutti gli anni ad alcuni piè di grossezza; che un ammasso ancor più grosso di neve copre quivi la terra per molti mesi; che l' aria v' è così fredda; che tutti gli uccelli fuggono, e spariscono per fin che dura l' inverno ec. Questa diversità di temperamento sotto la stessa latitudine nella zona temperata, quantunque grandissima, è forse

anche minore di quella del calore sotto la zona torrida: si brucia nel Senegal, e pur sotto la medesima linea si gode una dolce temperie nel Perù: lo stesso è sotto tutte le altre latitudini, di cui si vorrà far confronto. Il continente dell' America è situato, e formato in modo tale, che ogni cosa concorre a diminuire l'azion del calore: ivi trovansi le più elevate montagne, e per conseguenza i più gran fiumi del mondo: queste alte montagne formano una catena, che par che circoscriva verso Ponente il continente in tutta la sua lunghezza: le pianure, e le valli sono situate tutte al di quà delle montagne, e si stendono dalle falde di queste sino al mare, che dalla nostra banda separa i continenti; quindi il vento d' Est, che come si fa è il vento costante, e generale fra i tropici, non arriva in America, che dopo aver traversata una vastissima estension d' acqua, sulla quale si va rinfrescando; e per questa ragione nel Brasile, ed in Cajenna ec. fa molto men caldo, che nel Senegal, nella Guinea ec. dove questo stesso vento d' Est giugne carico del calore di tutte le terre, e di tutte le sabbie cocenti, ch'esso scorre in traversando l' Africa, e l' Asia. Richiamasi alla memoria ciò che noi dicemmo riguardo alla differenza del color degli uomini, e particolarmente di quello de' Nègri, e pare che siasi dimostrato che la tinta più o men viva del tanè, del bruno, e del

e del nero dipende interamente dalla situazione del clima; che i Negri della Nigritia, e quei della costa occidentale dell' Africa sono i più neri di tutti, perchè quelle contrade sono situate in modo, che il calore vi è costantemente maggiore, che in qualsivoglia altro luogo del globo, dovendo il vento d' Est, prima di arrivarvi, traversare passi di terre immense; che gl' Indiani meridionali all' opposto non sono che tanè, o sia olivastri, e bruni i Brasiliani, benchè sotto egual latitudine dei Negri, perchè il calore del loro clima è minore, e meno costante, non arrivando colà il vento d' Est, che dopo d' essersi rinfrescato sopra le acque, e caricato d' umidi vapori. Le nuvole, che intercettano la luce, e' l' calor del sole, le piogge, che rinfrescano l' aria e la superficie della terra, sono periodiche, e durano parecchi mesi a Cajenna, e in tutte le altre contrade dell' America meridionale. Questa prima cagione rende dunque tutte le coste orientali dell' America molto più temperate dell' Africa, e dell' Asia; e quando, dopo esser arrivato fresco sulle dette coste il vento d' Est, comincia a ripigliare un grado più vivo di calore col traversar le pianure dell' America, esso è tutto ad un tratto arrestato, e raffreddato da quella catena di smisurate montagne delle quali è composta tutta la parte occidentale del nuovo continente, in maniera che fa anche men caldo sotto la Linea nel

Pe-

Perù, che nel Brasile, e a Cajenna. ecc. poichè le terre sono ivi assai elevate; perciò i naturali del Perù, del Chili e. non sono, che d'un bruno rosso, e d'un tanè (bruno) men oscuro di quello de' Brasiliani. Sopprimiamo per un istante la catena delle Cordilliere, o riabbassiam piuttosto quelle montagne a livello delle adiacenti pianure, il calore sarebbe stato eccessivo verso quelle terre occidentali, e si sarebber trovati gli uomini neri nel Perù, e nel Chili tali quali trovansi sulle coste occidentali dell' Africa.

Dunque per la sola disposizion delle terre d'esso nuovo continente, il calore vi sarebbe molto minore, che non è nell' antico; ma nel tempo stesso noi veggiamo bene, che l'umidità è quivi assai maggiore. Le montagne essendo le più alte di tutta la terra, e trovandosi opposte di fronte alla direzione del vento d' Est, arrestano, e condensano tutt' i vapori dell' aria, e producono per conseguenza una quantità infinita di vive sorgenti, che per la loro unione formano ben tosto fiumi i più grandi del mondo: v'è dunque molto più acqua corrente nel nuovo mondo, che nell' antico; data la proporzion dello spazio; e questa quantità d'acqua trovasi eziandio prodigiosamente aumentata per non poter colare. Non avendo gli uomini nè messi argini ai torrenti, nè data direzione ai fiumi, nè asciugate le paludi, le acque stagnanti cuoprono immense terre, ac-

crefcono ancora l'umidità dell'aria, e ne fcemano il calore: oltracciò, effendo la terra dappertutto incolta, e coverta in tutta la fua eftenfione d'erbe groffolane, dense, e folte, effa non ifcaldafi, nè fi fecca giammai: la traspirazione di tanti vegetabili, fretti gli uni contra gli altri, non produce, ch'efalazioni umide, e malfane: la Natura, nafcofta fotto gli antichi fnoi veltimenti, non mife mai in mofta abbigliamenti nuovi in quelle infelici contrade; non effendo nè accarezata, nè coltivata dall'uomo; non avea giammai aperto il benefico fuo feno; la terra non avea giammai veduta la fua fuperficie indorata di quelle ricche fpighe, che fanno la nofta opulenza, e la fua fecondità. In quefto ftato d'abbandono, tutto languifce; tutto fi corrompe, tutto fi foffoca: l'aria, e la terra, caricate più del folito di vapori umidi e nocivi, non poffono purificarfi, nè profittar delle influenze dell'afiro della vita: il Sole vibra indarno i fnoi più penetranti raggi fu quella fredda maffa, incapace di corrifpondere all'ardor di lui: effa non produrrà, che foftanze umide, piante, rettili, infetti; nè potrà nudrire, che uomini freddi, e deboli animali.

Quefta è la ragione principale, per cui v'eran pochi uomini in America, e per la quale (la maggior parte di tali uomini, menando una vita animalesca, lasciavano rozza la natura, e trafeuravan la terra) ch'ella

ella è restata fredda, imponente a produrre i principj attivi, ed a sviluppare i germi de' più gran quadrupedi, ai quali fa bisogno, per crescere, e moltiplicarsi, tutto il calore, tutta l'attività, che il sole può dare alla terra amorosa; e per una ragion contraria è, che gl' insetti, i rettili, e tutte le specie d' animali, che si strascinano nel fango, il sangue de' quali è d' acqua, e che pullulano dalla putredine, sono più numerosi, e più grandi in tutte le terre basse, umide, e paludose di quel nuovo continente.

Chiunque riflette a queste differenze sì chiare, che passano tra l' antico, e l' nuovo Mondo, sarebbe quasi tentato di credere, che quest' ultimo sia in fatti molto più recente, e che più lungamente, che il resto del globo, sia giaciuto sotto le acque del mare; poichè, trattene le smisurate montagne, che lo limitano verso l' Ovest, e che sembra che sian monumenti della più lontana antichità del globo, tutte le parti basse di tal nuovo continente pajono terreni alzati di fresco, e formati dalla deposizione de' fiumi, e dal fango delle acque: vi si trovan di fatti in molti luoghi, sotto il primo strato della terra vegetale, le conchiglie, e le madreperle del mare, formanti di già de' banchi, delle masse di pietre calcinacee, ma d' ordinario men dure, e meno compatte delle nostre pietre da taglio, che sono della natura medesima. Se questo nuovo continente è realmente

così antico quanto l'altro, perchè mai vi si son trovati sì pochi uomini? perchè mai eran essi quivi quasi tutti selvaggi e dispersi? perchè mai quelli, che s'erano uniti in società, i Messicani, e i Peruviani, non contavan eglino, che ducento, o trecent'anni dal primo uomo, che gli avea radunati insieme? perchè mai ignoravan essi tuttavia l'arte di tramandare alla posterità i fatti per mezzo di segni durevoli, giacchè eglino avean di già trovata quella di comunicarsi da lungi le loro idee, e di scriversi coll'annodar de' cordoni? perchè mai non s'avean eglino sot-tomessi gli animali, e non valevanfi, che del lama, e del pacos, che non eran affatto, come i nostri animali domestici, permanenti, fedeli, e docili? le loro arti erano, come la lor società, nascenti, i talenti imperfetti, le idee non isviluppate, rozzi gli organi, e barbara la lingua: gettinsi gli occhi sulla lista degli animali (a), e si vedrà che i loro nomi-

(a) *Pelon ichiatl oquitli*. — Il lama.

Tapierette nel Brasile, *maypoura* o *manipouris* nella Guiana. — Il tapir.

Tamandua guacu nel Brasile, *ouariri* nella Guiana. — Il tamanoir.

Ouatirionauon nella Guiana — Il formichiere, *Ouairakè* nella Guiana, *ai* o *bai* nel Brasile. — Il pigro.

Miotocbri nel Messico, *tata* o *tatupeba* nel Brasile,

mi sono quasi tutti così difficili a pronunziarsi, che è strano, che gli Europei sianfi presi la pena di scriverli.

Ogni cosa dunque par, che mostri, che gli Americani fossero uomini nuovi, o, per meglio dire, uomini da così gran tempo lontani dal lor paese, che avean perduta ogni nozione, ogn'idea di quel Mondo, ond'erano usciti. Tutto parimente par che s'accordi a provare, che la maggior parte dei continenti dell'America era una terra nuova; anche fuori della mano dell'uomo, ed in cui la natura non avea peranche avuto agio

D 3

di

file, *chirquinebum* nella nuova Spagna.

Il taton, o armadillo.

Tatu-ete nel Brasile, *taton-kabuffon* nella Guiana. ... Il tautetto.

Macatlebicbiltic, o *temamacama*, animale, che rassomiglia per alcuni riguardi alla gazzella, e che finora non ha altro nome, che quello di gazzella della nuova Spagna.

Jiga o *carigueibeju*, animale, che rassomiglia alla lontra, e che perciò è stato chiamato lontra del Brasile.

Quaubtla coymatl o *quapizotl* nel Messico, o *caaigoara* nel Brasile. ... Il-tajacù.

Tlacoozotl, o *tlalocotl*, ... Il gatto pardo.

Cabionara o *capybara*. Il cabiai.

Tlatlahuqn o *ocotl* nel Messico, *janowaya* o *jaguara* nel Brasile. Il jaguar.

Cui

di stabilire tutt' i suoi piani , nè quello di sviluppars' in tutta la sua estensione ; che gli uomini son quivi freddi , e piccioli gli animali , perchè l' ardore di quelli , e la grandezza di questi dipendono dalla salubrità , e dal calore dell' aria ; e che in qualche secolo , quando si faranno coltivate le terre , abbattute le foreste , dirett' i fiumi , e fatti argini all' acque , questa medesima terra di-

ver-

Cugnaou ayana , o *cugnacu aya* , o *congouacon-aya* Il cuguar .

Toaquatzin nel Messico , *aonard* nella Guiana , *carigueya* nel Brasile Il filandro .

Hoirzlaquatzin , animale che rassomiglia all' istrice , e che finora non ha altro nome , che d' *istrice della nuova Spagna* .

Cuandu o *gonandou* , animale che rassomiglia parimenti all' istrice , che si è chiamato *istrice del Brasile* , e che fors' è lo stesso , che il precedente .

Teje maxlatan nel Messico , *maragua* o *maracata* nel Brasile Il maracco . Quest' animale ha la pelle macchiata , come quella d' una pantera ; è della forma , e della grossezza d' un gatto ; e impropriamente è stato chiamato *gatto-tigre* o *gatto selvaggio tigrato* , poichè il suo mantello è macchiato come quello della pantera , e non già come quello della tigre .

Quauhtechaltotl ibilitic o *ibilocotequillin* , anima-

ma-

verrà la più feconda, la più sana, e la più ricca di tutte, come par che lo sia di già in tutte quelle parti, cui l'uomo s'è messo a coltivare. Per altro, noi non vogliam contuttociò conchiudeme, che allora vi nasceranno animali più grandi: il tapir, e l' cabiai non arriveranno giammai alla statura dell' elefante, o dell' ippopotamo; ma gli animali almeno, che vi si trasporteranno, non diminuiranno niente in grandezza, com' è ad essi accaduto ne' primi tempi: l'uomo riempierà a poco a poco il voto di quelle immense terre, che non erano, che un de-

D 4

fer-

male, che rassomiglia allo scojattolo, e che finora non ha altro nome, che quello di *scojattolo nero*.

Quimiebpatlan, o *assapanick*, animale che rassomiglia allo scojattolo volante, e che forse è lo stesso.

Yzquiepatl. La *muffetta*. Questo è un animale, che si è chiamato *piccola volpe*, *volpe d' India*, *tasso di Surinam*, ma che non è nè volpe, nè tasso; egli tramanda un pestifero odore, e che ammorza anche ad una distanza notabile; perciò noi lo chiameremo la *muffetta*.

Coloitzcuinili, o *cueluchili*, animale, che ha qualche rassomiglianza col lupo, e che finora non ha altro nome, che quello di *lupo del Messico*, ec.

ferto, quando se ne fece la scoperta.

I primi Storici, che hanno scritte le conquiste degli Spagnuoli, hanno, per aumentar la gloria delle lor armi, prodigiosamente esagerato il numero de' loro nemici: ma questi Storici potranno eglino persuadere ad un uomo sensato, che v' erano milioni d'uomini a San Domingo, e a Cuba, quando nel tempo stesso dicono, che fra tutti questi uomini non v' era nè monarchia, nè repubblica, e forse nè anche società alcuna? e quando si sa in oltre, che in quelle due grand' isole vicine l'una all'altra, ed insieme poco lontane dalla terra ferma del continente, non v' erano in tutto che cinque specie d' animali quadrupedi, la più grande delle quali era presso a poco della grandezza d' uno scojattolo, o d' un coniglio? Questo fatto prova ad evidenza quanto la Natura fosse vile, e deserta in quella nuova terra. „ Nell' isola di San „ Domingo non si trovarono, dice Laet, che „ ben poche specie d' animali a quattro „ piedi, come l' *hutias*, ch' è un piccol „ animale poco diverso da' nostri conigli, „ ma anche un po' più piccolo, con le orecchie „ più corte, e con la coda da talpa... Il „ *chemi*, ch' è quasi della medesima forma, „ ma un po' più grande dell' *hutias*.... Il „ *mohui*, un po' più piccolo dell' *hutias*... „ Il *cori*, simile al coniglio in grandezza, „ con la bocca come la talpa, senza coda, „ col-

„ colle gambe corte : di questo ve ne sono
 „ bianchi, e neri, e in maggior copia di
 „ misti dell' uno, e dell' altro colore : è
 „ un animal domestico, e assai famiglia-
 „ re . . . Di più, una picciola specie di
 „ cani, ch' erano affatto mutoli : oggidì
 „ sonovi pochissimi di tutti questi animali,
 „ perchè i cani d' Europa gli hanno di-
 „ strutti (a). Nell' isole di San Domingo,
 „ e di Cuba, come pure nelle Antille,
 „ non v' era, dice Acosta, quasi alcuno de-
 „ gli animali del nuovo continente d' Ame-
 „ rica, e neppur uno degli animali simi-
 „ li a quei d' Europa (b) . . . Quanto v'
 „ è nelle Antille, dice il P. du Tertre,
 „ di montoni, di capre, di cavalli, di buoi
 „ d' asini, tanto nella Guadalupa, che
 „ nelle altre isole abitate dai Francesi, tut-
 „ to vi fu portato da questi : e gli Spagnuo-
 „ li non ve n' hanno portato alcuno, come
 „ fecero nelle altre isole ; tanto che le
 „ Antille essendo in quel tempo tutte ri-

D. 5

„ co-

(a) Vedi la Storia del nuovo Mondo, di
 Gio: di Laet : Leida 1640. lib. I. cap. IV.
 pag. 5. Vedi pure la Storia dell' Isola di
 San Domingo, del P. Charlevoix. Parigi
 1730. Tom. I. pag. 35.

(b) Vedi la Storia Naturale delle Indie, di
 Giuseppe Acosta, traduzione di Renaud.
 Parigi 1600. pag. 144. e segu.

„ coperte di boschi, il bestiami non avreb-
 „ be potuto sussistervi senza erbaggi (a) “. Mr. Fabry, di cui ho avuta occasione di parlare in quest' opera, che avea girato per lo spazio di quindici mesi le terre dell' Ovest dell' America, al di là dal fiume Mississipi, m' ha assicurato, che avea fatte spesse volte trecento, e quattrocento leghe senza neppur incontrar un sol uomo. I nostri Ufficiali, che sono stati da Quebec alla bella riviera d' Ohio, e da questa riviera alla Lunigiana, convengon tutti, che si potrebbe spesso far cento, e dugento leghe fin dentro le terre senza incontrare una sola famiglia di selvaggi: tutte queste testimonianze fanno abbastanza vedere fino a qual segno la Natura è deserta nelle stesse contrade di quel nuovo continente, nelle quali il temperamento del clima è più dolce, e piacevole. Ma ciò ch' eglino c' insegnano di più particolare, è che più fa al nostro caso, si è, che bisogna diffidare delle posteriori testimonianze di que' che descrivono Gabinetti, o dei Nomenclatori, che suppongono quel nuovo Mondo popolato d' animali, che non si trovano che nell' antico, e che ne disegna-

(a) Vedi la Storia Generale delle Antille, del P. du Tertre. Parigi 1667. Tom. II. pag. 289., e segg. ove si dee notare, che vi son molte cose prese da Giuseppe Acosta.

gnano altri, come originarj di certe tali contrade, dove per altro non vi sono stati giammai. Per esempio, egli è chiaro, e indubitato, che nell' isola di San Domingo non v'era originariamente alcun animale quadrupede più forte d'un coniglio: egli è parimente sicuro, che quando anche ve ne fossero stati, i canj europei, divenuti selvatici, e maligni come lupi, gli avrebber distrutti: ciò non ostante s'è dato il nome di *gatto-tigre*, o di *gatto-tigrato* (a) di San Domingo al *maraco*, o *maracaia* del Brasile, che non ritrovasi altrove, che nella terra ferma del continente. S'è detto che la *lucertola scagliosa*, o sia *Diavolo di Giava* si trovava in America, e che i Brasiliani la chiamavan *tatou* (b), quando che non trovasi, che nell' Indie orientali: s'è preteso che il Zibetto (c), ch'è un animale delle parti meridionali dell' antico continente, si trovasse anche nel nuovo, e nella nuova Spagna specialmente, senza riflettere che i Zibetti essendo animali utili, e che s'allevano in molti luoghi dell' Africa, del Levante, e dell' Indie, come animali domestici donde raccoglierne il profumo, del quale se ne fa gran mercatanzia, gli Spagnoli

D 6

gno-

(a) *Felis Silvestris*, *Tigrenus* in Spagnolo Seba, Vol. I. pag. 77.

(b) Seba, Vol. I. pag. 88.

(c) Brisson, *Regn. animal.* pag. 258.

gnuoli non avrebber trascurato certamente di trarne lo stesso profitto, e di farne ugual commercio, se il Zibetto si fosse realmente trovato nella nuova Spagna.

Nello stesso modo, che i Nomenclatori hanno talvolta a capriccio popolato il nuovo mondo d'animali, che non si trovano che nell'antico continente, essi hanno parimente trasportato in questo quei dell'altro: hanno dunque messi dei filandri nell'Indie orientali, anche in Amboina (a), de' pigri a Ceylan (b); eppure il filandro, e i pigri sono animali d'America sì ragguardevoli, l'uno per la specie di sacco che ha sotto il ventre, e dentro di cui porta i suoi figli, l'altro per l'eccessiva lentezza del cammino, e di tutt' i suoi movimenti, di maniera che, se realmente si fossero trovati nell'Indie Orientali, non sarebbe stato credibile, che i Viaggiatori non ne avesser fatta menzione. Seba s'appoggia alla testimonianza di Francesco Valentini riguardo al filandro dell'Indie orientali; ma quest' autorità diventa, per così dire, nulla, poichè questo Francesco Valentini avea sì poca cognizione degli animali, e dei pesci d'Amboina, o perchè le sue descrizioni sono sì cat-

(a) Seba, *Vol. I.* pag. 61. e 64.

(b) *Idem ibid.* pag. 54.

cattive, che Artedi ne lo rimprovera, e dichiara esser impossibile di riconoscerli dalle notizie, ch'egli ce ne dà.

Del resto, noi non pretendiamo già di assicurare assertivamente, ed in generale, che di tutti gli animali, che abitano i climi i più caldi dell' uno o dell' altro continente, non se ne trovi alcuno in ambedue nel tempo stesso: per esserne fisicamente certo, bisognerebbe averli veduti tutti. Noi pretendiamo soltanto d' esserne moralmente sicuri, poichè ciò è manifesto, e chiaro riguardo a tutti gli animali grandi, che soli sono stati ben compresi, e ben disegnati dai Viaggiatori; è chiaro anche ciò riguardo alla maggior parte de' piccioli: e pochi finalmente ne rimangono, su de' quali non possiamo proferir sentenza. Per altro, quando in questo particolare vi fossero alcune evidenti eccezioni (che non mi fido d'immaginare) esse non apparterrebbero, che ad un picciolissimo numero d' animali, e non distruggerebber in verun conto la legge generale or ora da me stabilita, e che mi par che sia l' unica guida, che ci possa condurre alla cognizion degli animali. Questa legge, che si riduce a giudicare d' essi tanto pel clima, e pel naturale, quanto per la figura, e per la struttura, si troverà ben di rado mancante, e difettosa, e ci farà prevenire, o scoprire molte fallacie. Supponghiamo, per cagion d' esempio, che accada la quistione
in-

intorno ad un animale dell' Arabia, come sarebbe l' Iena, noi potremo assicurare, senza timor d' ingannarci, che quest' animale non si trova affatto nella Lapponia, e noi non diremo già, come alcuni de' nostri Naturalisti, che l' iena (a), e l' ghiottone siano uno stesso animale. Noi non diremo già con Kolbe (b), che la volpe *croisé*, o sia a *macchie incrociellate*, che abita le parti più boreali dell' antico, e del nuovo continente, trovisi nel tempo stesso al Capo di Buona-Speranza, troveremo anzi che l' animale, di cui egli parla, non è già una volpe, ma bensì uno sciacal. Noi riconosceremo, che l' animale del Capo di Buona-Speranza, che il medesimo Autore dinota sotto il nome di porco terrestre, e che vive di formiche, non dee confondersi coi formichieri d' America, e che in fatti quest' animale del Capo è verosimilmente la lucertola scagliosa (c), la quale non ha di comune coi formichieri, che l' istinto di mangiar formiche.

(a) Vedi il Regno animale, del Sig. Brisson pag. 234.

(b) Vedi la Descrizione del Capo di Buona-Speranza di Kolbe. Amsterdam 1741. Tom. III. pag. 62.

(c) Vedi la Descrizione del Capo di Buona-Speranza, di Kolbe. Amsterdam 1741. Tom. III. pag. 43.

he. Così, s'egli avesse riflettuto bene, che l'elano è un animale del settentrione (a), non avrebb'egli chiamato con questo nome un animale d'Africa, che non è che una gazzella. Il foca, che abita solamente le spiagge de' mari settentrionali, non dee già trovarsi al Capo di Buona-Speranza (b). La genetta, ch'è un animale della Spagna, dell'Asia minore ec., e che non trovasi altrove, che nell'antico continente, non s'ha a indicare col nome di *coati*, ch'è Americano, come in Mr. Klein si trova (c). L'*ysquiepati* del Messico, animale, che tramanda un odor pestifero, e che perciò noi chiamerem *muffetta*, non s'ha già a prendere per una picciola volpe, o per un tasso (d). Il *coati-mondi* d'America non va mica confuso, come ha fatto Aldrovandi (e), col tasso-porco, di cui non s'è giammai parlato, che come d'un animale d'Europa. Ma non

(a) *Idem*, *ibid.* pag. 128. Vedi pure il Regno animale ec.

(b) Vedi il Regno animale, del Sig. Brisson pag. 230. ov'egli dice, dopo Kolbe, che dagli abitanti del Capo di Buona-Speranza il foca chiamasi *can-marino*.

(c) Vedi Klein, *de quadrup.* pag. 63.

(d) Vedi Seba, *Vol. I.* pag. 68. e ed il Regno animale, del Sig. Brisson pag. 255.

(e) Vedi Aldrovand. *quadrup. digit.* pag. 267.

non è mio assunto d'indicar quì tutti gli errori della nomenclatura de' quadrupedi; io vò soltanto provare, che ve ne sarebber meno, se si fosse fatta qualche attenzione alla diversità de' climi. Se nella Storia degli animali si fusse fatto studio bastante per riconoscere, come noi abbiám fatto i primi, che quei delle parti meridionali di ciascun continente, non si trovano già in tutt'edue ad una volta; e se finalmente si fusse nel tempo stesso tralasciato di crear nomi generici, che confondono insieme una gran quantità di specie, non solamente diverse, ma spesso disparatissime fra di loro.

Lo scopo giusto, e lodevole d'un Nomenclatore non consiste già in questo caso nel far delle ricerche per allungar la sua lista, ma nel far anzi de' paragoni ragionati per abbreviarla. Nulla è più facile, che il pigliare da tutti gli Autori, che hanno scritto degli animali, i nomi, e le frasi per farne una tavola, che diverrà tanto più lunga, quanto s'elaminerà meno: nulla è più difficile, che il paragonare tai nomi col discernimento necessario per ridurre questa tale tavola alla sua giusta misura. Io il ripeto, non v'ha in tutta la terra abitabile, e conosciuta dugento specie d'animali quadrupedi, comprendendovi anche le scimie in numero di quaranta: dunque altro non s'ha a fare, che assegnare a ciascuno d'essi il lor nome; e per possedere perfetta-

men-

mente questa nomenclatura, d'altro non sarà d'uopo, che d'un uso ben mediocre della propria memoria, poichè tutto si ridurrà unicamente a ritenere questi dugento nomi. A che serv'egli dunque l'aver fatte pe' quadrupedi e classi, e generi, e metodi finalmente, che non son altro, che punti d'appoggio immaginati per ajutar la memoria nella cognizion delle piante, il numero delle quali è in fatti troppo grande, le differenze troppo piccole, le specie molto poco costanti, e'l dettaglio troppo minuto e indifferente, perchè non s'abbiano a considerare in massa, e farne de' mucchi o de' generi, mettendo insieme quelle, che par che più s'affomiglino? Poichè, come in tutte le produzioni dello spirito, ciò ch'è assolutamente inutile, è sempre mal immaginato, e diviene spesso nocivo, così egli è avvenuto, che in vece d'una lista di dugento nomi, a cui tutta si riduce la nomenclatura de' quadrupedi, si son fatti Dizionarj sì copiosi di termini, e di frasi, che vi si richiede più fatica per disimbrogliarli, di quello che ne sia bisognata per comporli. A che fine crear un gergo, comporre frasi, quando si può parlar chiaro, col pronunziar un semplice nome? perchè mutar i termini comunemente ricevuti, sotto pretesto di formar classi, e generi? perchè mai, quando si fa un genere d'una dozzina d'animali, sotto il

no-

nome, per esempio, di *genere del coniglio*, lo stesso coniglio poi non vi si trova egli, e bisogn'andar a cercarlo nel genere della lepre (a). Egli è dunque assurdo, o, per dir meglio, è ben ridicolo il far classi, nelle quali si pongono insieme i generi più disparati tra loro, come per esempio il metter insieme nella prima l'uomo (b), e'l pipistrello, nella seconda l'elefante, e la lucertola scagliosa, nella terza il leone, e'l furetto, nella quarta il porco, e la talpa, nella quinta il rinoceronte, e'l ratto ec. Queste idee malconcepite non possono reggersi; quindi le opere, che le contengono sono successivamente distrutte da' loro stessi Autori: un'edizione contradice all'altra, e'l tutto non ha merito alcuno fuorchè nell'opinione di scolari, o di fanciulli, a guisa d'uccelli ingannati da una specie di mittero, ai quali l'arte metodica sembra scientifica, e che hanno finalmente tanto più di rispetto pe'l lor maestro, quanto egli ha più d'arte nel porgergli le cose più chiare, e più facili, sotto la più oscura, e più difficile prospettiva.

Confrontando la quarta edizione dell'Opera di Mr. Linneo colla decima da noi citata-

(a) Vedi Brisson, *Regn. animal.* p. 140. e 142.

(b) Vedi Linneo, *Syst. natur.* Holmiae 1758. Tom. I. pag. 18. e 19.

tata, l'uomo (a) non è già nella prima classe, val a dire, nel prim' ordine col pipistrello, ma colla lucertola scagliosa: l'elefante, il porco, il rinoceronte, in vece di trovarsi il primo colla lucertola scagliosa, il secondo colla talpa, e l' terzo col ratto, trovansi tutt' e tre insieme (b) col topo-ragno: in vece di cinque ordini, o classi principali (c), *antropomorpha*, *fera*, *glirès*, *jumenta*, *pecora*, ai quali egli aveva ridotti tutti i quadrupedi, l'Autore, in quest' ultima edizione, ne ha fatti sette (d), *primates*, *bruta*, *fera*, *bestia*, *glirès*, *pecora*, *bel-lua*. Da queste essenziali, e generalissime mutazioni, si può giudicar di tutte quelle, che si trovan ne' generi; e quanto le specie, che pur sono le sole cose reali, vi sian confuse, trasportate, e mal connesse. Vi son ora due specie d'uomini, l'uomo di giorno, e l'uomo di notte (e), *homo diurnus sapiens*; *homo nocturnus troglodites*: queste sono (f), dice l'Autore, due specie di-

(a) Vedi Linneo *Synt. nat. Holm.* 1744. pag. 64.

(b) Idem *ibid.* pag. 39.

(c) Idem *ibid.* pag. 63. e seguenti.

(d) Idem, *Syst. nat. edit. X. Holmiae* 1758. pag. 16. e 17.

(e) Idem *ibid.* pag. 20. e 24.

(f) *Speciem trogloditæ ab homine sapiente di-*
stin-

distintissime, e bisogna ben guardarsi dal credere, che questa non sia, che una mera varietà. Ma non è egli questo un aggiugnere favole ad assurdi? e puossi egli spacciare come parte principale del sistema della Natura, ciò, ch'è il risultato delle novelle di qualche donnicciuola, o delle false visioni d'alcuni Viaggiatori poco degni di fede? in oltre, non farebb'egli meglio tacer di quelle cose, che s'ignorano, che stabilire caratteri essenziali, e generali differenze sopra grossolani errori, assicurando per esempio, che in tutti gli *animali con mammelle*, la sola femmina (a) ha una clitoride; laddove noi sappiamo per la notomia di più di cento specie d'animali, che noi abbiám veduto fare, che la clitoride non manca ad alcuna femmina? Ma io so què fine a questa critica, che tuttavia potrebb'esser molto più lunga, giacchè non è ella al presente il principale mio scopo: io ne ho detto abbastanza, perchè altri si faccia avveduto contrò gli errori sì generali, che particolari, che non si trovano altrove in sì gran nu-

finetissimam, nec nostri generis illam, nec sanguinis esse, statura quamvis simillimam dubium non est, ne itaque varietatem credas quam vel sola membrana nictitans absolute negat. Linneo, Syst. nat. Edit. X, pag. 54.
 (a) Idem ibid. pag. 24. e 25.

numero fuorchè in cotali opere di nomenclatura, perchè volendovi ogni cosa comprendere, bisogna necessariamente unir tutto ciò che non si sa affatto, a quel poco, che si sa.

Facendo dunque alcune general' induzioni da tutto ciò, che da noi s'è detto, troveremo che l'uomo è l'unico tra le sostanze viventi, la cui natura sia bastevolmente forte, estesa, e flessibile per poter sussistere e propagarsi per ognidove, e adattarsi agl'influssi di tutt' i climi della terra: comprenderemo ad evidenza, che niuno tra gli animali ha ottenuto questo gran privilegio; che, lungi dal potersi dappertutto moltiplicare, la più parte d'essi sono ristretti, e circoscritti a climi particolari, e finanche a particolari contrade. L'uomo è per ogni riguardo un' opera celeste: gli animali non sono per molti capi, che produzioni della terra: quei d' un continente non si trovano certo nell' altro: quei che vi si trovano, sono alterati, impiccioliti, e spesso mutati a segno da non si poter più conoscere: or che vi vuol egli di più per esser convinto, che il modello della lor forma non è già inalterabile? che la lor natura, molto meno durevole di quella dell' uomo, può col tratto del tempo variare, ed anche cambiarsi assolutamente? e che per la stessa ragione, le specie meno perfette, più delicate, più gravi, meno attive, meno armate ec.,

ec., sono di già venute meno, o lo verranno? il loro stato, la vita, l'essere dipende dunque dalla forma, che l'uomo dà, o toglie alla superficie della terra.

Il prodigioso *mahmout*, animale quadrupede, del quale ne abbiamo spesso osservata con istupore l'enorme ossatura, e giudicatolo sei volte almeno più grande del più grand' elefante, non esiste più in alcun luogo; eppure sonosi trovate delle sue spoglie in varj luoghi lontani, gli uni dagli altri, come in Irlanda, nella Siberia, nella Lunigiana ec. Questa specie era certamente la prima, la più grande, la più forte di tutt' i quadrupedi; e giacchè ella s'è estinta, altre più picciole, più deboli, e menò considerevoli quanto più facilmente non han elleno dovuto egualmente perire, senza che ci sia rimasto alcun' indizio, alcun vestigio della loro passata esistenza? e quante altre specie, essendosi snaturate, vale a dire, perfezionate, o deteriorate per le possenti vicende della terra, e dell'acque, per l'abbandono, o coltura della Natura, per la lunga influenza d'un clima diventato contrario, o propizio, non son ora più quelle stesse, ch'erano una volta? eppure gli animali quadrupedi sono, dopo l'uomo, le sostanze di più ferma, e costante Natura: quella degli uccelli, e de' pesci varia anche di più: quella degl'insetti molto più ancora; e se ci portiam fino alle piante, le quali
non

non vanno escluse dalla natura vivente, noi resteremo maravigliati della prontezza con cui le loro specie variano, e della facilità, che hanno a cambiar natura, prendendo nuove forme.

Non sarebbe dunque impossibile, che, anche senza invertir l'ordine della Natura, tutti questi animali del nuovo mondo non fossero in sostanza, che i medesimi, che quei dell'antico continente, da' quali avessero in addietro avuta la lor origine: si potrebbe dire, che per essere stati coll'andar del tempo separati da immensi mari, o da terre inaccessibili, avranno quindi ricevute tutte le impressioni, e sofferti tutti gli effetti d'un clima divenuto nuovo esso medesimo, e che avrebbe parimente cambiato di qualità per le stesse cagioni, che ne produsse la separazione; e che per conseguenza si faranno col tempo impiccioliti, cambiati di natura ec., ma ciò non ci dee impedire di riguardargli oggidì per animali di specie differenti; da qualunque cagione questa differenza proceda, o ch'ella sia stata prodotta dal tempo, dal clima, dalla terra, o ch'ella sia così antica, come la creazione stessa, perciò non è ella men reale. La Natura, io lo confesso, è in un moto di flusso continuo; ma basta all'uomo il poterla afferrare nell'istante del suo secolo, e di gettar qualche sguardo nel passato, e nell'avvenire, per procurar così di andar invecchiando.

figando qual ella potea essere per lo addietro, e quale potrebb' ella in appresso divenire.

Riguardo all' utilità particolare , che noi possiamo trarre da queste ricerche sulla comparazion degli animali , ben si vede che , prescindendo dalle correzioni della nomenclatura , di cui abbiám esposti alcuni esempi , le nostre cognizioni sopra gli animali faranno quindi più estese , men imperfette , e più sicure ; che noi correremo minor rischio d' attribuiré a un animal d' America ciò , che non appartiene , che a quello dell' Indie orientali , che porta lo stesso nome ; che in parlando degli animali stranieri sulle notizie de' Viaggiatori , noi saprem meglio distinguer i nomi , e i fatti , e riportargli alle vere specie ; e che finalmente la Storia degli animali , che noi siamo incaricati di scrivere , sarà quindi men fallace , e forse più luminosa , e più completa .

LA TIGRE (a).

Nella classe degli animali carnivori, il leone è riputato il primo, e la tigre il secondo: e siccome il primo, anche

Tom. X.

E

in

(a) La tigre, la vera tigre, la tigre dell' Indie orientali; in Francese, *le Tigre*, in Latino, *Tigris*; in Tedesco, *Tigertbier*; in Inglese, *Tiger*.

Tigris. Gesnero, *hist. quadrup.* pag. 936.

Tigris. Ray, *Synops quadrup.* pag. 165.

Tigris maculis oblongis. Linneo, *System. natur.* edit. IV. pag. 64. *Nota*, che qui essa è sola nel suo genere colla pantera... *Felis cauda elongata, maculis virgatis*. *Idem ibidem*, edit. VI. pag. 4. *Nota*, che dal genere della tigre ella è passata in quello del gatto; e ch' essa è in questo medesimo genere col leone, colla pantera, col gatto-pardo, col gatto, col gatto cerviero; e con due specie di lince... *Felis cauda elongata, corporis maculis omnibus virgatis*. Linneo, *Syst. Nat.* edit. X. pag. 41. *Nota* ch' essa quì si trova col leone, colla pantera, col jaguar, col gatto pardo, col gatto, colla lince: e non si fa più cosa se n'è fatta l'altra lince egualmente, che il gatto-cerviero.

Ti.

in un genere cattivo, è sempre il più grande, e soventi volte il migliore, così il secondo è ordinariamente il più cattivo di tutti. Alla ferezza, al coraggio, alla forza il leone accoppia la nobiltà, la clemenza, la magnanimità; la tigre al contrario è vilmente feroce, e crudele ingiustamente, cioè senza bisogno. Lo stesso avviene in ogni ordine di cose, in cui si distribuiscono i gradi secondo l'ordine della forza: il primo, in mano a cui sta un pieno potere, è men tiranno del secondo, che goder non potendo d'una piena podestà, ne fa vendetta abusando di quel potere, che ha potuto arrogarsi. La tigre dunque temer si dee assai più del leone; questi si dimentica spesso d'essere il Re, cioè il più forte di tutti gli animali; camminando d'un passo tranquillo, non assale mai l'uomo, purchè non ne sia provocato; non precipita i suoi passi, non s'abbandona al corso, e non va in caccia, se non quando è stimolato dalla fame. La tigre al contrario, benchè sazia di carne, sembra tuttavia esser ognora accesa di sangue, e l' suo furore non ha altri intervalli, che quelli del tempo, che richiedesi per tendere agguati; essa

Tigris. Klein, *de quadrup.* pag. 78.

Felis flava, maculis longis nigris variegata...

Tigris; Brisson, *Regn. animal.* pag. 268.

essa afferra, e strazia una nuova preda con rabbia eguale a quella, che poc' anzi avea mostrata divorando la prima; reca una desolazione al paese, in cui abita, non teme nè l'aspetto, nè le armi dell'uomo, sfrozza e devasta le mandre di animali domestici, uccide tutte le bestie selvagge, assale i piccioli elefanti, i giovani rinoceronti, e talvolta osa perfino di far fronte al leone.

La figura del corpo è all'istinto naturale ordinariamente conforme. Il leone ha un'aria nobile, l'altezza delle sue gambe è proporzionata alla lunghezza del corpo: la folta, e gran chioma, che gli copre le spalle, e gli adombra la faccia, il suo sguardo imperterrito, il suo grave portamento, il tutto in somma sembra annunziare la sua fiera, e maestosa intrepidezza. Il corpo della tigre troppo lungo, e troppo basso sulle gambe, la testa nuda, gli occhi feroci, la lingua a color di sangue, e sporta ognora all'infuori, son tutti caratteri del suo vile, e pessimo istinto, e della sua insaziabile crudeltà. Dunque il naturale istinto della tigre in altro non consiste, che in una rabbia costante, e in un cieco furore, che nulla conosce, nulla distingue, e che spesso le fa divorare i suoi propri figliuoli, e straziarne la Madre, quando ella cerca di difenderli. Perchè non ha ella avuta questa sete del suo proprio

sangue all'eccesso ! Perchè non potè ella estinguerla , distruggendo fin dal primo nascimento l'intera razza dei mostri , che va producendo !

Per somma fortuna del restante della Natura , questa specie è poco numerosa , e sembra che sia confinata ai climi più caldi dell' India Orientale . Si trova questa ne' paesi del Malabar , di Siam , di Bengala , nelle medesime contrade , in cui soggiornano l'elefante , e 'l rinoceronte . Pretendesi ancora che la tigre accompagni sovente il rinoceronte (a) , e che lo segua per mangiarne lo sterco , che le serve di purga , o di rinfrescamento ; frequenta con lui le rive de' fiumi , e de' laghi , poichè siccome il suo sangue sempre l' altera , così ha spesso bisogno d' acqua per temperar l' ardore , che la consuma ; inoltre aspetta vicino alle acque gli animali , che vi arrivano , e che dal calor del clima son forzati a venirvi più volte al giorno ; è quivi ne preda , o piuttosto moltiplica i suoi macelli ; poichè sovente abbandona gli animali appena strazia-

(a) Vedi Jac. Bontii , *Hist. Natur. Ind. Or.* Amst. 1658. pag. 54. Vedi parimente la Raccolta dei viaggi della Compagnia delle Indie . Amst. 1702. Tom. VII. pag. 278. e seguenti. Viaggio di Schoutten alle Indie orientali .

ziati per avventarsi a fare strage di altri; e par che altro ella non cerchi, che di gustare, d'affaporare, e d'ubbricarsi del lor sangue, e quando ne squarcia, e lacera il corpo, è solo per succhiare a lunghi forsi quel sangue, di cui ha aperta la sorgente, che per lo più esaurita diviene prima, che se n'estingua la sete.

Quando però ella ha ucciso qualche grosso animale, come un cavallo, o un bufalo, non suole squarciarli sul fatto, se teme d'esserne frastornata; per lacerarli con comodo gli trasporta nelle selve (a), strascinandoli con tal leggerezza, che la massa enorme, che trasporta, sembra appena rallentare qualche poco la velocità del suo corso. Questo solo bastar potrebbe per far comprendere quanta sia la sua forza; ma per darne una più giusta idea, tratteniamoci un momento sulle misure, e sulle proporzioni del corpo di questo terribile animale. Alcuni Viaggiatori paragonarono la tigre, per la grandezza, ad un cavallo (b): altri ad un bufalo (c): altri han detto sol-

E 3

tan-

(a) Vedi Jac. Bontii, *Hist. Nat. Ind. or.* Amst. 1658. pag. 53.

(b) Vedi i Viaggi di Dellon, pag. 104. e seguenti.

(c) Le tigri dell'Indie, dice la Boullaye le-Gouz,

tanto , ch'è molto più grande del leone (a). Ma noi posliam citare testimonianze più recenti, o che meritano maggior fede. Il Sig. de la Lande-Magon ci ha fatti assicurare, che nell' Indie orientali aveva veduta una tigre lunga quindici piedi , comprendendovi senza fallo la lunghezza della coda ; la quale se suppongasi , che fosse della lunghezza di quattro o cinque piedi , la detta tigre sarà stata lunga dieci piedi per lo meno. Egli è ben vero che quella , la cui spoglia conserviamo nel Real Gabinetto , non ha che circa sette piedi di lunghezza dall' estremità del muso fino all' origine della coda ; ma ella era stata presa , e condotta affatto giovane , e indi tenuta sempre rinchiusa in uno stretto camerino nel ferraglio , ove la mancanza di mo-
to

Gouz , sono d'una prodigiosa grandezza ; io ne ho vedute delle pelli più lunghe , e più larghe di quelle de' buoi ; esse talvolta si danno a mangiar gli uomini , e in molti luoghi dell' Indie nessuno si mette a viaggiare senz' essere ben armato , perchè si rizzano su i piè di dietro per saltare sopra quello , che le vuole assalire . Vedi il Viaggio de la Boullaye-le-Gouz , Parigi 1657. pag. 246. e 247.

(a) Vedi Prosper Alp. Hist. Nat. Ægypt. Lugd. Bat. 1735. pag. 237. --- e Wotton , pag. 65.

to, e di spazio, la noja della prigione, l'assoggettamento del corpo, e gli alimenti poco convenienti le abbreviarono la vita, e ritardarono lo sviluppamento, e forse anche ne ristrinsero l'accrescimento del corpo. Nella storia del cervo (a) abbiain veduto, che questi animali presi giovani, e rinchiusi in qualche parco di troppo piccola estensione, non solo non acquistano il loro intero accrescimento, ma si difformano eziandio, divenendo rachitici, di gambe torte, e di bassa statura. Inoltre per mezzo delle sezioni, che abbiain fatte d'animali d'ogni specie allevati, e mantenuti ne' ferragli, sappiamo, ch'essi non arrivano giammai alla loro perfetta grandezza; e che il corpo, e le membra, che non si possono esercitare, rimangon minori delle misure della Natura: che le parti, il cui uso è loro assolutamente vietato, come quelle della generazione, in tutti questi schiavi, e celibi animali sono sì piccole, e sì poco sviluppate, che con fatica si possono ritrovare, e soventi volte ci son sembrate quasi interamente cancellate. La sola differenza del clima potrebbe anche produrre gli stessi effetti, che la mancanza dell'esercizio, e la schiavitù; nessun animale de' paesi caldi può

E 4

ge-

(a) Vedi il Tomo VIII. di questa Storia Naturale, all'articolo del Cervo.

generare ne' freddi climi, quantunque vi sia assai liberamente, e assai largamente mantenuto; e siccome la riproduzione viene naturalmente in seguela soltanto d'una compiuta nutrizione, così egli è chiaro, che, non potendosi la prima operare, la seconda eziandio non si fa compiutamente; e che in tali animali il solo freddo basta per restringere la potenza del modello interiore, e per diminuire le facoltà attive dello sviluppo, poichè distrugge quelle della riproduzione.

Non dee dunque recar maraviglia, che l'accennata tigre, il cui scheletro, e la cui pelle ci furon recati dal Serraglio del Re, non sia pervenuta alla sua giusta grandezza: per altro la sola vista di questa pelle imbottita presenta tuttavia l'idea d'un formidabile animale; e l'esame dello scheletro non ce ne lascia dubitare. Sulle ossa delle gambe veggonsi delle rugosità, che dinotano attaccature di muscoli anche più forti di quelle del leone; tali ossa sono egualmente sode, ma più corte, e come già abbiain detto, l'altezza delle gambe nella tigre non è proporzionata alla gran lunghezza del corpo. Per lo che la velocità terribile di cui Plinio ha parlato, e che sembra esser dinotata dal nome (a)

stef-

(a) *Tigris vocabulum est lingue Amenia,*
nam

stello della tigre, non deeſi intendere degli ordinarij movimenti del camminare, nè tampoco della velocità in un corso continuato; egli è chiaro, che avendo ella le gambe corte, non può camminare (a), nè correr sì velocemente, come gli animali che le hanno proporzionatamente più lunghe; ma queſta terribile velocità ſ'applica affai bene ai balzi prodigioſi, ch'ella dee fare ſenza ſforzo; imperciocchè ſupponendo in eſſa, data la proporzione, tanta forza e ſeſſibilità, quanta nel gatto, che per la ſtruttura molto le raſſomiglia, e che in un

E 5

col-

nam ibi & ſagitta, & quod vehementiſſimum flumen, dicitur tigris. Varro, de lingua latina. --- Perſæ & Medi ſagittam tigrim nuncupant. Geſn. Hiſt. quadrup. pag. 936.

(a) Ciò, che Plinio dice, intorno alla terribile velocità della Tigre, è un errore, dice Bonzio; poichè al contrario eſſa è lenta nel corso, e per queſta cagione attacca più volentieri gli uomini, che gli animali grandi corridori, come i cervi, i cinghiali, i buſali, i buoi ſelvaggi, i quali tutti ella non attacca, che mettendoli in agguato; gettaſi impetuoſamente ſulla loro teſta, e con un ſol colpo di zampa atterra gli animali più forti. Bonz. pag. 53. e 54. Da quel che s'è detto egli è molto facile il conciliare queſti fatti colle eſpreſſioni di Plinio.

colpo d'occhio fa un salto di varj piedi d'estensione: si comprenderà che la tigre, il cui corpo è dieci volte più lungo, può in un'istante egualmente breve fare un balzo di varie pertiche. Plinio adunque ha voluto dinotare non già la celerità del suo corso, ma la velocità del salto, che realmente rende terribile quest'animale, poichè egli è impossibile d'evitarne l'effetto.

Fra tutti gli animali la tigre è forse la sola, il cui feroce naturale ammansar non si possa: nè la forza, nè la soggezione, nè la violenza bastano per domarla: ella s'irrita de' buoni egualmente, che de' cattivi trattamenti; il costume dolce, che può tutto, nulla può conseguire sopra questa ferocea natura; il tempo ben lungi dal radolcirla, temperandone gli umori feroci, non fa che inasprire il fiele della sua rabbia; ella straccia la mano di chi le porge il nutrimento, non altrimenti che quella di colui, che la percuote; ella rugge alla vista d'ogni sostanza vivente, ciascun oggetto le sembra una nuova preda, che vorrebbe divorare con avidi sguardi, che minaccia con fremiti spaventevoli mischiati d'un digrignamento di denti, e verso la quale si slancia sovente, malgrado le catene, e le ferrate, che rintuzzano il suo furore senza però poterla calmare.

Per terminare di dar un'idea della for-

za (a) di questo crudele animale, crediamo di dover qui citare ciò, che il Padre Tachard, testimonio di vista, racconta d' un combattimento della tigre con elefanti: „ Erasi alzata, dice quest' Autore (b), un' „ alta palizzata di certa specie di canne d' „ India, di cento passi in circa in quadrato. Nel mezzo dello steccato erano entrati tre elefanti destinati a combattere „ contro la tigre. Essi avevano una specie „ di gran piastrone a foggia di maschera, „ che lor copriva la testa, e una parte „ della proboscide. Poichè noi fummo arrivati sul luogo, fecesi uscir dal suo abituro, ch'era in un luogo basso, una tigre d'una figura, e d'un colore, che parvero nuovi ai Francesi spettatori di quel combattimento; poichè, oltre che essa era molto più grande, molto più grossa, e d'una corporatura meno magra di quelle, che noi avevamo vedute in Francia, la sua pelle non era per egual

E. 6

„ mo-

-
- (a) *Indi tigrim elephanto robustiorem multo existimant. --- Nearchus scribit Indos referre tigrim esse maximi equi magnitudine; velocitate & viribus bestias omnes superare, elephantum etiam, insilientem in caput ejus facile suffocare. Gesn. hist. quadrup. pag. 237.*
- (b) *Primo viaggio di Siam, del Padre Tachard. Parigi 1686. pag. 292. e seguenti.*

„ modo moscata, ma in vece delle mac-
„ chie sul corpo senz'ordine seminate,
„ eranvi delle fasce lunghe e larghe in for-
„ ma di circolo; tali fasce cominciando
„ dal dorso univansi sotto il ventre, e con-
„ tinuando lungo la coda, vi formavano
„ come alcuni anelli bianchi, e neri alter-
„ nativamente situati, de' quali essa era
„ tutta coperta. La testa non aveva nulla
„ di straordinario, come ne anche le gam-
„ be, le quali soltanto erano più grandi,
„ e più grosse di quelle delle tigri comuni,
„ benchè quella, di cui si parla, fosse
„ ancor giovane, e dovesse crescer tuttavia;
„ poichè il Sig. Constance ci disse, che nel
„ Regno ve n'erano di tre volte più gros-
„ se di quella; e che trovandosi egli un
„ giorno alla caccia col Re, ne vide una
„ assai da vicino, ch'era della grandezza
„ d'un mulo. Alcune parimenti nel paese
„ sono ben piccole, simili a quelle che
„ recansi d'Africa in Europa, e ce ne fu
„ lo stesso giorno mostrata una a Louvo.
„ La tigre, che dovea combattere, non
„ fu posta immediatamente in libertà, ma
„ fu tenuta legata con due corde, in gui-
„ sa che non potendo essa liberamente slan-
„ ciarsi, il primo elefante, che le s'ac-
„ costò, vibrolle sul dorso due o tre colpi
„ della sua proboscide; siffatte percosse fu-
„ rono sì aspre, che la tigre ne fu rove-
„ sciata, e per qualche tempo rimase ste-
„ sa

„ fa al suolo senza moto, quasi fosse mor-
„ ta; ciò non ostante, subito che fu sciol-
„ ta, sebbene quel primo attacco avesse
„ molto rintuzzata la sua furia, gettò un
„ orribil grido, e tentò di balzare sulla
„ proboscide dell' elefante che s' avvicinava
„ per batterla; ma questi destramente ri-
„ piegandola la mise al coperto colle sue
„ zanne, ch' ei presentò nel tempo stesso,
„ e con cui raggiunse sì opportunamente
„ la tigre, che far le fece un gran salto
„ in aria; onde ne rimas' ella sì stordita,
„ che più non ardì d' avvicinarsi. Fece va-
„ rj giri lungo lo steccato, slanciandosi
„ talvolta contro le persone, che vedeva
„ varso le logge: indi furono spinti contro
„ di essa tre elefanti, che le diedero a vi-
„ cenda sì crude percosse, ch' ella ne fu
„ per la seconda volta abbattuta come mor-
„ ta, e quindi più non pensò, che ad evi-
„ tare il loro incontro. Eglino l' avrebbero
„ certamente ammazzata, se non si fos-
„ se posto fine alla pugna“. Da questa de-
„ scrizione del Padre Tachard comprendesi
„ chiaramente, che la tigre esposta a combat-
„ tere cogli elefanti, è la vera tigre: ch'
„ essa parve ai Fraticesi un nuovo animale,
„ perchè nei Serragli di Francia probabilmen-
„ te non avevan veduto che Pantere, o Leo-
„ pardi d' Africa, oppure de' Jaguari d' Ame-
„ rica; e che le piccole tigri, ch' egli vide
„ a Louvo, non eran parimente, che Pante-
„ re.

re. Comprendesi eziandio dalla semplice furriferita narrazione qual esser debba il furore, è la forza di quest' animale; poichè l'accennata tigre, sebbene ancor giovane, e non giunta peranco al suo intero accrescimento: sebben ridotta in ischiavitù, e da lacci ritenuta; sebbert sola contro tre, era nondimeno formidabile a segno ai colossi, con cui combatteva, che fu d'uopo armarli d'una specie di corazza in tutte quelle parti del lor corpo, che la Natura non ha fornite, come le altre, d'un impenetrabile invoglio.

La tigre, di cui il Padre Gouie (a) ha
co-

(a) Nell' Europa non si ha verun' altra cognizione, che delle tigri, la cui pelle è moscata di macchie; ma nella China se ne conoscono eziandio di quelle, la cui pelle è di nere fasce vergata; ed anche in que' paesi pretendesi, che queste due qualità formino due specie differenti, quantunque non sembrano aver altre diversità, che le accennate. La tigre vergata, di cui i Gesuiti della China fecero la notomia, e che con altre quattro era stata uccisa alla caccia dall' Imperadore, non pesava, che duecento sessanta cinque libbre, e non era delle più grandi; un'altra pesava quattrocento libbre. Quella che fu notomizzata, aveva un terzo dello stomaco ripieno di ver-

comunicata all' Accademia delle Scienze un' anatomica descrizione , fatta dai Padri Gesuiti nella China , sembra essere della specie della vera tigre , egualmente che quella , che i Portoghesi han chiamata *tigre reale* , di cui il Sig. Perrault (a) fa menzione nelle sue Memorie sopra gli animali , e la cui descrizione dic' essere stata fatta in Siam. Dellon (b) ne' suoi Viaggi dice espressamente , che il Malabar è il paese dell' Indie , che più abbonda di tigri , che ve n' ha di varie spezie , ma che la più grande di tutte , quella che dai Portoghesi vien chiamata *Tigre Reale* , è estremamente rara , ch' è grande quanto un cavallo , ec.

La tigre reale pertanto non sembra , che faccia una specie particolare , e diversa da quella della vera tigre : ella non si trova , che nell' Indie orientali , e non già nel Brasile , come hanno scritto alcuni de'

no-

vermi , e non potevasi dir non ostante che fosse guasta e corrotta . Qualcuno , ch' era presente disse , ch' erasi trovata la stessa cosa in un' altra tigre , ch' egli aveva veduto aprirsi a Macao . *Storia dell' Accad. delle Scienze , anno 1699. pag. 51.*

(a) Memorie per servire alla Storia degli animali , *Parte II. pag. 287.*

(b) Viaggi di Dellon , pag. 104.

nostri Naturalisti (a). Io son anche d'opinione, che la vera tigre non si trova, che nell' Asia, e nelle parti più meridionali dell' Africa nell' interno delle terre; poichè la maggior parte de' Viaggiatori, che hanno frequentate le coste dell' Africa, parlano bensì di tigri, e dicono anche, che vi son comunissime; ma è facile a vedersi dalle notizie stesse, che eglino danno di siffatti animali, che non sono vere tigri, ma leopardi, pantere, o lonze, ec. Il Dottor Shaw (b) dice espressamente, che ne' regni di Tunisi, e d' Algeri, il leone, e la pantera sono i primi tra le bestie feroci, ma che la tigre non sempre si trova in questa parte della Barbaria: Ciò sembra vero, poichè furono Ambasciatori Indiani (c), e non già Africani quelli, che ad Augusto, mentr' era in Samos, presentarono la prima tigre, che fu veduta dai Romani; anche Eliogabolo fece venir dall' Indie le tigri, che attaccar voleva al suo cocchio per rappresentare il Dio Bacco.

La specie adunque della tigre è sempre stata più rara, e molto men' diffusa, che
quella

(a) Briffon, *Regn. animal.* pag. 269.

(b) Viaggi di Shavv. *Haja* 1743. *Tom. 1.* pag. 315.

(c) Vedi la Descrizione dell' Isole dell' Arcipelago di Dapper. *Amst.* 1703. pag. 206

quella del leone; per altro, la tigre femmina partorisce, come la lionessa, quattro o cinque figlioli; ella è in ogni tempo furiosa, ma lo diviene all'estremo, quando i suoi parti le vengon rapiti; ell'affronta tutt' i perigli, e segue i rapitori, i quali trovandosi incalzati, son costretti a cederle uno de' suoi parti; ella s'arresta, l'afferra, lo riporta in salvo, ritorna dopo pochi momenti, e tien dietro a' rapitori fino alle porte della città, o fino alle loro navi; e poichè ha perduta ogni speranza di ricuperar la sua perdita, con grida lugubri, e forsennate, e con urli orribili esprime il fiero suo dolore, e fa fremere quelli eziandio, che l'odono da lungi.

La tigre fa muover la pelle della sua faccia, digrigna i denti; freme e rugge a guisa del leone; il suo ruggito però è diverso, ed alcuni Viaggiatori (a) lo han paragonato alle grida di certi uccellacci: *Tigrides indomita rancant, rugiuntque leones* (Auctor Philomelæ). Siccome la parola *rancant* non ha in italiano la voce equivalente, così non potrebbesi forse sostituirne una, e dire in italiano le tigri *rancheggiano*, ed i leoni ruggiscono, giacchè il suo-

(a) Secondo Viaggio di Siam, del P. Tachard. Parigi 1689. pag. 248.

suono della voce della tigre è di fatti affai rauca (a)?

La pelle di questi animali si ha in pregio, massimamente nella China: i Mandarini militari ne cuoprono i lor caleffi (b) nelle pubbliche spedizioni: ne fanno altresì delle coverte di guanciali per l'Inverno. Nell'Europa queste pelli, sebben rare, non si tengono in gran pregio: si hanno in molto maggiore stima quelle del leopardo della Guinea, o del Senegal, chiamato *tigre* dai nostri pellicciai. Del resto la pelle è il solo piccol vantaggio, che da questo nocevolissimo animale ritrar si possa, il cui sudore si è preteso (c), che fosse anche velenoso, ed il pelo del mustacchio un irreparabil veleno (d) per gli uomini, e per gli animali;

ma

- (a) Le tigri dell'oriente dell'Asia sono d'una grandezza, e d'una leggerezza sorprendente; hanno ordinariamente il pelo d'un rosso-fulvo . . . ruggiscono come i leoni; le loro sole grida riempiono d'orrore. *Viaggio di Coreal. Parigi 1722. Tom. I. pag. 173.*
- (b) Storia generale dei Viaggi, del Sig. Ab. Prevost, *Tom. VI. pag. 602.*
- (c) Storia Naturale di Siam, di Gervaise. *Parigi 1688. pag. 36.*
- (d) La China illustrata, di Kircher, traduzione di Dalquier. *Amst. 1670. pag. 110.*
- 111.

ma è tanto il male pur troppo reale, che la tigre reca vivendo, ch'è inutile cercare in oltre immaginarie qualità, e veleni nella sua spoglia ; tanto più, che gl' Indiani ne mangiano la carne, e non la trovano nè malsana, nè cattiva ; e se il pelo del suo mustacchio, preso in pillola, ammazza, proviene, perchè essendo ruvido, e duro, sifatta pillola produce nello stomaco lo stesso effetto, che un mazzo di piccoli spilletti.



L A P A N T E R A ,
LA LONZA o PICCOLA PANTERA,
E IL LEOPARDO .

PER esser meglio inteso, e per non impiegar nomi impropriamente, e perchè sia tolto ogni equivoco, e si prevenga ogni dubbio, osserverò dappprincipio, che oltre le tigri, delle quali s'è data quì sopra la Storia Naturale, trovansi eziandio nell'antico continente, cioè in Asia e in Africa, tre altre specie d'animali di questo genere, tutte e tre diverse dalla tigre, e differenti anche tra loro. Queste tre specie sono la *Pantera*, la *Lonza*, ed il *Leopardo*, le quali dai Naturalisti non solo sono state prese indistintamente, ma confuse altresì colle specie del medesimo genere, che si son ritrovate nell'America. Lascio per ora da parte siffatte specie del nuovo Mondo, che si sono indistintamente chiamate *Tigri*, *Pantere*, *Leopardi*; imperciocchè voglio in prima parlare soltanto di quelle del vecchio continente, per non confonder le cose, e per esporre più chiaramente gli oggetti, che vi hanno rapporto.

La prima specie di questo genere, e che tro-

trovasi nell' antico continente , è la gran pantera , che noi chiameremo semplicemente *Pantera* (*tav. II. fig. 1. , e 2.*) ; essa era nota ai Greci sotto il nome di *Pardalis* : in appresso ai Latini antichi sotto quello di *Panthera* , e sotto il nome di *Pardus* : e ai Latini moderni sotto quello di *Leopardus* . Il corpo di quest' animale quando è giunto all' intero suo accrescimento , ha cinque o sei piedi di lunghezza , venendo misurato dall' estremità del muso fino all' origine della coda , che oltrepassa la lunghezza di due piedi . Il fondo della sua pelle è d' un color fulvo più o men carico sul dorso e su i lati del corpo , e d' un color biancastro sotto il ventre ; essa è segnata di macchie nere in forma di grandi anelli , o a foggia di rose : questi anelli son ben separati gli uni dagli altri su i lati del corpo , e nel lor mezzo ben vuoti , e la maggior parte hanno al centro una o più macchie dello stesso colore , di cui è il giro dell' anello . Il diametro di siffatti anelli , parecchi de' quali sono ovali , e gli altri circolari , oltrepassa per lo più i tre pollici . Sulla testa , sul petto , sul ventre , e sulle gambe le macchie sono affatto piene .

La seconda specie è la piccola pantera d' Oppiano (*a*) , a cui gli Antichi non han-
da-

(a) Oppiano , *de venatione* lib. III.

dato verun nome particolare . I moderni Viaggiatori Francesi però l'han chiamata *once*, dal nome corrotto *lynx*, o *lunx*: E noi lo chiameremo *Lonza*, nome già adottato dagl' Italiani . La statura dell' *once* o *lonza* (*Tav. III. fig. 1.*) è molto più piccola di quella della pantera, poichè il suo corpo non ha che tre piedi e mezzo in circa di lunghezza, ch'è presso a poco la statura della lince: il suo pelo è più lungo di quello della pantera, e la coda è anche molto più lunga, avendo tre piedi di lunghezza, e talvolta anche più; non ostante che tutto il corpo della lonza sia in circa un terzo più piccolo di quello della pantera, la cui coda non arriva, che a due piedi, o al più a due piedi e mezzo . Il fondo del pelo della lonza è d'un grigio biancastro sul dorso, e su i lati del corpo, e d'un grigio anche più bianco sotto il ventre; per lo contrario il dorso, e i lati del corpo della pantera sono costantemente d'un fulvo più o men carico . Le macchie sono in ambedue presso a poco della stessa forma, e della medesima grandezza .

La terza specie, di cui gli Antichi non fanno veruna menzione, è un animale del Senegal, della Guinea, e degli altri paesi meridionali, che in tempo degli Antichi non eranfi peranco scoperti . Sull' esempio di varj Viaggiatori, noi lo chiamerem *Leo-*
par-

pardo (Tav. III. fig. 2.) nome, che impropriamente è stato applicato alla gran pantera . Quest' animale è alquanto più grande della lonza, ma molto meno della pantera, non oltrepassando quattro piedi di lunghezza : la sua coda è lunga due piedi , o due piedi e mezzo : il fondo del pelo sul dorso, e su i lati del corpo è d' un color fulvo più o men carico, sotto il ventre però è biancastro : le macchie, che sono sparse pe'l corpo, son formate a foggia d'anelli o di rose , ma questi anelli sono molto più piccoli di quelli della pantera, o della lonza, e sono per la maggior parte composti di quattro o cinque piccole macchie piene ; e di queste macchie piene ve sono alcune, che sono irregolarmente disposte .

Questi tre animali, come appare dalle cose già dette, son differentissimi gli uni dagli altri, e ciascuno forma una specie distinta . I mercatanti pellicciai chiamano le pelli della prima specie, *pelli di pantera*, onde non bisogna cangiar questo nome, poichè così è in uso ; chiamano quelle della seconda specie, *pelli di tigre d' Africa*, il qual nome è equivoco, e perciò noi abbiamo adottato quello di *lonza* ; finalmente eglino chiamano impropriamente *pelli di tigre* quelle dell' animale , che noi qui chiamiamo *leopardo* .

Oppiano (a) aveva contezza delle nostre prime due specie, cioè della pantera e della lonza: egli disse il primo, ch'eranvi due specie di pantere, alcune più grandi e più grosse, le altre più piccole, ma conformi per la forma del corpo, per la varietà, e per la disposizione delle macchie; ma ch'eran diverse per la lunghezza della coda, la quale è molto più lunga nelle piccole, che nelle grandi. Gli Arabi han dinotata la gran pantera col nome *al nemer* (*nemer* levandone l'articolo), e la piccola col nome *al phet*, o *al shed* (*phet* o *shed* levandone l'articolo) quest'ultimo nome benchè alquanto corrotto, si ravvisa in quello di *Faahb*, ch'è il nome attuale di quest'animale nella Barberia. „ Il „ *faahb*, dice il Dottor Shaw (b), rasso- „ miglia al leopardo (egli vuol dire la „ pantera), perchè è moscato come quello, „ ma n'è diverso per altri riguardi; ha „ la pelle più oscura, e più grossolana, „ ed è men feroce,. Inoltre sappiamo per un passo d'Alberto, commentato da Gesnero (a),

(a) Oppiano. *de venatione* lib. III.

(b) Viaggio di Shaw. *Hsia* 1743. Tom II. pag. 26. . . . Nota che in Inglese l'a si pronunzia come *al Francese*, e che il Dottor Shaw scrivendo *faahb* pronunziava *faidd* il che s'accosta anche più a *shed*.

(a), che il *pheet* o *shet* (b) degli Arabi, è stato chiamato in Italiano, e in alcune altre lingue Europee *luenza*, o *lonza*. Non si può dunque dubitare, combinando queste denominazioni, che la piccola pantera d'Oppiano, il *pheet* o *shet* degli Arabi, il *faud* della Barberia, l'*once*, o *lonza* degli Europei non sia lo stesso animale. Si crede parimente con molto fondamento, che sia il *pardus* degli Antichi, e la *pantheri* di Plinio: poichè egli dice, che il fondo (c) del suo pelo è bianco, quando che quello della gran pantera, come abbiain detto, è d'un color fulvo più o men carico: d'altra parte è probabilissimo, che la piccola pantera sia stata semplicemente chiamata *pardo* o *pardus*, e che in appresso la gran pantera sia stata chiamata *leopardo* o *leopardus*, perchè si è creduto, ch'essa fosse una specie bastarda, la quale si fosse poi ingrandita coll'ajuto, e col miscuglio di quella del leone. Ma perchè siffatto pregiudizio non è appoggiato a verun fondamento, perciò noi abbiain preferito l'antico e primitivo nome di *pantera* al nome composto

Tom.X.

F

e più

(a) Gesner, *Hist. quadr.* pag. 825.

(b) *Alphed*, id est *Leopardus minor*, Albertus.

(c) *Pantheris in candido breves macularum oculi*. Plin, *Hist. Nat.* lib. VIII. cap. XVII.

e più recente di *leopardo*, il quale noi abbiamo applicato ad un nuovo animale, che non era peranco dinotato, che per mezzo di nomi equivoci.

La lonza dunque è diversa dalla pantera, perchè molto più piccola, perchè ha la coda molto più lunga, e perchè ha il pelo parimente più lungo, e d'un color grigio o biancastro: ed il leopardo è diverso dalla pantera, e dalla lonza, perchè ha il mantello molto più bello, e d'un fulvo vivo e lustro, benchè più o men carico, con macchie più piccole, e disposte per la maggior parte a guisa di gruppi, come se ciascuna delle sue macchie fosse formata da quattro macchie unite insieme.

Plinio (a), e varj altri Autori dopo di lui hanno scritto, che nelle pantere la femmina aveva il mantello più bianco, che il maschio; ciò potrebb' esser vero della lonza: ma noi non abbiám osservata questa differenza nelle pantere del Serraglio di Versailles, che sono state disegnate mentre eran vive (tav. II. fig. 1. pantera maschia; tav. II. fig. 2. pantera femmina); se vi è dunque qualche differenza nel color del pelo tra 'l maschio e la femmina della pantera, convien dire che non sia questa nè molto costante, nè molto sensibile. Egli è ben

(a) Plinii, *Hist. Nat.* lib. VIII. cap. XVII.

è ben vero, che nelle pelli di questi animali, che noi abbiamo insieme paragonate, si trovano de' digradamenti più o meno sensibili: ma noi siam di parere, che ciò dipenda piuttosto dalla differenza dell'età, o del clima, che da quella del sesso.

Gli animali, che i Socj dell' Accademia delle scienze han descritti (a) e notomizzati sotto il nome di *tigri*, e l' animale descritto da Cajo (b) citato da Gesnero, sotto il nome d' *Uncia*, sono della stessa specie del nostro leopardo: non se ne può dubitare, paragonando la figura, e la descrizione, che noi ora ne diamo con quelle di Cajo, e del Sig. Perrault; veramente egli ha detto, che gli animali descritti, e notomizzati dai Socj dell' Accademia delle Scienze sotto il nome di *tigri*, non sono l' *Uncia* di Cajo (c); le sole ragioni

F 2 ch'

(a) Memorie per servire alla Storia degli animali. *Parte III. cap. 3.*

(b) Gesner; *Hist. quadrup.* pag. 825.

(c) Noi dobbiamo far osservare, che gli editori della terza parte delle Memorie per servire alla Storia degli animali, han lasciato passare un errore, che quanto è più ripetuto, tanto più è necessario a correggerli. Si è stampato dappertutto *ours* in vece di *once*: vi si trova, pag. 5. lin. 28.

1°

ch'egli ne dà, sono che quella è più piccola, e che non è bianco il disotto del corpo: per altro se il Sig. Perrault avesse paragonata l'intera descrizione di Cajo co' soggetti, ch'egli aveva sotto gli occhi, son sicuro, che avrebbe conosciuto, che quelli non eran punto diversi dall'*once*, ossia lonza di Cajo. Siccome a quello proposito potrebbonvi restar de' dubbj, così ho creduto esser necessario il qui riferire le parti essenziali dell'accennata descrizione di Cajo, la quale sebben fatta sopra un animal morto, sembrami non ostante molto esatta (a). Vi si osserverà, che Cajo, senza dar

Pre-

l'*ours* descritto da Cajo in Gesnero.
 pag. 8. l'*ours* che Cajo ha descritto.
 pag. 18. lin. 11. l'*ours*, e il leopardo.
 pag. 18. descrizione esattissima, ch'egli ha data d'un *ours*. Egli è chiaro, che in questi quattro luoghi convien sostituire la voce *once* a quella di *ours*, poichè l'animale, di cui si parla, è stato descritto da Cajo in Gesner sotto il nome d'*Uncia*.
Hist. quadrup. pag. 825.

(a) *Uncia fera est. ferissima, canis villatici magnitudine, facie & aure Leonina: corpore, cauda, pedes, & ungue felis, aspectu truci: dente tam robusto & acuto, ut vel lingua dividat: ungue ita pollet, ut eodem contra nitentes in adversum, retineat: colo-*

re

precisamente la lunghezza del corpo dell' animale, che ha descritto, dice, ch'è più grande d'un cane da pastore, e grosso quanto un alano; benchè più basso di gambe: non comprendo pertanto perchè mai il Sig. Perrault dica, che la lonza di Cajo fosse molto più piccola delle tigri notomizzate dai Socj dell' Accademia delle Scienze. Queste tigri non aveano, che quattro piedi di lunghezza misurandole dall'

F 3

estre-

se per summa corporis pallescentis ochra, per ima cineris, asperso undique macula nigra & frequenti, cauda reliquo corpore aliquanto obscuriori, & grandiori macula. Auris intus palles sine nigro, foris nigricat sine pallore, hi unam flavam & obscuram maculam e medio eximas. . . . Reliquum caput totum est maculosum frequentissima macula nigra, (ut & reliquum corpus) nisi ea parte que inter nasum & oculum est, qua nullae sunt, nisi utrinque due, & ea parvae; quemadmodum & ceterae omnes in extremis & imis partibus, reliquis sunt minores: maculae in summis quidem crurum partibus & in cauda, nigriores sunt & singulares, per latera vero compositae, quasi singulae maculae ex quatuor fierent. Ordo nullus est in maculis, nisi in labro superiori, ubi ordines quinque sunt. In primo & superiori due discretae: in secundo sex conjunctae, ut linea esse videan-

estremità del muso fino all'origine della coda: il leopardo, che ora noi descriviamo, e ch'è certamente lo stesso animale, che le tigri del Sig. Perrault, non ha parimenti, che circa quattro piedi, e se si verrà a misurare un alano, massimamente un alano di razza forte, si troverà, che sovente egli sorpassa tali misure. Le tigri adunque descritte dai Socj dell' Accademia delle Scienze non eran per la grandezza di-

deantur. Hi duo ordines liberi sunt, nec inter se commixti. In tertio ordine octo conjuncte sunt, sed cum quarto ubi finit commiscuntur.... Nasus nigrescit, linea per longitudinem perque summam tantum superficiem inducitur leniter; oculi glauci sunt... vivit ex carne: femina mare crudelior est & minor, utriusque sexus una ad nos ex Mauritania est advecta nave. Nascuntur in Libya. Si quod illis coeundi statum tempus est, hic mensis Junius est: nam hoc mas feminam supervenit... Ista animalia tam ferocia sunt, ut custos cum primo vellet de loco in locum movere, cogebatur fuste in caput actio (ut ajunt) semi-mortua reddere... Quod scribunt esse cane longius, id mihi non videtur; nam sunt apud nos multi canes villatici, qui longitudine aequant: pecuario tamen & major est & longior, ut & villatico humilior. Cajus apud Gesner. Hist. quadrup. pag. 825. & 826.

diverse dall'*uncia* di Cajo a segno, che il Sig. Perrault appoggiato a questa sola differenza avesse avuto motivo di conchiudere, ch'ella non poteva essere lo stesso animale. Avvi un altro assurdo riguardo al color del pelo sul ventre; il Sig. Perrault dice, ch'è bianco, e Cajo, ch'è cenerino, cioè biancastro: dunque questi due caratteri, pe' quali il Sig. Perrault ha giudicato, che le tigri notomizzate dai Socj dell'Accademia, non eran la lonza di Cajo, avrebber dovuto indurlo ad asserire il contrario: massimamente se si riflette, che tutto il rimanente della descrizione va perfettamente d'accordo. Non si può dunque ricusare di riguardar le tigri dei Socj dell'Accademia, l'*Uncia* di Cajo, e'l nostro *Leopardo* come lo stesso animale, e non so capire perchè mai alcuni de' nostri Naturalisti abbian riguardate le tigri del Sig. Perrault, come animali d'America, e le abbian confuse col Jaguar.

Noi dunque crediam per certo, che le tigri del Sig. Perrault, l'*uncia* di Cajo, e'l nostro leopardo, sono lo stesso animale: Crediamo egualmente per cosa sicura, che la nostra pantera sia lo stesso animale, che la pantera degli Antichi, essa n'è bensì differente per la grandezza, ma le rassomiglia per tutti gli altri caratteri; e, come già abbiain detto più volte, non dee recar maraviglia, che un animale allevato in un

Serraglio non acquisti il suo intero accrescimento, e che resti minore delle misure della natura. Questa differenza di grandezza ha tenuti lungamente noi pure nell'incertezza; ma dopo un esame il più lungo, e possiam anche dire il più scrupoloso, dopo l'esatto, e immediato paragone delle grandi pelli della pantera, che spesso si trovano presso i Pellicciaj, con quella della nostra pantera, non ci è stato più lecito di dubitare, ed abbiain chiaramente conosciuto, ch'esse non erano animali differenti. La pantera, che qui descriviamo, ed altre due della medesima specie, che trovavansi nel tempo stesso nel Serraglio del Re, son venute dalla Barberia: le prime due furono mandate in dono a Sua Maestà dalla Reggenza d'Algeri, dieci o dodici anni sono: la terza fu comperata pel Re da un Ebreo d'Algeri.

Non possiamo dispensarci da far qui un'altra osservazione: fra i tre animali, di cui ora facciam la descrizione sotto i nomi di *pantera*, di *lonza*, e di *leopardo*, niuno può riferirsi all'animale, che i Naturalisti hanno disegnato col nome di *pardus*, o di *leopardus*. Il *pardus* del Sig. Linneo, ed il leopardo del Sig. Brisson, che sembran essere lo stesso animale, son dinotati colle frasi seguenti: *Pardus, felis cauda elongata, corporis maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis*. Syst. nat.

nat. edit. x. pag. 41.... Il leopardo, *felis ex albo flavicans, maculis nigris in dorso orbiculatis, in ventre longis, variegata. Regn. animal. pag. 272.* Questo carattere di lunghe macchie sul ventre, o allungate in forma di verghe sulle parti inferiori del corpo, non appartengono nè alla pantera, nè alla lonza, nè al leopardo, de' quali quì si tratta. Sembra per altro, che ciò riguardi la pantera degli antichi; la *panthera, pardalis, pardus, leopardus* di Gesnero; il *pardus, panthera* di Prospero Alpino; la *pantera, Varia, Affricana* di Plinio; la pantera in somma, che trovasi in Africa (a), e nell' Indie orientali, di cui gli accennati Autori hanno inteso parlare, e ch' eglino han disegnata colle frasi da noi sopraccitate. Or dunque, io replico; niuno dei tre animali, che or descriviamo, benchè tutti e tre di specie differenti, ha questo carattere di macchie lunghe, e in forma di verghe sulle parti inferiori; e nel tempo stesso possiamo assicurare per le diligenze da noi usate, che le dette tre specie, e forse una quarta, di cui parleremo in appresso, e che come le tre prime non ha in verun conto siffatto carattere di lunghe macchie sul ventre, sono le sole di questo genere, che nell' Asia e nell' Afri-

F. 5

ca

(a) Brisson, *Regn. animal. pag. 273.*

ca si trovino; di maniera che non possiamo a meno di non riguardare, come dubbio questo carattere, che costituisce il fondamento delle frasi indicative degli accennati Nomenclatori. Egli è tutto al contrario in questi tre animali, e forse in tutti quelli dello stesso genere; imperciocchè non solo que' dell' Africa, e dell' Asia, ma quegli eziandio dell' America, quando hanno delle macchie lunghe a guisa di verghe, o di strisce, le hanno costantemente sulle parti superiori del corpo, sul garrot, sul collo, sul dorso, e non mai sulle parti inferiori.

Faremo in oltre osservare, che l'animale, di cui si è data la descrizione nella terza parte delle Memorie per servire alla storia degli animali, sotto il nome di pantera (a), è un animale diverso dalla pantera, dalla lonza, e dal leopardo, di cui qui si tratta.

Faremo finalmente osservare che, leggendo gli Antichi, non si dee confondere il *pantero* colla *pantera*. La pantera è l'animale, di cui ora parliamo: il pantero dello Scoliaſto d' Omero, e degli altri Autori è una specie di lupo timido, che crediamo essere lo Sciacal, come spiegheremo quando

(a) Memorie per servire alla Storia degli animali. Part. III. pag. 3.

do daremo la Storia di quest' animale. Del resto la voce *pardalis* è l' antico nome greco della pantera, che si dava indistintamente al maschio, e alla femmina. Il nome *pardus* è men antico, e Luciano e Plinio furono i primi a usarlo: quello di *leopardus* è anche più recente, poichè Giulio Capitolino sembra essere stato il primo, o un dei primi a farne uso: e quanto al nome stesso di *pantera*, è questo un nome, che dagli antichi Latini fu derivato dal greco, ma che dai Greci non fu usato giammai.

Dopo d' aver dissipate, per quanto da noi si potea, le tenebre, con cui la nomenclatura non cessa d' oscurar la Natura, dopo aver esposte, per prevenir ogni equivoco, le figure esatte dei tre animali, di cui ora trattiamo, passeremo a ciò, che riguarda ciascun di essi in particolare.

La pantera, che abbiain veduta viva, ha l' aria feroce, l' occhio inquieto, lo sguardo crudele, i movimenti aspri, e le grida simili a quelle d' un alano adirato; ell' ha pure la voce più forte, e più rauca, che il cane irritato, ha la lingua ruvida, e assai rossa, i denti forti e puntuti, le unghie aguzze e dure, la pelle bella, d' un fulvo più o men carico, sparsa di nere macchie rotonde a guisa d' anelli, o insieme unite in forma di rose, il pelo corto, la coda segnata al disopra di gran

macchie nere, e d'anelli neri, e bianchi verso l'estremità. La pantera è della statura, e della grossezza d'un alano di razza forte, ma men alta di gambe.

Le relazioni dei Viaggiatori vanno d'accordo colle testimonianze degli Antichi riguardo alla grande, e alla piccola pantera, cioè alla nostra pantera, e alla nostra lonza. Sembra, che nella parte dell'Africa, che stendesi lungo il mar Mediterraneo, e nelle parti dell'Asia, ch'eran note agli Antichi, esistano a' nostri giorni egualmente, che a' tempi d'Oppiano due specie di pantere, la più grande delle quali dalla maggior parte de' Viaggiatori è stata chiamata *pantera* o *leopardo*, e la più piccola *lonza*. Eglino convengon tutti, che la lonza facilmente s'addimestica, che la si addestra alla caccia (a), e che vien impie-

ga-

(a) I Persiani hanno una certa bestia chiamata *Once* o sia *lonza*, che ha la pelle macchiata come una tigre, ma ch'è molto docile, e assai famigliare. Un cacciatore se la porta in groppa a cavallo, e poichè ha scoperta una gazzella, mette a terra subitamente la lonza, la qual è sì leggiera, che in tre salti s'avventa al collo della gazzella, benchè ella corra con incredibile velocità. La gazzella è una specie

gata a quest' uso nella Persia, e in parecchie altre Provincie dell' Asia; che trovansi ivi delle lonze tanto piccole, che un cav-

Val-

cie di piccol cavriuolo, di cui il paese è ripieno: la lonza la strangola incontanente co' suoi denti aguzzi; ma se per avventura ella falla il colpo, e la gazzella le sfugge, rimane sul campo svergognata, e confusa, e in tale confusione la potrebbe prendere perfino un fanciullo senz' ch' ella se ne difendesse. *Viaggio di Tavernier, Roano 1713. Tom. II. pag. 26.* Per le cacce grandi si fa uso delle bestie feroci addestrate a cacciare, leoni, leopardi, tigri, pantere, lonze; i Persiani chiamano questi ultime bestie col nome d' *Touzze*: esse non fanno agli uomini verun male; un cacciatore se ne porta una in groppa a cavallo, cogli occhi bendati, attaccata ad una catena, tienli su i passi delle bestie, che vengono ricacciate, e che si fanno passar dinanzi ad essa più da vicino che sia possibile: quando il Cacciatore ne scorge qualcuna, sbenda gli occhi alla lonza, le rivolta la testa dal lato della bestia ricacciata; s' ella la scorge, getta un grido, slanciasi a gran salti, gettasi sulla bestia, e l'atterra; ma se non la raggiugne dopo alcuni salti, disgustasi d'ordinario, e s'arresta; allora si va a prenderla, e per

com.

valcatore può portarfele in groppa; ch'esse sono mansuete a segno da lasciarsi maneggiar-

consolarla la si accarezza . . . Ho veduta una caccia fissata nell'Ircania, l'anno 1666. . . Sonovi colà di queste bestie addestrate, che fanno destramente la caccia; si strascinano sul ventre lungo le siepi, e le fratte finchè giungan vicino alla preda; e allora vi si slanciano sopra. *Viaggio di Chardin nella Persia cc. Amsterd. 1711. Tom. II. pag. 32. e 33.* Vedi parimente il *Viaggio intorno al mondo di Gemello Carveri. Parigi 1719. Tom. II. pag. 96. e 212.* ove per altro l'Autore sembra aver preso molte cose da Chardin . . . *Quo tempore perveni Alexandriam duos pardos . . . vidi apud Antonium Calepiam Usque adeo sicures erant & mansueti, & semper in lectulis decumbentes dormiebant Carne eos nutrebat: saepe a nobis cum pardo ibatur ad venandas gazellas, & pugnam inter ipsos pulcherrimam quae fiebat admirabamur, praesertim gazellae artificium cum pardo cornibus durissimis armata pugnando, sed eam tamen multo fatigatum atque ex pugna admodum defessam interimebat. Cairi postea vidimus quamdam mulierem quinque catulos recentes a panthera effusos, ex Arabe coemisse, eosque ut feles aluisse. Erant omnino visu pulcherrimi, aspiciebant colore maculis par-*

giare, e accarezzar colla mano. La pantera par che sia d'una natura più fiera e men

parvis rotundis toto corpore cvariati . . . Parum quidem differentia inter pardum & pantheram observavimus intercedere: panthera quidem major & toto corpore est & capite, atque multo ferocior. Prosp. Alp Hist. Egypt. part. I. Lugd. Batav. 1735. pag. 238. . . . Accipi a quodam oculario teste in aula regis Galliarum, leopardos duorum generum ali; magnitudine tantum differentes, majores, vituli corpulentia esse humiliores, oblongiores; alteros minores ad canis molem accedere, & unum ex minoribus aliquando ad spectaculum regi exhibendum, a bestiario aut venatore, equo insidente a tergo super stragulo aut pulvino vehi, alligatum catena, & lepore obiecto dimitti, quem ille saltibus aliquot bene magnis affecutus inquit. Gesner. Hist. quadrup. pag. 831. . . . Emanuello, Re di Portogallo, mandò a Leone X. una pantera addestrata alla caccia. Storia delle Conquiste dei Portoghesi, del P. Lafitau. Parigi 1733. Tom. I. pag. 525. Questa pantera era una lonza, poichè l'Autore dice altresì, che nella Persia si fa uso della lonza o pantera per la caccia delle gazzelle; che questi animali si fan venire dall'Arabia, e che son famigliari a segno, che si posson portare in groppa a cavallo.

men flessibile : si può domare piuttosto, che addimesticare ; non perde giammai interamente il suo feroce carattere , e quando se ne vuol far uso per la caccia (a),

vi

(a) *Tigres ex Esiopia in Ægyptum convectas vidimus, etsi nullo modo cicuratae hæc mansuefiant, neque unquam ferinam naturam relinquunt; sunt leonis quam similes, & forma & colore algicante, rotundis maculis fulvescentibus evariata, sed leonis longe majores sunt.* Prosp. Alp. Hist. Ægypt. pag. 237. . . .

Quando si scopre qualche gazzella, si procura di farla vedete al leopardo, che tiens' incatenato sopra una picciola carretta; questo astuto animale non si dà tosto a correre appresso alla gazzella, come potrebbesi immaginare, ma si va rivoltando, nasccondendo, e incurvando per accostarfele, e sorprenderla; e siccome egli è capace di far cinque, o sei salti, o balzi con incredibile prestezza, così quanto vedesi a segno di far il colpo, slanciafi sopra di essa, la strangola si sazia del sangue, del cuore, e del fegato; e se il colpo non riesce, locchè accade bene spesso, ei sen resta al suo posto; e sarebbe vano, ch'egli pretendesse di pigliarla col correrle dietro, poichè la gazzella corre assai più del Leopardo, e più a lungo. Il padrone, o direttore gli va quindi all'interno con piacevoli modi,

vi bisogna molta cura per addestrarla, e molto maggiori cautele per condurla, ed esercitarla. La si mena sopra una carretta, ferrata in una gabbia, di cui se le apre la porta quando si scopre qualche pezzo di cacciagione; essa se le slancia contro, e ordinariamente la raggiugne in tre o quattro salti, l'atterra, e la strozza; ma se falla il colpo, ella divien furiosa, e gettasi talvolta sopra il suo padrone, che d'ordinario previene un tal pericolo recando seco dei pezzi di carne, o degli animali vivi, come agnelli, capretti, de' quali gliene getta qualcheduno per calmare il suo furore.

Del resto, la specie della lonza sembra essere più numerosa; e più diffusa, che quella della pantera; ella si trova comunissimamente nella Barberia, nell' Arabia, e in tutte le parti meridionali dell' Asia,
ec.

di, accarezzandolo, e gettandogli de' pezzi di carne, e trattenendolo in tal guisa, gli copre gli occhi, l'incatena, e lo ripone sulla carretta. *Viaggio di Bernier nel Mogol. Amsterd. 1770. Tom. II. pag. 243. e seguenti.* Sembra, che quest' animale sia la gran pantera, di cui qui si parla, poichè riguardo alla lonza non fa mestieri di pigliar tante cautele.

eccettuato forse l'Egitto (a); e s'è distesa eziandio fino alla China, ove vien chiamata *Hinen-pao* (b).

Il motivo, per cui ne' climi caldi dell'Asia si fa uso della lonza per la caccia, è perchè i cani vi son rarissimi (c); non vi sono, per così dire, che quelli che vi si trasportano, e questi ancora vi perdono in breve tempo la voce, e l'istinto: oltrechè nè la pantera, nè la lonza, nè il leopardo

(a) Nell'Egitto non trovansi nè leoni, nè tigri, nè leopardi. *Descrizione dell'Egitto di Mascrier. Haia 1740. Tom. II. pag. 125.*

(b) *Hinen-pao*. Questa è una specie di leopardo o di pantera, che trovasi nella provincia di Pekin; e non è sì feroce, come le tigri ordinarie. I Chinesi ne fanno grande stima. *Relazione della China, di Thevenot. Parigi 1696. pag. 19.*

(c) Siccome i Mori, a Surate e sulle coste del Malabar, non han cani per far la caccia delle gazzelle e dei daini, così procurano di supplire a questa mancanza col mezzo de' leopardi addimesticati, ch'egli-
no addestrano a tal esercizio. Questi animali si gettano destramente sulla preda, e quando l'hanno afferrata, non la lascian per verun modo, e vi si tengono fortemente attaccati. *Viaggio di Gio: Ovington. Parigi 1725. Tom. I. pag. 278.*

do possono soffrire i cani, e gli attaccano piùchè ogni altra sorta di bestie (a). Nell' Europa i nostri cani da caccia non hanno altri nemici, che il lupo; ma in un paese ripieno di tigri, di leoni, di pantere, di leopardi, e di lonze, che son tutti animali più forti e più crudeli del lupo, il conservare i cani sarebbe cosa impossibile. Del resto, la lonza non ha l'odorato sì fino, come il cane; ella non insegue le bestie sulle tracce, lo che le farebbe egualmente impossibile, che il raggiungerle in una corsa continuata; ella non le caccia, che a vista, e altro non fa, per così dire, che slanciarsi, e gettarsi sulla preda; ella salta sì leggermente, che balza facilmente al di là d'un fossato, o d'una muraglia di molti piedi, sovente s'arrampica su pegli alberi, per attender gli animali al passo, e per lasciarvisi cader sopra; questa maniera d'assalir la preda è comune alla pantera, al leopardo, ed alla lonza.

Il leopardo (b) ha gli stessi costumi, e
me-

(a) I leopardi son nemici mortali de' cani: e ne divoran quanti ne possono incontrare. *Viaggio de la Mairé 1695. pag. 99.*

(b) Il leopardo della Guinea è per lo più dell'altezza, e della grossezza d'un grosso cane da Beccajo; egli è feroce, selvaggio,
• e in-

medesimo naturale della pantera; non trovo ch'egli sia stato in luogo veruno addimesticato, come la lonza; nè che i Negri del Senegal, e della Guinea, ov'è comunissimo, se ne sian serviti giammai per la caccia. Comunemente egli è più grande del-

e incapace d'essere addimesticato; gettasi furiosamente sopra gli animali d'ogni sorta; e perfino sugli uomini: il che non fanno nè i leoni, nè le tigri della stessa contrada della Guinea, purchè non vi siano estremamente stimolate dalla fame. Egli ha qualche cosa del leone, e qualche cosa del gran gatto selvaggio: la sua pelle è tutta moscata di macchie rotonde, e nere di differenti tinte sopra un fondo grigio: ha la testa mediocrementemente grossa, il muso corto, la bocca larga, ben armata di denti, de' quali le donne del paese si servono per far collane: ha la lingua pressappoco sì ruvida, come quella del leone: gli occhi son vivissimi e sempre in moto, e lo sguardo è crudele; non respira, che stragi; le sue orecchie rotonde e assai corte sono ognor diritte; ha il collo grosso e corto, le cosce grosse, i piedi larghi, con cinque dita a' piè davanti, e quattro a que' di dietro; gli uni e gli altri armati di branche forti, aguzze e taglienti; ei le serra come le dita della mano, e di rado la-

della lonza e più piccolo della pantera; ha la coda più corta, che la lonza, quantunque ella sia lunga due piedi, o due piedi e mezzo.

Questo leopardo del Senegal o della Guinea, a cui abbiamo particolarmente applicato il nome di *leopardo*, è probabilmente l'animale che nel Congo si chiama *engoi* (a); egli è forse l'*antamba* del Madagascar (a):

lascia la preda, che strazia colle unghie egualmente che coi denti. Benchè egli sia assai carnivoro, e mangi molto, è non ostante sempre magro; si moltiplica assai; ma ha nemica la tigre, ch'essendo più forte e più lesta ne distrugge in gran numero. I Negri prendon la tigre, il leopardo, e il leone in fosse profonde ricoperte di canne, e d'un poco di terra, su cui mettono per esca qualche bestia morta. *Viaggio di Desmarchais. Tom. I. pag. 202. . . .* La tigre del Senegal è più furiosa del leone; la sua altezza, e la lunghezza è quasi quanto quella d'un levriere; e assale del pari uomini, e bestie. I Negri l'uccidono colle loro zagaglie, e colle frecce per averne la pelle: quantunque sia ella ferita da' colpi, difendesi quanto può fino agli estremi della vita, e ne ammazza sempre qualcuno.

Viaggio de le Maire, Parigi 1695. pag. 99.

(a) Le tigri del Congo s'appellano colà *engoi*.
Viag.

(a): accenniamo questi nomi, poichè gioverebbe per la cognizione degli animali, che si avesse il catalogo de' loro nomi nelle lingue dei paesi, in cui essi abitano.

La specie del leopardo sembra esser soggetta a maggiori varietà, che quella della pantera, e della lonza: abbiain veduto un gran numero di pelli di leopardo diverse le une dalle altre, sì per la diversa mischiianza de' colori del fondo del pelo, come per quelli delle macchie, le cui rose o anelli son più contrassegnati, e più terminati sopra alcune, che sulle altre; questi anelli però son sempre assai più piccoli, che quelli della pantera, o della lonza. In tutte le pelli del leopardo, le macchie sono ciascuna pressappoco della stessa grandezza, e della medesima

ma

Viaggio di Francesco Drake. Parigi 1641. pag. 105. Raccolta dei Viaggi, che servono per lo stabilimento della Compagnia delle Indie. Amst. 1702. Tom. II. pag. 326.

(a) L'antamba del Madagascar è una bestia della grandezza d'un cane, che ha la testa rotonda, e secondo le relazioni de' Negri, rassomiglia ad un leopardo; esso divora gli uomini, e'l bestiame, e non se ne trova, che ne' luoghi più deserti dell'isola. *Viaggio del Madagascar, di Flacourt Parigi 1661. Tom. I. pag. 154.*

ma figura; le loro differenze non consistono in altro, che nella forza delle loro tinte, essendo queste in alcune più fortemente espresse, e molto men fortemente nelle altre. Il colore del fondo del lor pelo non ha altra differenza, se non ch'è d'un fulvo più o men carico; ma siccome siffatte pelli son tutte presso a poco della medesima grandezza, tanto pel corpo, quanto per la coda, così egli è assai verisimile, che appartengan tutte ad una stessa specie d'animale, e non già ad animali di specie differenti.

La pantera, la lonza, e 'l leopardo non abitano, che nell'Africa, e ne' climi più caldi dell'Asia: questi animali non si son mai diffusi ne' paesi settentrionali, e nemmeno ne' paesi temperati. Aristotele parla della pantera, come d'un animale dell'Asia, e dell'Africa, e dice espressamente, che non ve n'ha affatto nell'Europa. Questi animali pertanto, che sono, per così dire, confinati nella zona torrida dell'antico continente, non han potuto passar nel nuovo per le terre del Settentrione: e dalla descrizione, che daremo in appresso degli animali di questo genere, che si trovano nell'America, si vedrà ch'eglino sono di specie differenti, che non si avrebber dovuto confondere con quegli dell'Africa, e dell'Asia, come han fatto la maggior parte degli Autori, che hanno
scrit-

scritta la nomenclatura.

Questi animali generalmente eleggono per lor soggiorno le fitte boscaglie, e frequentano spesso le rive de' fiumi, e i contorni delle abitazioni isolate, ove cercano di sorprendere gli animali domestici, e le bestie selvagge, che vi vanno a cercar acqua. Gettanti di rado sugli uomini, quando anche ne sian provocati; s'arrampicano facilmente su pegli alberi, ov' inseguono i gatti selvaggi, e gli altri animali, che non possono loro sfuggire. Quanunque vivan di sole rapine, e sien ordinariamente assai magri, i Viaggiatori pretendono non ostante, che la loro carne non sia cattiva a mangiare: gl' Indiani, e i Negri la trovan buona; egli è ben vero ch'eglino trovano ancor migliore quella del cane, e che se ne fanno tra loro de' regali, come di vivande deliziose. Risguardo alle loro pelli, son esse tutte di gran pregio, e se ne fanno delle bellissime pellicce; la più bella e che si vende a più caro prezzo, è quella del leopardo; una sola di tali pelli, quand' ha il color fulvo assai vivo, e lucido, e le macchie sono ben terminate da un bel nero, costa otto o dieci luigi.

IL JAGUAR.

IL jaguar rassomiglia alla lonza nella grandezza del corpo, nella forma della maggior parte delle macchie, di cui è
Tom. X. G spar-

(a) Il *Jaguar*, o *Jaguara*, nome di quest'animale nel Brasile, che noi abbiain adottato per distinguerlo dalla tigre, dalla pantera, dalla lonza, e dal leopardo, co' quali è stato spesso confuso. I primi Storici del nuovo Mondo chiamavano quest' animale *Janou-are*, o *Janouar*. *Pison*, e *Marcgrave* furono i primi, che scrissero *Jaguara* in cambio di *Janou-ara*. I Meticciani lo chiamavano *Tlatlaubqui occlot*, secondo *Hernandez*, pag. 498. I Portoghesi l'han chiamato *onça*, perchè in fatti per certi riguardi rassomiglia alla lonza.

Jaguara. *Pison*, *Hist. Nat.* pag. 103.

Jaguara Brasiliensis. *Marcgravius Hist. Bras.* pag. 285.

Pardus, an *lynx Brasiliensis jaguara dicta Marcgravii*. *Ray, Synops. quadrup.* pag. 168.

Tigris Americana Jaguara Brasiliensis. *Klein de quadrup.* pag. 80.

Tigre della Gujana. *Viaggio di Desmarchais.* *Tom. III.* pag. 299.

sparso il suo mantello, ed anche nel suo naturale. Egli è men crudele, e men feroce del leopardo, e della pantera: ha il fondo del pelo d'un bel fulvo, come il leopardo, e non già grigio come la lonza: ha la coda più corta dell'uno, e dell'altro, il pelo più lungo, che la pantera, e più corto, che la lonza; lo ha increspato mentre è giovane, e liscio quand'è divenuto adulto. Noi non abbiám veduto vivo quest'animale, ma ci fu mandato interissimo, e ben conservato in un liquor preparato, e sopra di esso ne abbiám fatto il disegno, e la descrizione. Egli era stato preso piccolo assai, e venne allevato in casa fino all'età di due anni, e fu fatto poi ammazzare, perchè ci fosse mandato (a): ei dunque

(a) Quest'animale ci fu mandato sotto il nome di *gato-tigre*, dal Sig. Pagès, Medico del Rè al capo nell'Isola di San-Domingo. Nella lettera, con cui l'accompagnò, mi diè ragguaglio, che quest'animale era giunto a San-Domingo con un vascello Spagnuolo, che l'aveva condotto dalla terra ferma, ov'è assai comune: egli aggiunse che il detto animale aveva due anni quando lo fece ammazzare, ch'egli non era così grosso, e che s'è gonfiato nello spirito di tafia; ch'egli bevea, mangiava, e il suo

que non aveva peranco acquistata tutta l'estensione delle sue naturali misure; ma dalla sola ispezione di quest'animale, non si vien meno a comprendere, ch'egli è appena della statura d'un alano ordinario, o di razza mezzana, quando non ha peranco acquistato il suo intero accrescimento. Per altro egli è l'animale più formidabile, il più crudele, in una parola, la tigre del nuovo Mondo, in cui la natura sembra aver impiccioliti tutt'i generi degli animali quadrupedi. Il jaguar vive di rapina a

G 2

gui-

suo grido era come quello d'un gatto non familiare; che miagolava, e che mangiava anche più volentieri il pesce, che la carne. Pison, e Marcgrave dicono similmente che l'jaguari del Brasile son molto ghiotti del pesce. Il nome di *gatto-tigre*, che gli died il Sig. Pagès, non c'impedì di riconoscerlo pel jaguar, perchè questo nome del Brasile non è in uso tra i Francesi delle Colonie, i quali chiamano indistintamente *gatti-tigri* i gatti pardi, e le tigri. Il *gatto-tigre*, dice Dampier. *Tom. III. pag. 306.* ch'è comunissimo nella baja di Campeche; ha le gambe corte, e il corpo raccolto, come un mastino; ma rispetto alla testa, al pelo, ed alla maniera di star in agguato per far qualche preda, rassomiglia alla tigre.

guisa della tigre, ma per metterlo in fuga basta il presentargli un tizzone acceso: e in oltre quando è satollo, perde tutto il coraggio, e tutta la vivacità; un sol cane può dargli la caccia. Ei risente in tutto l'indolenza del clima; non è lesto, agile, e leggiere, se non quando è stimolato dalla fame (a). I Selvaggi, naturalmente poltro-

-
- (a) Sonovi nel Brasile alcune tigri, che mentre sentono gli stimoli della fame, son coraggiose, ma poichè son satolle, divengono sì vili, che si danno tosto alla fuga per timore dei cani. *Descrizione delle Indie occidentali, di Herrera. Amst. 1622. pag. 252.* ... V'è una gran quantità di tigri nel Brasile, che dalla fame son rese leggerissime, e formidabili, ma quando son ben pasciute, lo che è rarissimo, sono sì poltrone, e pesanti, che il menomo can da Pastore le mette in fuga. *Storia dell'Indie, di Maffei, Parigi 1665. pag. 69.* Vi sono delle tigri all'intorno di Porto, bello, le cui vicinanze son molto deserte; a quel che appare, esse son tigri di piccola specie, poichè un sol uomo le atterra con una lancia, o qualche altr'arma bianca; e le taglia le zampe l'una dopo l'altra, mentre si rizzano per assalirlo. *Viaggio di Don Giovanni, e Don Antonio de Ulloa. Estratto della Biblioteca ragionata. Tom. XLIV. pag. 413.*

troni, non lasciano di temerne l'incontro, e pretendono ch'egli abbia, per essi maggior cupidigia, che per altri, e che quando li trova addormentati cogli Europei, rispettando quelli, non si getti che sopra di loro (a). Narrafi la stessa cosa del leopardo (b), di cui dicefi, che preferisca gli uomini neri ai bianchi, che sembra che gli conosca all'odore, e che gli distingua, e scelga di notte egualmente, che di giorno.

Gli Autori, che hanno scritta la Storia del Nuovo Mondo, hanno quasi sempre

G^o 3

fat-

(a) Ho inteso alle volte raccontare, che queste tigri erano furiose contro gl' Indiani, e che non assalivano gli Spagnuoli affatto, o poco; ch'esse andavan talora a pigliare, e a scegliere un Indiano addormentato fra gli Spagnuoli, e che sel portavan via. *Storia Naturale delle Indie, di Giuseppe Acofta. Parigi 1600. pag. 190.*

(b) Nella provincia di Bamba nel regno del Congo vi sono alcune tigri, che non assalgon giammai gli uomini bianchi, ma s'avventano sovente su i neri, di modo che trovando esse talvolta due uomini, bianco l'uno, e l'altro nero, addormentati l'un vicino all'altro, gettansi furiose sopra il nero senza offendere in modo veruno il bianco. *Viaggio intorno al mondo, di Francesco Drack. Parigi 1641. pag. 105.*

fatta menzione di quest' animale , alcuni chiamandolo *tigre*, o *leopardo*, ed altri, co' nomi propri, che gli si davano nel Brasile, nel Messico ec. I primi; che ne fecero una circostanziata descrizione, sono Pison, e Marcgrave; eglino lo chiamaron *Jaguar* in cambio di *Janouara*, ch'era il vero nome in lingua Brasiliana (a); eglino hanno parimente additato un altro animale dello stesso genere, e forse anche della medesima specie sotto il nome di *Jaguaresto*. Nel-

-
- (a) Evvi nel Brasile una bestia rapace, che i Selvaggi chiamano *Janou-ara*, la qual ha le gambe così alte, come quelle d'un levriere; ma essa ha de' gran peli intorno al mento (lo Scrittore intende i peli del musaccio), la pelle molto bella, e screziata, come quella d'una lonza, e le rassomiglia moltissimo anche in tutto il rimanente. *Viaggio di Gio: de Lery. Parigi 1578. pag. 162.* --- Il janouar è una specie di lonza grande, come un alano d'Inghilterra, ed ha la pelle fornita di molto pelo, e tutta segnata di macchie. *Missioni dei Cappuccini, del Padre d'Abbeville. Parigi 1614. pag. 231.* --- Il janouara del Brasile non vive, che di rapina; è della statura d'un levriere, ed ha la pelle sparsa di macchie. *Viaggio di Coryal, Tom. I. pag. 173.*

Nella nostra enumerazione noi l'abbiam distinto dal Jaguar, come hanno fatto i due sopraccitati Autori, perchè vi è qualche probabilità, ch'essi possan essere animali di specie differente; noi però non avendo veduto, che un solo di questi due animali, non possiam decidere se sian essi realmente due specie distinte, o se faccian soltanto una varietà della medesima specie. Pison, e Marcgrave dicono, che il jaguarretto è diverso dal jaguar, perchè ha il pelo più corto, più lustro, e d'un color tutto differente, essendo nero, e sparso di macchie ancor più nere. Ma del resto, ci rassomiglia tanto al jaguar per la forma del corpo, pel naturale, e pe' costumi, che potrebbe ben non esser altro, che una varietà della medesima specie; tanto più che si è dovuto notare, sulla testimonianza eziandio di Pison, che nel jaguar il colore del fondo del pelo, e quello delle macchie, di cui è sparso, soglion variare in diversi individui di questa medesima specie. Egli dice, che alcuni son segnati di macchie nere, e altri di macchie rosse, o gialle; e riguardo alla differenza totale del colore, cioè, del bianco, del grigio, o dal fulvo al nero, questa si trova in varie altre specie d'animali; vi ha de' lupi neri, delle volpi nere, degli scojattoli neri, ec. e se queste variazioni della natura son più rare negli animali selvaggi, che ne' dome-

stici, ciò proviene perchè il numero dei casi, che le possono produrre, è minore nei primi, che menando una vita più uniforme, con alimenti men variati, e in una libertà maggiore, che gli ultimi, debbon esser d'una natura più costante, cioè men soggetta a' cambiamenti e a quelle variazioni, che si hanno a riguardar come accidentali, quando non cadono, che sul color del pelo.

Il jaguar si trova nel Brasile, nel Paraguai (a), nel Tucuman (b), nella Guiana (c), nel paese delle Amazzoni (d), nel Messico (e), e in tutte le contrade meridionali.

(a) Storia del Paraguai, del Padre Charlevoix Tom. I pag. 31. e 171. Vedi pure lo stesso Tom. IV. pag. 95.

(b) Vedi idem ibidem.

(c) Viaggio della Francia equinoziale, di Binet, Parigi 1664. pag. 343.; e Desmarchais Tom. III. pag. 299.

(d) Trovasi il jaguar nelle terre del Maragnon, Storia delle Missioni dei Cappuccini nell'isola del Maragnon, del P. Abbeville. Parigi 1614. pag. 251.

(e) Vedesi sulle montagne del Messico un animale feroce, che si chiama una lonza, ch'è della forma, e della statura d'un lupo cerviero, ma ch'è armato d'unghie, come d'uccelli di rapina e la cui testa ras-

dionali dell' America ; egli è però a Cajenna più raro del cugar, che colà è chiamato *Tigre rossa* ; ed il jaguare nel Brasile, che sembra essere il suo natio paese, è men comune a' nostri dì di quello, che lo fosse altre volte: chi l'uccide è colà premiato ; onde se n'è fatta molta distruzione, e perciò dalle coste (a) egli s'è ritirato lungi nella profondità delle terre. Il jaguaretto è sempre stato più raro, o almeno s'è allontanato anche maggiormente dai luoghi abitati (b) ; e il picciol numero de' Viaggiatori, che ne han fatta menzione, sembrano non parlarne, che sulle relazioni di Marcgrave, e di Pison.

G 5.

IL

rassomiglia affai a quella d' una tigre, *Viaggio di Voodes Rogers, tradotto dall' Inglese in Francese. Amst. 1710. Tom. II. pag. 42.*

(a) *Viaggio di Dampier. Roano 1715. Tom. II. pag. 69.*

(b) *Viaggio di Desmarchais. Tom. III. pag. 300.*

IL CUGUAR. (a).

IL cugar ha la statura lunga quanto il Jaguar, ma è di pelo men guernito; egli è più sciolto, più magro, e più alto sulle gambe: ha la testa piccola, lunga la coda, il pelo corto, e di colore quasi uniforme, d'un rosso vivo, mischiato d'alcu-

(a) Il *Cuguar*, nome che noi abbiain dato a quest'animale, e che abbiain tratto per contrazione dal suo nome Brasiliano *Cuguacu-ara*, e che si pronunzia *Cougouacu-ara*. Nella Guiana si chiama *tigre-rossa*.

Cuguacu-ara. Pison, *Hist. Nat.* pag. 105.

Cuguacu-arana. Marcgravii. *Hist. Brasil.* pag. 245.

Cuguacu-arana, *Brafilienfibus*. Ray. *Synops-quadrup.* pag. 169.

Tigris fulvus. Barrere. *Hist. Franc. equin.* p. 186.

Felis ex flavo rufescens, mento & infimo ventre albicantribus. . . *Tigris fulva*. La tigre rossa, Brisson, *Regn. animal.* pag. 272.

Tigre, in America, la cui pelle è bruna senza esser molcata. *Viaggio del Sig. de la Condamine sul fiume delle Amazzoni*. Parigi 1745. pag. 162.

cune tinte nericce, massimamente sul dorso; non è segnato nè di lunghe fasce, come la tigre, nè di macchie rotonde e piene, come il leopardo, nè di macchie a foggia d'anelli o di rose, come la lonza e la pantera; ha il mento biancastro, come lo è anche la gola, e tutte le parti inferiori del corpo. Benchè più debole, è nondimeno egualmente feroce, e forse più crudele, che'l jaguar; e sembra anche più furioso sulla preda (a), e se la divora senza farla in pezzi; afferrata che l'abbia, la squarcia per ogni parte, la fucchia, indi se la trangugia, nè l'abbandona, finchè non se ne sia pienamente saziato.

Quest'animale è assai comune nella Guiana; altre volte fu veduto giugnere a nuoto, e in gran numero nell'isola di Cajenna (b) per assalire, e devastare le mandre: nè principj era questo un flagello per la Colonia, ma a poco a poco questo pernizio-

G 6

zio-

(a) *Cuguacu arana*. Tigre rossa, o piuttosto bajorossa, ch'è la più ghiotta, e la più carnivora di tutte. Barrere. *Stor. della Fran. equin.* pag. 166.

(b) Viaggio di Desmarchais pag. 300. --- La colonia di Cajenna non ha avuto a soffrire maggior flagello di quello delle tigri. *Viaggio di Voodes Rogers. Amst.* 1710, Tom. III, pag. 28.

zioso animale ne fu scacciato, distrutto, e relegato lungi da' luoghi abitati. Ei si trova nel Brasile, nel Paraguai, nel paese delle Amazzoni, e con molta probabilità si crede, che l'animale, che in alcune relazioni ci è indicato sotto il nome d'*Ocorome* (a) così chiamato nel paese dei Moxes nel Perù, sia lo stesso che il Cugar, come anche quello del paese degli Irochesi (b), che fu creduto una tigre, benchè non sia moscato, come la pantera, nè di lunghe fasce segnato, come la tigre.

Il cugar, per la leggerezza del corpo e per la maggior lunghezza delle gambe, dee

(c) L'ocorome, del paese dei Moxes nel Perù è della grandezza d'un gran cane; il suo pelo è rosso, il muso puntuto, i denti molto affilati. *Lettere edificanti, decima raccolta. Parigi 1715.* -- Secondo Volume dei Viaggi di Coreal. *Parigi 1722. pag. 352.*

(a) Nel paese degli Irochesi trovansi delle tigri di color grisolino, che non son affatto moscate; han la coda molto lunga, e danno la caccia all'istrice. Gl' Irochesi le ammazzano più spesso sugli alberi, che a terra. . . . Alcune hanno il pelo rossiccio; tutte poi l'hanno finissimo, e le loro pelli servono a farne bellissime pellicce. *Storia della Nuova Francia, del P. Charlevoix, Parigi 1744. Tom. I. pa. 272.*

dee correr meglio che il jaguar, e più facilmente anche arrampicarsi su pegli alberi; tutti e due quando si trovan ben pasciuti, son egualmente pigri, e poltroni; non assalgono quasi mai gli uomini, purchè non li trovino addormentati. Se qualcheduno vuol la notte passare, o restarsene ne' boschi, basta che accenda del fuoco (a) per tenerli lontani. Essi godono di starsene all'ombra delle folte boscaglie, si nascondono in qualche macchia, o anche sopra qualche albero molto frondoso, donde si lanciano su gli animali, che passano. Benchè non vivano che di rapina, e fogliano più spesso abbeverarsi di sangue, che d'acqua, pretendesi nondimeno, che la loro carne sia ottima a mangiarsi: Pilon dice espressamente, ch'essa è tanto buona quanto quella del vitello (b); altri la paragonano a quel-

(a) Gl' Indiani abitatori delle spiagge dell'Orenoco nella Guiana, durante la notte accendon del fuoco per ispaventar le tigri, le quali, finchè il fuoco è acceso, non osano di avvicinarsi. . . . Fin tanto, che dura il fuoco, non si ha a temer di queste tigri, quando anche esse fossero in gran numero. *Storia Naturale dell'Orenoco, del Padre Giuseppe Jumilla, tradotta dallo Spagnuolo. Avignon 1758. Tom. II. pag. 3.*

(b) *Nec est, quod aliquis putet a Barbaris tantum*

quella del montone (a): io però non mi sò indurre a credere, che la sia realmente una vivanda di buon sapore; e voglio piuttosto attenermi alla testimonianza di Desmarchais (b), il quale dice, che la miglior cosa in questi animali è la pelle, con cui si fanno delle gualdrappe di cavalli, e che poco suol piacere la sua carne, la quale è magra, e d'un'odore per lo più assai spiacevole.

La

rum expeti carnem horum rapacium animalium: illae enim quae rufescentibus & flavescuntibus maculis sunt, ab omnibus passim Europaeis incolis, instar vitulinae, aestimantur.
Pison, Hist. Nat. pag. 103.

- (c) Le Tigri del paese degl' Irochesi son buone, secondo il giudicio anche de' Francesi, che ne stimano la carne al pari di quella del montone. *Storia della nuova Francia, del P. Charlevoix. Parigi 1744. Tom. I. pag. 272.*
- (b) Viaggio di Desmarchais. *Parigi 1730, Tom. III. pag. 299. e 300.*

LA LINCE

O LUPO CERVIERO (a).

I Socj dell' Accademia delle Scienze ci han data un' ottima descrizione della lince.

(a) La lince o lupo-cerviero. Λύξ. *Ælian. Chaus*, *lupus cervarius*. *Plin.* *Raphius* vel *rufus* apud Gallos *Plinio teste*. In Francese, *Lynx* ou *Loup cervier*: in Italiano anche *Lupo-gatto*: in Spagnuolo, *Lynce*: in Tedesco, *Luchs*: in Polacco, *Rys*, *Ostrowidz*: in Inglese, *Ounce* secondo Ray, *Luzarne*, secondo Cajo: in Svezese, *Wargla*, secondo Linneo.

Lupus cervarius, *lynx*, *chaus*, *raphius*. *Gesn. Hist. quadrup.* pag. 678.

Lynx, *Aldrov. de quadrup. dig. vivip.* pag. 90. e 92.

Lynx, Ray, *Synops. quadrup.* pag. 166.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculoso. *Linn. Syst. nat. edit. iv.* pag. 64., & edit. vi. pag. 4. --- *Felis cauda abbreviata*, apice atra, auriculis apice barbatis. *Linn. Syst. nat. edit. x.* pag. 43.

Lynx. *Jonston, de quadrup.* pag. 83.

Lupo cerviero. *Memorie per servire alla Storia*

quella del montone (a): io però non mi so indurre a credere, che la sia realmente una vivanda di buon sapore; e voglio piuttosto attenermi alla testimonianza di Desmarchais (b), il quale dice, che la miglior cosa in questi animali è la pelle, con cui si fanno delle gualdrappe di cavalli, e che poco suol piacere la sua carne, la quale è magra, e d'un odore per lo più assai spiacevole.

La

rum expeti carnem horum rapacium animalium: illæ enim quæ rufescentibus & flavescuntibus maculis sunt, ab omnibus passim Europæis incolis, instar vitulinæ, æstimantur.
Pison, *Hist. Nat.* pag. 103.

(c) Le Tigri del paese degl' Irochesi son buone, secondo il giudizio anche de' Francesi, che ne stimano la carne al pari di quella del montone. *Storia della nuova Francia, del P. Charlevoix. Parigi 1744. Tom. I. pag. 272.*

(b) Viaggio di Desmarchais. *Parigi 1730. Tom. III. pag. 299. e 300.*

LA LINCE

O LUPO CERVIERO (a).

I Socj dell' Accademia delle Scienze ci han data un' ottima descrizione della
lin-

(a) La lince o lupo-cerviero. *Angl.* *Ælania Chaus*, *lupus cervarius*. *Plin.* *Rapbin* vel *rufus* apud Gallos *Plinio* teste. In Francese, *Lynx* ou *Loup cervier*: in Italiano anche *Lupo-gatto*: in Spagnuolo, *Lynce*: in Tedesco, *Luchs*: in Polacco, *Rys*, *Ostrowidz*: in Inglese, *Ounce* secondo Ray, *Luzarne*, secondo Cajo: in Svezzeze, *Wargla*, secondo Linneo.

Lupus cervarius, *lynx*, *chaus*, *rapbin*. *Gesn. Hist. quadrup.* pag. 678.

Lynx, *Aldrov. de quadrup. dig. vivip.* pag. 90. e 92.

Lynx, Ray, *Sinops. quadrup.* pag. 166.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato. *Linn. Syst. nar. edit. iv.* pag. 64., & edit. vi. pag. 4. --- *Felis cauda abbreviata*, apice atra, auriculis apice barbatis. *Linn. Syst. nar. edit. x.* pag. 43.

Lynx. *Jonston, de quadrup.* pag. 83.

Lupo cerviero. *Memorie per servire alla Storia*

lince o *lupo-cerviero* (a), e con una critica affai illuminata hanno esaminati i fatti, e i nonni, che negli scritti degli Antichi hanno rapporto a quest' animale. Egli-
no fan vedere, che la *lince* d' Eliano è lo stesso animale, che quello, ch' essi han descritto, e notomizzato sotto il nome di *lupo-cerviero*; e censurano con ragione coloro, che l' han preso per l' animale, che da Aristotele vien chiamato *Thos*. Questa difamina è sparsa d' osservazioni, e di riflessioni veramente sode, e interessanti. Generalmente parlando la descrizione di quest' animale è una delle meglio fatte di tutta l' opera: non si può nemmeno biasimarli, perchè, dopo d' aver provato, che quest' animale è la *Lince* d' Eliano, e non già il *Thos* d' Aristotele, non gli hanno conservato il suo vero nome *Lynx* ossia *lince*, e gli hanno dato in francese lo stesso nome, che Gaza diede in latino al *Thos* d' Aristotele: Gaza in fatti fu il primo, che nella traduzione

-
- via degli animali*, parte I. pag. 127.
Lynx. Aldrovandi. Klein, *de quadrup.* pag. 77.
Felis auricularum apicibus pilis longissimis praeditis, cauda brevi. --- *Lynx*. Le loup-cervier. Brisson, *Regn. animal.* pag. 275.
 (b) *Memorie per servire alla Storia degli animali*; parte I. pag. 127. e seguenti.

ne della Storia degli Animali d' Aristotele abbia tradotto *Sus* per *Lupus-cervarius*; eglino avrebbon soltanto dovuto avvertire, che pel nome di *lupo-cerviero* non intendevan già il *Lupus-cervarius* di Gaza, o il *Thos* d' Aristotele, ma il *Lupus-cervarius* o il *Chaus* di Plinio. Abbiám parimente notato, che dopo d' aver essi, seguendo Opiano, ottimamente accennato esservi due specie, o due razze di Lupi-cervieri, alcuni più grandi, che cacciano, e assalgono i daini, e i cervi, e gli altri animali più piccioli, che non fan guérra che alle lepri, hanno poi messe insieme due specie realmente differenti, cioè la lince segnata di macchie, che comunemente incontrasi ne' paesi settentrionali; e la lince del Levante, o della Barberia, il cui pelo è senza macchie, e di colore uniforme. Noi abbiám veduti vivi questi due animali; essi si rassomigliano per molti riguardi, hanno amendue un lungo mazzetto di pelo nero all' estremità delle orecchie: e questo carattere particolare, per cui Eliano dinotò il primo la lince, non appartiene in fatti, che a questi due animali; e questo è probabilmente ciò che ha fatto determinare i Socj dell' Accademia a riguardarli tutti e due come costituenti una sola specie. Ma indipendentemente dalla diversità del colore, e delle macchie del pelo, dalla Storia che segue, si vedrà che
affai

affai verisimilmente questi animali sono di specie differenti.

Il Sig. Klein (a) asserisce, che le linci le più belle sono in Africa, e in Asia, principalmente nella Persia; ch'egli n'ha veduta una in Dresda venuta dall'Africa, la quale era ben moscata, e ben alta sulle gambe; che quelle d'Europa, e propriamente quelle, che vengono dalla Prussia, e dagli altri paesi del Settentrione, sono men belle; e che non hanno, che poco o nulla di bianco, che son piuttosto rossiggianti con macchie confuse, e cumulate (*maculis confluentibus* &c.). Senza voler assolutamente negare ciò, che qui dice il Sig. Klein, confesso che non ho altrimenti trovato, che siffatta lince abitasse ne' paesi caldi dell'Africa, e dell'Asia. Kolbe (b) è il solo a dire, ch'essa è comune nel Capo di Buona-Speranza, e che perfettamente rassomiglia a quella del Brandeburghese in Germania; ma ho notate tante altre cose spregevoli nelle Memorie di quest'Autore, ch'io non presto quasi veruna fede alle sue testimonianze, purchè non vadan esse d'accordo con quelle degli altri. Or tutt'i Viaggiatori dicono d'aver vedute

(a) Klein, *de quadrup.* pag. 77.

(a) Mem. di Kolbe. *Amst.* 1741. Tom. III. pag. 63.

te delle *linci*, o *lupi-cervieri* di pelle segnata a macchie nelle parti settentrionali della Germania, nella Lituania, nella Moscovia, nella Siberia, nel Canada, e in altre provincie del Setteentrione d'ambidue i continenti; ma niuno, fra tutti quelli, ch'io ho letti, dice d'aver incontrato quest'animale ne' climi caldi dell'Africa, e dell'Asia: le linci del Levante, della Barberia, dell'Arabia, e delle altre regioni calde, sono, come abbiain detto di sopra, d'un color uniforme, e senza macchie; esse adunque non son quelle, di cui il Sig. Klein ha parlato; che secondo lui sono ben moscate, nè quelle di Kolbe, che perfettamente rassomigliano, dic'egli, a quelle del Brandeburghese. Sarebbe malagevole il conciliare queste testimonianze con ciò, che altronde noi sappiamo: la lince è certamente un animale più comune ne' paesi freddi, che ne' temperati, e ne' caldi paesi è per lo meno rarissimo. Era bensì noto ai Greci (a), ed ai Latini; ma ciò non
sup-

(a) I Greci, che nelle loro favole non lasciavano di conservare il verisimile, e sopra tutte le circostanze de' tempi e de' luoghi, dissero ch'era un Re della Scizia quegli, che fu cangiato in lince; il che sembra indicare, che la lince fosse un animale della Scizia.

suppone, che fusse originario dell' Africa, o delle provincie meridionali dell' Asia: Plinio dice al contrario; che le prime lince, che furon vedute in Roma a' tempi di Pompeo, erano state mandate dalle Gallie. Presentemente in Francia non ve n' ha pur una, purchè non ve ne fusse qualcuna su' Pirenei, o sulle Alpi; ma sotto il nome di Gallie i Romani comprendevano eziandio gran tratto de' paesi settentrionali, e inoltre tutto il Mondo sa, che a' nostri giorni la Francia è assai men fredda di quel, che fosse la Gallia. Le più belle pelli di lince vengono dalla Siberia (a) sotto il nome di lupo-cerviero, e dal Canada (b) sotto quello di gatto-cerviero, per-

(a) Trovansi nella Russia molti lupi-cervieri, che han bella la pelle, benchè men pregiati di quelli della Siberia. *Nuova Memoria sulla Russia grande. Parigi 1725. Tom. II. pag. 73.*

(b) Il lupo cerviero dell' America settentrionale è una specie di gatto, ma molto più grosso; suole questi pure salire sugli alberi, e vive degli animali, che gli riesce d' affer- rare: il pelo n' è lungo, d' un grigio bianco, ed è una buona pelliccia: la carne n' è bianca, e assai buona a mangiare. *Descrizione delle coste dell' America settentrionale. Parigi 1672. Tom. II. pag. 441.*

perchè essendo questi animali, siccome tutti gli altri, più piccoli nel nuovo continente che nell'antico, in Europa sono stati per la grandezza paragonati al lupo, e in America (a) al gatto selvaggio.

Ciò, per cui sembra aver errato il Sig. Klein, e che potrebbe eziandio ingarnarne molti altri men valenti di lui, si è 1.^o che gli Antichi dissero, che l'India aveva somministrate le linci al Dio Bacco (b); 2.^o che Plinio ha creduto, che v'eran Linci in Etiopia (c), e scrisse che se ne prepa-

(b) Ne' boschi del Canada vi sono mol'i lupi, o per meglio dire gatti cervieri, poichè non rassomigliano al lupo, che per una specie di urlo, e in tutto il resto sono, dice il Sig. Sarrafin, *ex genere felino*. Essi son veri cacciatori, che non vivono che di salvaggiume, che gli riesce di afferrare, e cui inseguono fino alla cima degli alberi i più alti. La loro carne è bianca, e buona a mangiare. Il pelo, e le pelli sono ben note in Francia, e passano per una delle più belle pellicce di questo paese, e sono uno de' principali capi del commercio. *Storia della nuova Francia, del Padre Charlevoix Tom. III. pag. 333.*

(b) *Vitis racemifera lyncas dedit India Baccho*
Ovid. *Metamor.*

(c) Plinio, *Hist. Nat. lib. VIII. cap. XXI. e lib.*

parava il cuojo, e le unghie in *Carpathos*, oggi *Scarpanto* o *Zerpanto*, isola del Mediterraneo posta tra Rodi, e Candia; 3.^o che Gelnero (a) ha fatto un articolo particolare della Lince dell'Asia, o dell'Africa, il qual articolo contien l'estratto d'una lettera d'un Barone di Balicze: nel vostro libro degli animali voi non avete fat-

lib. XXVIII. cap. VIII. ... E' da notarsi, che Plinio non parla qui che della lince, e non già del lupo-cerviero; che tutte le virtù, e proprietà del pelo, delle unghie, dell'urina ec. non riguardano, che l'animale, ch'egli chiama lince, e ch'egli cita, come un animale straordinario, un mostro d'Etiopia: e che qui non si parla del lupo cerviero; poichè egli positivamente assicura, che il lupo-cerviero era stato mandato dalle Gallie agli spettacoli di Roma. La sola cosa, che potrebbe far sospettare, che il *Chaus*, o *lupus-cervarius* di Plinio non sia il nostro lupo-cerviero, si è, ch'ei dice, ch'esso ha la figura del lupo, e le macchie della pantera: ma questo dubbio svanirà, se si considereranno tutte le circostanze, e se d'altra parte si rifletterà, che fra tutti gli animali di rapina, che si trovano ne' paesi settentrionali, il lupo cerviero è il solo, il cui mantello sia macchiato come quello della pantera.

(a) Gelner, *Hist. quadrup. pag. 683.*

fatta menzione, dic' egli a Gesnero, della lince Indiana, o Africana; ma perchè Plinio ne ha parlato, così l'autorità di questo grand' uomo m' ha indotto a mandarvi il disegno di quest' animale, affinchè ne parliate . . . Egli è stato disegnato in Costantinopoli, è molto diverso dal lupo-cerviero di Germania, è molto più grande, ha il pelo assai più ruvido, e più corto ec. Gesnero senza far altre riflessioni su questa lettera, si contenta di riferirne la sostanza, e di dire in una parentesi, che il disegno dell' animale non gli è pervenuto.

Perchè non si abbia più a cadere in simil errore osserveremo 1. che i Poeti; e i Pittori hanno attaccate al cocchio di Bacco tigri, pantere, e linci, secondo il lor capriccio, o piuttosto perchè tutte queste bestie feroci, e con pelle macchiata erano egualmente a Bacco consacrate; 2. che tutto l' equivoco quì nasce dalla parola *lince*, poichè egli è chiaro, paragonando Plinio con lui stesso (a), che l' animale, ch' ei

(a) Pompeii magni primum ludì ostenderunt Chaum, quem Galli Rhabium vocabant, officie lupi, pardorum maculis. Plinii lib. VIII. cap. XIX. --- Sunt in eo genere (scilicet luporum), qui cervarii vocantur, qualem è Gallia in Pompeii Magni arena spectata.

ei chiama *lynx*, e che dice trovarsi in Etiopia, non è affatto quello, che appella *chaus* o *lupus-cervarius*, che veniva da' paesi settentrionali; che il Barone di Balicze è stato ingannato da questo stesso nome malamente applicato, benchè ei riguardi la lince Indiana come un animal diverso dal *Luchs* di Germania, cioè dalla nostra lince, o lupo-cerviero: questa lince Indiana o Africana, ch'ei dice esser molto più grande, e meglio macchiata, che il nostro lupo-cerviero, porea forse non essere, che una

Etatum diximus. Plinii lib. VIII. cap. XXII. --- Lynxas vulgo frequentes & sphingias, fusco pilo, mammis in pectore geminis, Ethiopia generat, multaque alia monstra similia. Plinii, lib. VIII. cap. XXI. --- Egli è chiaro, paragonando questi tre passi, che il *Chaus*, e il *lupus-cervarius* sono lo stesso animale, e che la *lynx* n'è un altro. La sola cosa, che a Plinio rimproverar si possa, si è che ingannato egli apparentemente dal nome, dice che questo animale ha la figura del lupo (*effigie lupi*). Il lupo cerviero è, come il lupo comune, un animal da rapina, gli si accosta eziandio per la grandezza del corpo, ed ha, com'esso, una specie d'urlo, o di grido allungato, ma per tutto il restante n'è assolutamente diverso.

una specie di pantera. Checchè ne sia di quest'ultima conghiettura, sembra che la lince, o lupo-cerviero, di cui quì si parla, non trovisi affatto nelle contrade meridionali, ma soltanto ne' paesi settentrionali dell'antico, e del nuovo continente. Olao (a) dice, che questo è molto ovvio nelle foreste del settentrione dell'Europa: Oleario (b) assicura la stessa cosa, parlando della Moscovia: Rosino Lentilio dice, che le linci son comuni nella Curlandia, e nella Lituania, e che quelle della Cassubia (c) (provincia della Pomerania) sono più piccole, e men macchiate di quelle della Polonia, e della Lituania: finalmente a queste testimonianze Paolo Giovio aggiunge, che le più belle pelli di lupo-cerviero vengono dalla Siberia (d), e che se ne fa gran commercio in Ustivaga, città seicento miglia distante da Mosca.

Quest'animale, che come vedesi, soggiorna più volentieri ne' climi freddi, che ne' paesi temperati, è del numero di quel-

Tom. X.

H

li,

(a) *Hist. de gentibus septent. ab Olao magno.* Antuerpiæ 1558. lib. XVIII. pag. 139.

(b) Relazione di Adamo Oleario. Tom. I. pag. 121.

(c) *Auctuarium Hist. Nat. Poloniae*, a Gabriele Rzaczynski. Geldani. 1742.

(d) Vedi Aldrov. de quadrup. di git. pag. 96.

lince o *lupo-cerviero* (a), e con una critica assai illuminata hanno esaminati i fatti, e i nomi, che negli scritti degli Antichi hanno rapporto a quest' animale. Egli-
no fan vedere, che la *lince* d' Eliano è lo stesso animale, che quello, ch' essi han descritto, e notomizzato sotto il nome di *lupo-cerviero*; e censurano con ragione coloro, che l' han preso per l' animale, che da Aristotele vien chiamato *Thos*. Questa disamina è sparfa d' osservazioni, e di riflessioni veramente sode, e interessanti. Generalmente parlando la descrizione di quest' animale è una delle meglio fatte di tutta l' opera: non si può nemmeno biasimarli, perchè, dopo d' aver provato, che quest' animale è la *Lince* d' Eliano, e non già il *Thos* d' Aristotele, non gli hanno conservato il suo vero nome *Lynx* ossia *lince*, e gli hanno dato in francese lo stesso nome, che Gaza diede in latino al *Thos* d' Aristotele: Gaza in fatti fu il primo, che nella traduzione

via degli animali, parte I. pag. 127.
Lynx. Aldrovandi. Klein, de quadrup. pag. 77.

Felis auricularum apicibus pilis longissimis praeditis, cauda brevi. ... Lynx. Le loup-cervier. Brisson, Regn. animal. pag. 275.

(b) *Memorie per servire alla Storia degli animali*; parte I. pag. 127. e seguenti.

ne della Storia degli Animali d' Aristotele abbia tradotto *Sus* per *Lupus-cervarius*; eglino avrebbon soltanto dovuto avvertire, che pel nome di *lupo-cerviero* non intendevan già il *Lupus-cervarius* di Gaza, o il *Thos* d' Aristotele, ma il *Lupus-cervarius* o il *Chaus* di Plinio. Abbiám parimente notato, che dopo d' aver essi, seguendo Opiano, ottimamente accennato esservi due specie, o due razze di Lupi-cervieri, alcuni più grandi, che cacciano, e assalgono i daini, e i cervi, e gli altri animali più piccioli, che non fan guètra che alle lepri, hanno poi messe insieme due specie realmente differenti, cioè la lince segnata di macchio, che comunemente incontrasi ne' paesi settentrionali; e la lince del Levante, o della Barberia, il cui pelo è senza macchie, e di colore uniforme. Noi abbiám veduti vivi questi due animali; essi si rassomigliano per molti riguardi, hanno amendue un lungo mazzetto di pelo nero all' estremità delle orecchie: e questo carattere particolare, per cui Eliano dinotò il primo la lince, non appartiene in fatti, che a questi due animali; e questo è probabilmente ciò che ha fatto determinare i Socj dell' Accademia a riguardarli tutti e due come costituenti una sola specie. Ma indipendentemente dalla diversità del colore, e delle macchie del pelo, dalla Storia che segue, si vedrà che
assai

affai verisimilmente questi animali sono di specie differenti.

Il Sig. Klein (a) asserisce, che le linci le più belle sono in Africa, e in Asia, principalmente nella Persia; ch'egli n'ha veduta una in Dresda venuta dall'Africa, la quale era ben mofcata, e ben alta sulle gambe; che quelle d'Europa, e propriamente quelle, che vengono dalla Prussia, e dagli altri paesi del Settentrione, sono men belle; e che non hanno, che poco o nulla di bianco, che son piuttosto rossigianti con macchie confuse, e cumulate (*maculis confluentibus* &c.). Senza voler assolutamente negare ciò, che qui dice il Sig. Klein, confesso che non ho altrimenti trovato, che siffatta lince abitasse ne' paesi caldi dell'Africa, e dell'Asia. Kolbe (b) è il solo a dire, ch'essa è comune nel Capo di Buona-Speranza, e che perfettamente rassomiglia a quella del Brandeburghese in Germania; ma ho notate tante altre cose spregevoli nelle Memorie di quest'Autore, ch'io non presto quasi veruna fede alle sue testimonianze, purchè non vadan esse d'accordo con quelle degli altri. Or tutt'i Viaggiatori dicono d'aver vedute

(a) Klein, *de quadrup.* pag. 77.

(a) Mem. di Kolbe. *Amst.* 1741. Tom. III. pag. 63.

te delle *linci*, o *lupi-cervieri* di pelle segnata a macchie nelle parti settentrionali della Germania, nella Lituania, nella Moscovia, nella Siberia, nel Canada, e in altre provincie del Setteentrione d'ambidue i continenti; ma niuno, fra tutti quelli, ch'io ho letti, dice d'aver incontrato quest'animale ne' climi caldi dell'Africa, e dell'Asia: le linci del Levante, della Barberia, dell'Arabia, e delle altre regioni calde, sono, come abbiain detto di sopra, d'un color uniforme, e senza macchie; esse adunque non son quelle, di cui il Sig. Klein ha parlato; che secondo lui sono ben moscate, nè quelle di Kolbe, che perfettamente rassomigliano, dic'egli, a quelle del Brandeburghese. Sarebbe malagevole il conciliare queste testimonianze con ciò, che altronde noi sappiamo: la lince è certamente un animale più comune ne' paesi freddi, che ne' temperati, e ne' caldi paesi è per lo meno rarissimo. Era bensì noto ai Greci (a), ed ai Latini; ma ciò non
sup-

(a) I Greci, che nelle loro favole non lasciavano di conservare il verisimile, e sopra tutte le circostanze de' tempi e de' luoghi, dissero ch'era un Re della Scizia quegli, che fu cangiato in lince; il che sembra indicare, che la lince fosse un animale della Scizia.

suppone, che fusse originario dell' Africa, o delle provincie meridionali dell' Asia: Plinio dice al contrario; che le prime linci, che furon vedute in Roma a' tempi di Pompeo, erano state mandate dalle Gallie. Presentemente in Francia non ve n' ha pur una, purchè non ve ne fusse qualcuna su' Pirenei, o sulle Alpi; ma sotto il nome di Gallie i Romani comprendevano eziandio gran tratto de' paesi settentrionali, e inoltre tutto il Mondo sa, che a' nostri giorni la Francia è assai men fredda di quel, che fosse la Gallia. Le più belle pelli di lince vengono dalla Siberia (a) sotto il nome di lupo-cerviero, e dal Canada (b) sotto quello di gatto-cerviero, per-

(a) Trovansi nella Russia molti lupi-cervieri, che han bella la pelle, benchè men pregiati di quelli della Siberia. *Nuova Memoria sulla Russia grande. Parigi 1725. Tom. II. pag. 73.*

(b) Il lupo-cerviero dell' America settentrionale è una specie di gatto, ma molto più grosso; suole questi pure salire sugli alberi, e vive degli animali, che gli riesce d' affer- rare: il pelo n' è lungo, d' un grigio bian- co, ed è una buona pelliccia: la carne n' è bianca, e assai buona a mangiare. *De- scrizione delle coste dell' America settentrio- nale. Parigi 1672. Tom. II. pag. 441.*

perchè essendo questi animali, siccome tutti gli altri, più piccoli nel nuovo continente che nell'antico, in Europa sono stati per la grandezza paragonati al lupo, e in America (a) al gatto selvaggio.

Ciò, per cui sembra aver errato il Sig. Klein, e che potrebbe eziandio ingannarne molti altri men valenti di lui, si è 1.^o chè gli Antichi dissero, che l'India aveva somministrato le linci al Dio Bacco (b); 2.^o che Plinio ha creduto, che v'eran Linci in Etiopia (c), e scrisse che se ne prepa-

(b) Ne' boschi del Canada vi sono molti lupi, o per meglio dire gatticervieri, poichè non rassomigliano al lupo, che per una specie di urlo, e in tutto il resto sono, dice il Sig. Sarrafin, *ex genere felino*. Essi son veri cacciatori, che non vivono che di salvaggiume, che gli riesce di afferrare, e cui inseguono fino alla cima degli alberi i più alti. La loro carne è bianca, e buona a mangiare. Il pelo, e le pelli sono ben note in Francia, e passano per una delle più belle pellicce di questo paese, e sono uno de' principali capi del commercio. *Storia della nuova Francia, del Padre Charlevoix Tom. III. pag. 333.*

(b) *Vicia racemifera lyncas dedit India Baccho.*
Ovid. *Metamor.*

(c) Plinio, *Hist. Nat. lib. VIII. cap. XXI. e lib.*

parava il cuojo, e le unghie in *Carpathos*, oggi *Scarpanto* o *Zerpanto*, isola del Mediterraneo posta tra Rodi, e Candia; 3.^o che Geinero (a) ha fatto un articolo particolare della Lince dell' Asia, o dell' Africa, il qual articolo contien l'estratto d' una lettera d' un Barone di Balicze: nel vostro libro degli animali voi non avete fat-

lib. XXVIII. cap. VIII. ... E' da notarsi, che Plinio non parla quì che della *lince*, e non già del *lupo-cerviero*; che tutte le virtù, e proprietà del pelo, delle unghie, dell' urina ec. non riguardano, che l' animale, ch' egli chiama *lince*, e ch' egli cita, come un' animale straordinario, un mostro d' Etiopia: e che quì non si parla del lupo cerviero; poichè egli positivamente assicura, che il lupo-cerviero era stato mandato dalle Gallie agli spettacoli di Roma. La sola cosa, che potrebbe far sospettare, che il *Chans*, o *lupus-cervarius* di Plinio non sia il nostro lupo-cerviero, si è, ch' ei dice, ch' esso ha la figura del lupo, e le macchie della pantera: ma questo dubbio svanirà, se si considereranno tutte le circostanze, e se d' altra parte si rifletterà, che fra tutti gli animali di rapina, che si trovano ne' paesi settentrionali, il lupo cerviero è il solo, il cui mantello sia macchiato come quello della pantera.

(a) Geinero, *Hist. quadrup. pag. 683.*

fatta menzione, dic' egli a Gesnero, della linco Indiana, o Africana; ma perchè Plinio ne ha parlato, così l'autorità di questo grand' uomo m' ha indotto a mandarvi il disegno di quest' animale, affinchè ne parliate . . . Egli è stato disegnato in Costantinopoli, è molto diverso dal lupo-cerviero di Germania, è molto più grande, ha il pelo assai più ruvido, e più corto ec. Gesnero senza far altre riflessioni su questa lettera, si contenta di riferirne la sostanza, e di dire in una parentesi, che il disegno dell' animale non gli è pervenuto.

Perchè non si abbia più a cadere in simil' errore osserveremo 1. che i Poeti, e i Pittori hanno attaccate al coccchio di Bacco tigri, pantere, e linci, secondo il lor capriccio, o piuttosto perchè tutte queste bestie feroci, e con pelle macchiata erano egualmente a Bacco consacrate; 2. che tutto l' equivoco quì nasce dalla parola *linco*, poichè egli è chiaro, paragonando Plinio con lui stesso (a), che l' animale, ch' ei

(a) Pompeii magni primum ludi ostenderunt Chaum, quem Galli Rhabium vocabant, efficie lupi, pardorum maculis. Plinii lib. VIII. cap. XIX. --- Sunt in eo genere (scilicet luporum), qui cervarii vocantur, qualem è Gallia in Pompeii Magni arena spectata.

ei chiama *lynx*, e che dice trovarsi in Etiopia, non è affatto quello, che appella *chaus* o *lupus-cervarius*, che veniva da' paesi settentrionali; che il Barone di Balicze è stato ingannato da questo stesso nome malamente applicato, benchè ei riguardi la lince Indiana come un animal diverso dal *Luchs* di Germania, cioè dalla nostra lince, o lupo-cerviero: questa lince Indiana o Africana, ch'ei dice esser molto più grande, e meglio macchiata, che il nostro lupo-cerviero, potea forse non essere, che una

Statum diximus Plinii lib. VIII. cap. XXII. ... *Lyncas vulgo frequentes & sphingae, fusco pilo, mammis in pectore geminis, Ethiopia generat, multaque alia monstra similia*. Plinii, lib. VIII. cap. XXI. ... Egli è chiaro, paragonando questi tre passi, che il *Ebaus*, e il *lupus-cervarius* sono lo stesso animale, e che la *lynx* n'è un altro. La sola cosa, che a Plinio rimproverar si possa, si è che ingannato, egli apparentemente dal nome, dice che questo animale ha la figura del lupo (*effigie lupi*). Il lupo cerviero è, come il lupo comune, un animal da rapina, gli si accosta eziandio per la grandezza del corpo, ed ha, com'esso, una specie d'urlo, o di grido allungato, ma per tutto il restante n'è assolutamente diverso.

una specie di pantera . Checchè ne sia di quest' ultima conghiettura , sembra che la lince, o lupo-cerviero , di cui quì si parla , non trovisi affatto nelle contrade meridionali , ma soltanto ne' paesi settentrionali dell' antico , e del nuovo continente . Olao (a) dice , che questo è molto ovvio nelle foreste del settentrione dell' Europa : Oleario (b) assicura la stessa cosa , parlando della Moscovia : Rosmo Lentilio dice , che le linci son comuni nella Curlandia , e nella Lituania , e che quelle della Cassubia (c) (provincia della Pomerania) sono più piccole , e men macchiate di quelle della Polonia , e della Lituania : finalmente a queste testimonianze Paolo Giovio aggiunge , che le più belle pelli di lupo-cerviero vengono dalla Siberia (d) , e che se ne fa gran commercio in Ustivaga , città seicento miglia distante da Mosca .

Quest' animale , che come vedesi , soggiorna più volentieri ne' climi freddi , che ne' paesi temperati , è del numero di quel-

Tom.X.

H

li ,

(a) *Hist. de gentibus septent. ab Olao magno.* Antuerpiæ 1558. lib. XVIII. pag. 139.

(b) *Relazione di Adamo Oleario . Tom. I.* pag. 121.

(c) *Auctuarium Hist. Nat. Poloniæ , a Gabriele Rzaczynski . Geldani. 1742.*

(d) *Vedi Aldrov. de quadrup. di git. pag. 96.*

li, che han potuto passare da un continente all'altro per le terre del Settentrione, e in fatti fu trovato nell'America settentrionale. I Viaggiatori (a) l'hanno dinotato d'una maniera da non cadervi in abbaglio; e in oltre si fa, che la pelle di quest'animale fa un oggetto di commercio dall'America nell'Europa. I lupi-cervieri del Canada sono soltanto, come già si è detto, più piccoli e più bianchi di que' dell'Europa; e siffatta differenza di grandezza gli ha fatti chiamare gatti-cervieri, e ha

(d) Veggonsi ancora presso i Gaspesiani tre sorte di lupi. Il lupo-cerviero è d'un pelo argentato, ed ha due cornicini alla testa (ei vuol dire alle orecchie) che sono di pelo tutto nero. La carne n'è piuttosto buona, benchè senta un po' troppo del salvatico: quest'animale è più terribile a vederli, che crudele; la pelle n'è assai buona per farne pellicce. *Nuova Relazione della Gaspesia, del Padre Cristiano Leclercq. Parigi 1691. pag. 488.* Nel paese degli Uroni i lupi-cervieri son più frequenti, che i lupi comuni, che vi sono assai rari. *Viaggio di Sagar Theodat. Parigi 1632. pag. 307.* Veggonsi in America bestie rapaci, come leopardi, e lupi-cervieri, ma non già leoni. *Singolarità della Francia antartica, di Thevet. Parigi 1558. pag. 103.*

e ha indotti i Nomenclatori (a) a riguardarli come animali di specie differente (b).

H 2

Non

(a) Il Sig. Linneo, che soggiorna in Upsal, e che dee aver cognizione di quest' animale, poichè si trova nella Svezia, e ne' paesi circonvicini, avea da principio distinto il lupo cerviero dal gatto cerviero. Egli chiamava il primo, *felis cauda truncata, corpore rufescente maculato*. Syst. nat. edit. IV. pag. 64.; & edit VI. pag. 4 : appellava il secondo, *felis cauda truncata, corpore albo maculato*. Syst. nat. laem, ibidem. In Svezese altresì egli chiama il primo *Var-glo*, e'l secondo *Katto*. Fa una Suecic. pag. 2. Ma nella sua ultima edizione egli non distingue più questi animali, e non fa menzione, che d'una sola specie, ch'egli addita colla frase, che segue, *felis cauda abbreviata, apice atra, auriculis apice baybatis*, e di cui dà una breve, e buona descrizione. Sembra dunque, che quest' Autore, il quale da principio distingueva il lupocerviero dal gatto-cerviero, si sia determinato a pensar come noi, che tutteddue non fossero, che lo stesso animale :

(b) *Felis alba maculis nigris variegata, cauda brevi* ... *Catus cervartus*, il gatto cerviero. ... *Felis auricularum apicibus pilis longissimis peditis, cauda brevi* .. *Lynx*, il lupocerviero. Brisson, Regn. animal, pag. 274. e 275.

Non vogliamo su questo proposito pronunziare una decisiva asserzione; diciamo bensì, che ci è sembrato, che il gatto cerviero del Canada, e'l lupo-cerviero della Moscovia siano della medesima specie, 1.º perchè la diversità di grandezza non è molto considerabile, e pressappoco è relativamente la stessa, che quella, che trovasi tra gli animali comuni ai due continenti: essendo i lupi, le volpi, ec. più piccole in America, che in Europa: lo stesso dee accadere della lince, o lupo-cerviero; 2.º perchè nel settentrione, eziandio dell' Europa, questi animali variano nella grandezza, e gli Autori (a) fanno menzione di due specie, più piccola l'una, e l'altra più grande: 3.º finalmente perchè sperimentando questi animali le influenze degli stessi climi, ed essendo del medesimo naturale, e della stessa figura, e non essendo diversi tra loro, che nella grandezza del corpo, e in alcune differenti tinte di colore, questi caratteri non mi pajon sufficienti per dividerli, e per asserire, che siano di due specie differenti.

La lince, della quale gli Antichi disse-
ro,

(a) *Lynce amb.e (magna, & parva) corporis figura similes sunt, & similiter utrisque oculis suaviter fulgent, facies utrisque alacris perlucet, parvum utrisque caput, &c. Opianus.*

ro, che la vista era acuta a segno da penetrare i corpi opachi, e la cui urina avea la maravigliosa proprietà di divenire un corpo solido, una pietra preziosa, chiamata *Lapis lyncurius*, è un animale favoloso del pari, che tutte le proprietà ad esso attribuite. Questa lince immaginaria non ha altro rapporto colla vera lince, che quello del nome: non convien dunque, come si è fatto dalla maggior parte de' Naturalisti, attribuire alla vera lince, ch'è una sostanza reale, le proprietà della lince immaginaria, la cui esistenza sembra essere stata poco creduta da Plinio stesso, poichè egli non ne parla, che come d'una bestia straordinaria, e la pone alla testa delle sfingi, dei pegasi, dei liocorni, e degli altri prodigj, o mostri, che l'Etioopia produce.

La nostra lince non vede attraverso le mura, ma è ben vero, che ha gli occhi vivi, dolce lo sguardo, e l'aria piacevole, e allegra; la sua urina non ha la proprietà di formar pietre preziose, ei la cuopre soltanto di terra, come fanno i gatti, a quali molto rassomiglia, imitandone i costumi, e la pulitezza. Altro ella non ha del lupo, fuorchè una specie d'urlo, che facendosi sentir da lontano ha potuto ingannare i Cacciatori, e fargli credere che udissero il lupo. Questo solo forse bastò, perchè gli fosse dato il nome di *lupo*, a cui, per distinguerlo dal vero lupo, i cac-

ciatori avranno aggiunto l'epiteto di *cerviviro*, perchè egli assale i cervi, o piuttosto, perchè la sua pelle è sparsa di macchie pressappoco, come quelle dei giovani cervi, quando hanno ancora la livrea (a). La lince è più piccola del lupo (b), e più bassa sulle gambe; è comunemente della grandezza d'una volpe, ed è diversa dalla pantera e dalla lonza pe' caratteri seguenti: ha il pelo più lungo, le macchie men vive, e mal terminate, le orecchie molto più grandi, e terminanti alle loro estremità con un mazzetto di peli neri, la coda molto più corta, e nera all'estremità, bianco il contorno degli occhi, e l'aria della faccia più piacevole, e men feroce. Il mantello del maschio è meglio segnato di macchie, che quello della femmina. Quest'animale non corre seguitamente come il lupo, ma cammina a salti,

co-

(a) *Livrea* è un nome che in Istoria Naturale s'attribuisce a una specie di chiocciola, la cui veste è attornata di cerchi, o di fasce brune sopra un fondo giallo: onde quì s'appropria questo nome *livrea* a' Cervi, che quando son piccoli hanno la pelle di questo colore, cui col crescere poi depongono.

(b) *Lynces nostra lupis minores sunt, sergo maculosa*, Stumphius,

come il gatto; vive di caccia, e segue la preda anche fino alla cima degli alberi; i gatti selvaggi, le martore, gli armellini, gli scojattoli non gli possono sfuggire; egli afferra eziandio gli uccelli; attende al varco i cervi, i cavriuoli, e le lepri, se gli slancia sopra, gli piglia per la gola, e poichè s'è reso padrone della sua vittima, ne succhia il sangue, e ne apre la testa per mangiarne il cervello; dopo di che sovente l'abbandona per gire in traccia d'una vittima novella: di rado torna alla sua primiera preda, il che ha fatto dire, che fra tutti gli animali, la lince era quello, che aveva minor memoria. Il suo pelo cangia di colore secondo i climi, e le stagioni; le pellicce d'inverno sono più belle, migliori, e più ricche di pelo, che quelle della state, la sua carne, egualmente che quella di tutti gli animali rapaci, non è buona a mangiare (a).

(a) Rzaczynsky, *ant. hist. nat. Pol.* pag. 314.

IL CARACAL (a).

Quantunque il caracal rassomigli alla lince per la grandezza, e per la forma del corpo, per l'aria della testa, e perchè ha, com'egli, il carattere singolare, e, per così dire, unico d'un lungo mazzetto di pelo nero alla punta delle orecchie; ciò non ostante dalle diversità, che trovansi fra questi due animali, presumiamo, che siano di specie differente. Il caracal non è macchiato, come la lince, ha il pelo più ruvido, e più corto, la coda af-

(a) Il *Caracal*, nome che abbiám dato a quest'animale, e che abbiám cavato dal suo nome in lingua Turca, *Karrábkulak* o *Karacoulac*: in Arabo, *Gat-el challab*; in Persiano, *Siyab-gush*, che in queste tre lingue significa *Gatto dalle orecchie nere*.

Siyab-gush. Charleton, *Exercitationes*. Oxonæ 1677. pag. 21. 22., e 23.

Siyab-gush. *Auricula atra*. Scheich saadi in libro *Gulistan*, seu *rosario sexcentis circiter abhinc annis conscripto*, quam Persice, & Latine edidit Georg. Gentius; ubi vide *apologum Leonis*, & *auriculæ atræ* pag. 81.

Il Provveditor del leone, secondo alcuni Viaggiatori.

La Guida del leone, secondo altri.

affai più lunga , e d'un color uniforme , il muso più allungato , l'aria molto men dolce , e l' naturale più feroce . La lince non soggiorna , che ne' paesi freddi o temperati ; il caracal non si trova , che ne' climi i più caldi . Noi dunque abbiám giudicati questi animali di due specie diverse , tanto per siffatta differenza del naturale , e del clima , quanto per l' ispezione , e pel paragone , che n' abbiám fatto di due di essi che abbiám avuti vivi , e che , come tutti quelli , che finora ci furon dati , sono stati disegnati , e descritti al naturale .

Quest' animale è comune in Barberia , nell' Arabia , e in tutt' i paesi ne' quali abitano parimenti il leone , la pantera , e la lonza ; vive , com' essi di preda , ma essendo più piccolo , e molto più debole , dee durar fatica a procurarsi il suo sostentamento ; ei non ha , per così dire , che ciò che vien lasciato dagli altri , e sovente è costretto a contentarsi de' loro avanzzi ; egli si sta lungi dalla pantera , perchè essa esercita le sue crudeltà anche quando è pienamente satolla ; però va dietro al leone , il quale saziato che sia , non reca danno a nessuno ; il caracal s' approfitta degli avanzzi della sua mensa , e talvolta eziandio l' accompagna affai dappresso , poichè potendo egli facilmente arrampicarsi sugli alberi , non ha a temer la collera del leone , il quale non potrebbe inleguir-

lo, come fa la pantera. Per tutte queste ragioni si è passato a dire del caracal, ch'egli è la guida (a), o'l provveditor del leone; che questi, che non ha un odorato molto fino, valse del caracal per iscoprir da lungi gli altri animali, la cui spoglia egli polcia divide con lui (b).

II

(a) I Karacoulaos sono animali un poco più grandi dei gatti, e fatti dalla stessa maniera; hanno le orecchie nere, e lunghe quasi un mezzo piede, e da ciò tirano il lor nome, che significa *orecchia nera*. Essi servono di Chiaoux ai lioni (come dicono le genti del paese), perchè vanno dinanzi ad essi alcuni passi, e sono come la loro guida per condurli ne' luoghi, ove trovano roba da mangiare, e per ricompensa ne han pur essi la loro parte. Quando quest'animale chiama il leone, sembra che la sua voce sia quella d'una persona, che ne chiama un'altra, quantunque la voce ne sia più chiara. *Viaggio di Thevenot. Parigi 1664. Tom. II. pag. 114 e 115.*

(b) Ho veduto in una gabbia di ferro un animale, che gli Arabi chiamano la *guida del leone*. E' similissimo al gatto, e perciò alcuni lo chiamano *Gatto di Siria*; e ne ho veduto un altro in Firenze chiamato collo stesso nome. Egli è molto feroce: e se alcuno tenta di ritirargli la carne, che gli avrà

Il caracal è della grandezza d'una volpe, ma è molto più feroce, e più forte; è stato veduto assalire, straziare, e porre a morte in pochi istanti un cane di statura molto grande, che combatteva per la sua vita, e difendevasi con tutte le sue forze. Difficilissimamente ei s'addomestica; quando però vien preso giovane, ed è in appresso allevato con cura, si può ammae-

H 6

strar-

avrà data, ei si mette in gran furia, e se non viene acquietato, si slancia infallibilmente sopra di quello. Egli ha de' piccoli mazzi di pelo alla sommità delle orecchie, ed è chiamato la *guida del leone*, perchè, per quanto vien detto, il leone non ha l'odorato fino, e unendosi a questo animale, che lo ha acutissimo, segue con tal mezzo la preda, e poichè l'ha afferrata ne fa parte al suo condottiere. *Viaggio d'Oriente, del Padre Filippo Carme Dechaussè: Lione 1669. lib. II. pag. 76. e 77.* --- Il *Cat al challab* degli Arabi, che i Persiani chiamano *Siyabgush*, e i Turchi *Karrab-kulak*, cioè, il gatto-nero, o pazzo delle orecchie nere, come vien significato dal suo nome in queste tre lingue, è della grandezza d'un grosso gatto. Ha il corpo d'un bruno, che inclina al rosso, il ventre d'un color più chiaro, e talvolta segnato di macchie, il muso nero, e le orecchie d'un grigio carico.

strarlo alla caccia, ch'egli ama naturalmente, e a cui ottimamente riesce, purchè abbiasi attenzione di non cimentarlo, che contro animali, che gli siano inferiori, e che non gli possano resistere; altrimenti dopo che ne ha ricevuto qualche danno, disgustasi, e ricusa di fare il suo dovere. Se ne fa uso nelle Indie per prender le lepri, i conigli, ed anche i grandi uccelli, ch'egli sorprende, e afferra con una destrezza singolare.

L.

co, le cui estremità son guernite d'un piccolo mazzo di pelo nero, e ruvido, come quello della lince. La figura di quest'animale, che ne dà Charleton, è diversissima dal *Siyah gush* di Barberia, che ha la testa più rotonda colle labbra nere, ma del resto rassomiglia interamente al gatto. *Viaggio di Shaw. Haja 1743. Tom. I. pag. 320. e 321. Nota.* La figura data da Charleton è disferola, perchè il pelo non vi è espresso, e perchè la testa è, per così dire, calva, il che le toglie la rotondità: ma egli non è men vero che il *Siyah gush* di Charleton, e quello della Barberia, di cui qui parla il Dottor Shaw, sono tuttadue animali della medesima specie, che il nostro Caracal.

L' I E N A (a).

Riguardo all' Iena Aristotele (b) ci lascia due notizie, le quali sole basterebbero per riconoscere quest' animale, e per farlo distinguere da tutti gli altri; non-
di-

(a) L' Iena: *Zabo*, in Arabia: *Dubbach*, in Barberia; *Kastaar*, o *Cassar* in Persia.

Hyena. Aristot. *Hist. animal.* lib. VI. cap. XXXII.

Taxus porcinus, seu *hyena veterum*. Kämpfer, *amensis* pag. 411.

Hyena, *Canis cauda recta annulata, pilis cervicis erectis, auriculis nudis*. Linn. *Syst. nat.* edit. X. pag. 40. Nota: Che questo carattere della coda anellata, ch'è stato supposto parimente da Kämpfer, non è molto sensibile, nè costante. L' Iena, che noi abbiain veduta viva, ha tutt' i caratteri, che ne ha dati il Sig. Linneo, eccettuato quello della coda, che non aveva anelli ben contrassegnati, ma solamente alcune tinte di bruno sopra un fondo grigio, che formavano piuttosto una specie d'onde, che di anelli.

(b) Arist. *Hist. animal.* lib. VI. cap. XXXII. & lib. VIII. cap. V.

dimeno i Viaggiatori, e i Naturalisti l'hàn confusa con altri quattro animali, le cui specie son tutte e quattro differenti tra di loro, e diverse da quella dell' iena. Tali animali sono lo Sciacal, il Ghiottone, il Zibetto, e'l Babbuino, i quali tutti son carnivori, e feroci come l' iena, ed han ciascuno alcune piccole convenienze, e certi particolari rapporti con essa, i quali poi han dato luogo all' abbaglio, ed all' errore. Lo Sciacal trovasi pressappoco nello stesso paese, s'accosta come l' iena alla forma del lupo; vive di cadaveri com' essa, e disotterra le sepolture per trarne i corpi; e questo è bastato perchè si sian presi l'uno per l'altra. Il ghiottone ha la stessa voracità, la stessa fame per la carne corrotta, il medesimo istinto per disotterrare i morti, e quantunque sia d'un clima molto diverso da quello dell' iena, e d'una figura parimente diversissima, la sola somiglianza dell' istinto naturale bastò, perchè gli Antichi li confondessero insieme. Il Zibetto trovasi parimente nello stesso paese, che l' iena, ha com' essa de' lunghi peli lungo il dorso, ed una particolare apertura o fessura, tutti caratteri, che non appartengono, che ad alcuni animali, e che han fatto credere a Bellon, che il Zibetto fosse l' iena degli Antichi. Quanto al Babbuino, che rassomiglia ancor meno all' iena, che gli altri tre, poichè ha mani, e

pic-

piedi come l'uomo, e la scimia, ei non è
 stato preso per essa, che per cagione della
 rassomiglianza del nome: in Barberia l'
 iena s'appella *dubbah*, secondo il Dottor
 Shaw; ed il babbuino chiamasi *dabuh*, se-
 condo Marmol, e Leone l'Africano: e sic-
 come il babbuino è del medesimo clima,
 raspa ei pure la terra, ed è pressappoco
 della figura dell'iena, così queste rassomi-
 glianze hanno ingannati prima i Viaggia-
 tori, e poi i Naturalisti che han copiati i
 Viaggiatori; anche quelli, che hanno chia-
 ratamente distinti questi due animali, non
 han lasciato di conservare all' iena il no-
 me *dabuh*, ch'è quello del Babbuino. L'
 iena dunque non è il *dabuh* degli Arabi,
 nè il *jefes*, o *jefes* degli Africani, come
 asseriscono i nostri Naturalisti (a); nè bi-
 sogna confonderla col *deeb* di Barberia.
 Ma per pervenire una volta per sempre
 questa confusione di nomi, additeremo in
 poche parole il compendio delle ricerche
 da noi fatte intorno a questi animali.

Aristotele dà all' Iena due nomi, comu-
 nemente l'appella *hyana*, e alle volte *glau-
 nus*: per assicurarci, che questi due nomi
 non dinotino che lo stesso animale, basta con-

(a) Charleton, *Exercit.* pag. 14. ... Brisson,
Regn. animal. pag. 234.

confrontare i passi (a), ne' quali se ne parla. Gli Antichi latini han conservato il nome d'*hyana*, e non han giammai adottato quello di *glanus*: ne' latini Moderni però, per dinotar l'iena, trovansi le voci *ganus*

(a) *Hyena colore lupi prope est, sed hirsutior, & juba per totum dorsum praedita est. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris & foeminae eandem habere; commentitium est; sed virile similiter, atque in lupis, & canibus habetur. Quod vero foemineum esse videtur, sub cauda positum est, figura simile genitali foeminae, sed sine ullo meatu. Sub hoc meatus excrementorum est. Quin etiam foemina hyana praeter suum illud etiam simile, ut mas habet sub cauda sine ullo meatu, a quo excrementorum meatus est, atque sub eo genitale verum continetur. Vulvam etiam hyana foemina, ut cetera hujusmodi foeminae animantes habet. Sed raro hyana foemina capitur, jam inter undecim numero, unam tantum cepisse venator retulit quidam. lib. VI. cap. XXXII. --- Quam autem alii hyenam appellant, corpore non minore, quam lupo est, juba qua equus, sed seta duriore, longioreque, & per totum dorsum porrecta. Mollitur haec insuavis homini, canes etiam vomitionem hominis imitando capit, & sepulcra effodit humanae avida carnis, ac eruit. Aristot. Hist. animal. lib. VIII. cap. V.*

nus o gannus (a), e belbus (b). Secondo Rafis (c), gli Arabi han chiamata l'iena *kabo* o *zabo*, nomi che sembrano derivati dalla parola *zeeb*, come nella loro lingua è il nome del lupo. In Barberia l'iena porta il nome di *dubbah*, come può vedersi dalla breve descrizione che ne ha data il Dottor Shaw (d). In Turchia l'iena vien nominata-

(a) Gesner. *Hist. quadrup.* pag. 555.

(b) *Belbi, id est, hyena, decem fuerunt sub Gordiano Romæ. Julius Capitolinus. Idem. Ibidem.*

(c) Gesner. *Hist. quadrup.* pag. 555.

(d) Ne' Regni di Tunisi, e d'Algeri, il dubbah è della grandezza del lupo . . . egli ha il collo così aspro, e inflessibile, che quando vuol guardar dietro di se, o solamente di lato, è costretto a rivoltar tutto il corpo come i porci, i tassi, e i cocco-drilli. Il suo colore è d'un bruno oscuro, che inclina al rosso con alcune tinte d'un bruno anche più oscuro: il pelo della nuca, e del collo è quasi della grandezza d'un palmo, ma men ruvido delle setole del porco. Egli ha i piedi grandi, e ben armati, de' quali si serve per iscavar la terra, per trarne i germogli della palma, e altre radici, e talvolta i corpi morti . . . Dopo il leone, e la pantera, il dubbah è il più feroce, e più crudele di tutti gli animali del.

nata *zirtiam*, secondo Nieremberg (a); in Persia *kastaar* secondo Kämpfer (b), e *castar*,

della Barberia. Siccome questa bestia è fornita di tal criniera, che non può voltar la testa, che a vento, e siccome suol frugare nei sepolcri, così vi ha ogni apparenza, ch'essa sia l'iena degli Antichi. *Viaggio di Shaw*, Tom. I. pag. 320.

(a) Euseb. Nieremberg. *Hist. nat. Antuerpiz* 1635. pag. 181.

(b) *Kastaar*, id est, *taxus porcina*, sive *hyaena veterum* (Vid. in Tab. §. 4. n. 4.), animal est porci, seu *scrophæ grandioris*, magnitudinem, ejusdemque formam corporis obtinens, si capus, caudam & pedes excipio. Pilis vestitur longis, incanis, in ora dorsi, porcino more, longioribus, pene spinulosis, apicibus nigris; capus habet lupino non dissimile, rostro nigro, fronte longiori, oculis rostro propinquioribus nigris & volubilibus, auribus nudis, fuscis & acuminatis; cauda donatur prælonga, villis densis longioribus vestita, circulisque nigricantibus ad decorem intercepta. Crura in orbem quodam modo variegata, posteriora prioribus sunt longiora, pedes in quaternos ungues divisi, quos lupino more contrahit. Corpus habet striis a dorso ventre tenus primum paucis, latis & inequalibus, alternim fuscis & nigris. . . Mira vi terram effodit, cavernisque abditum se il-

star, secondo Pietro della Valle (a): questi sono i soli nomi, sotto i quali si può ella conoscer chiaramente; peraltro ci par molto verisimile, benchè men chiaro, che il *lycaon*, e la *crocota* delle Indie, e dell' Eriopia, di cui parlano gli Antichi, non siano altri animali, che l'iena. Porfirio (b) espres-

sa-

illatebrare amat, diu sine cibo vivit, & raptu victum querit. . . Ferox & carnivora bestia quippe in humana sapiens cadavera, quæ noctu ex tumulis impigre effodit &c.
 Kæmpfer, *amenitates* pag. 441. e 442.

- (a) Vidi a Schitas un certo animale vivo, che i Persiani chiamano nella loro lingua *Castar*, forte quanto un grosso cane, il quale per quanto io credo, non era giunto per ancorà alla sua perfezione: egli aveva la grandezza, la forma, e'l color d'una tigre (egl' intende la pantera), e la testa col muso affilato d'un porchetto. Mi fu detto, che si pasceva di carne umana, e che desotterrava le tombe, e i sepolcri per mangiarne i cadaveri, il che m' ha fatto poi giudicare, che questi poteva esser l'iena dei Latini: checchè ne sia, esso era un animal feroce, ch' io non aveya mai veduto. *Viaggio di Pietro della Valle. Roano 1745. Tom. V. pag. 343.*

- (b) *Porphirius in eo opere, quod inscripsit de abstinentia ab usu carnium, hyenam dicit ab Indis appellari crocutam. Gillius apud Gesnerum, Hist. quadrup. pag. 555.*

famente dice, che la *crocuta* dell' Indie è l' iena dei Greci; e in fatti tutto ciò, ch' eglino scrissero, e tutto ciò eziandio, che dissero di favoloso riguardo al *licaone*, e alla *crocuta*, conviene all' iena, intorno alla quale eglino pure spacciarono più favole, che fatti. Su questo soggetto noi ristigneremo quì le nostre conghietture, per non allontanarci troppo dal presente oggetto, e perchè tratteremo in un discorso a parte di ciò, che riguarda gli animali favolosi, e delle relazioni, ch' essi possono avere cogli animali reali.

Il *pantber* dei Greci, il *lupus Canvrius* di Gaza, il *lupus Armenius* dei moderni Latini, e degli Arabi, ci pajon essere lo stesso animale; e quest' animale è lo Sciacal, che i Turchi chiamano *cical* secondo Polluce (a), *thacal* secondo Spon (b) e Wheler; i Greci moderni l' appellano *zachalia* (c), i Persiani *siechal* (d) o *schachal* (e), i Mori di Barberia *deeb* (f) o *jackal*.

Noi

(a) Gesner, *Hist. quadrup.* pag. 675.

(b) Viaggio di Jacopo Spon, e Giorgio Wheler; *Lione* 1678. Tom. I. pag. 114. e 115.

(c) *Idem*, *ibidem*.

(d) Viaggio di Chardin in Persia. *Amsterdam* 1711. Tom. II. pag. 29.

(e) Kämpfer, *amenitates exoticæ* pag. 413.

(f) Viaggio di Shaw. *Haja* 1743. Tom. I. pag. 313.

Noi gli conserveremo il nome *Sciacal*, ch'è stato da molti Viaggiatori adottato, e ci contenteremo di notar quì, ch'egli è diverso dall' iena non solo per la grandezza, per la figura, e pel color del pelo, ma anche per le naturali inclinazioni, andando ordinariamente in truppa, quandochè l' iena è un animale solitario. I recenti Nomenclatori dopo Kämpfer han chiamato lo *Sciacal* col nome di *lupus-aureus*, perchè ha il pelo d' un fulvo-giallo, vivo e lucido.

Dunque lo *Sciacal* è, da quel che s'è detto, un animale diversissimo dall' iena: è niente meno diverso dal ghiottone, ch'è un animale del Settentrione, rilegato nelle più fredde regioni, cioè nella Lapponia, nella Russia, e nella Siberia, e incognito ne' paesi temperati, per conseguenza egli non ha mai abitato nell' Arabia, egualmente che negli altri climi caldi, ove trovasi l' iena, la quale n'è diversissima per tutt' i riguardi. Il ghiottone è pressapoco della forma d' un grossissimo tasso, ha le gambe corte, il ventre quasi a terra, cinque dita a' piè davanti, e altrettanti a que' di dietro; non ha chioma sul collo, il pelo è nero sopra tutto il corpo, e talvolta d' un fulvo-bruno su i fianchi; non ha altro di comune coll' iena, se non ch'è voracissimo. Questi non era noto agli Antichi, i quali non avevan penetrato molto in-

innanzi nelle terre settentrionali: il primo Autore, che abbia fatta menzione di quest' animale è Olao (a); egli lo chiamò *gulo* per riguardo sua gran voracità: ci fu in appresso chiamato in lingua Schiavona *rosomak* (b), e *jerff* e *wildras* in Tedesco: i Viaggiatori Francesi (c) l' hanno appellato *gionton*, cioè *ghiotton*. In questa specie vi sono alcune varietà egualmente, che in quella dello Sciacal, di cui parleremo nella Storia particolare di questi animali; ma possiamo preventivamente assicurare, che tali varietà ben lungi dall' avvicinarli alla specie dell' iena, ne gli allontanano maggiormente.

Il Zibetto non ha di comune coll' iena
al-

- (a) *Inter omnia animalia, quae immani voracitate creduntur insatiabilia; gulo in partibus Sueciae septentrionalis, - praeipuum suscepit nomen, ubi patria sermone Jerff dicitur, & lingua Germanica Wilsraff, Sclavonice Rosomaka, - a multa comestione; latina vero non nisi fictitio gulo videlicet a gulofitate appellatur. Hist. de gent. septent. ab Olao magno. Antuerpiae 1558. pag. 138.*
- (b) Storia della Lapponia, di Scheffer. Parigi 1678. pag. 314. --- Rzaczynski, *Auct. hist. nar. Polon.* pag. 311.
- (c) Relazione della gran Tartaria, Amsterdam 1737. pag. 8.

altro, che l'apertura o sacco sotto la coda, e la chioma lungo il collo, e la spina del dorso; essa n'è diversa per la figura, e per la grandezza del corpo, essendo della metà più piccola; ha le orecchie velutate, e corte, quandoche l'iena le ha lunghe, e nude; di più ha le gambe molto più corte, e cinque dita a ciascun piede; l'iena al contrario ha le gambe lunghe, e non ha che quattro dita a ciascun piede: finalmente il Zibetto non iscava la terra per trarne i cadaveri: egli è dunque facilissimo il distinguer l'una dall'altro. Quanto al Babbuino, ch'è il *papio* de' Latini, ei non è stato preso per l'iena, che per un equivoco di nome, a cui sembra aver dato luogo un passo di Leone l'Africano (a), copiato da Marmol (b). Il *dabuh*, dicono questi due Autori, è della grandezza, e della forma d'un lupo; esso cava i corpi morti dai sepolcri. La rassom-

mi-

(a) *Dabuh Arabica appellatione Africanis Selef dicitur. Animal & magnitudine & forma lupum refert; pedes & crura hominis similes; reliquo bestiarum genere non est novius, sed humana corpora sepulchris evellit, ac devorat.* Leon. Afric. de Afric. descript. Lugd. Bat. 1632. Tom. II. pag. 756.

(b) L'Africa di Marmol. Parigi 1667. Tom. I. pag. 57.

miglianza di questo nome *dabuh* con *dub-bah*, ch'è quello dell'iena, e siffatta avidità pe' cadaveri, comune al *dabuh*, e al *dubbah*, gli han fatti prendere per lo stesso animale, benchè nel passo pur or citato dicasi espressamente, che il *dabuh* ha mani, e piedi a foggia dell'uomo, il che conviene non già all'iena, ma al babbuino soltanto.

Gettando lo sguardo sulla figura del *lupo-marino* (a) di Bellon, copiata da Gesner (b), potrebbesi prendere anche quest'animale per l'iena, perchè la figura data da Bellon rassomiglia assai a quella della nostra iena: ma la sua descrizione non s'accorda colla nostra, poichè egli chiama anfibio il suo animale, e dice, che questo nutresi di pesci, e ch'è stato talor veduto sulle coste dell'Oceano Britannico; e d'altra parte ei non fa veruna menzione dei caratteri singolari, che distinguon l'iena dagli altri animali. Forse Bellon, prevenuto, che il Zibetto era l'iena degli Antichi, avrà voluto dare la figura della vera iena sotto il nome d'un altro animale, ch'egli chiama *lupo-marino*, e che certamente non è l'iena; poichè i caratteri dell'iena, come già ho detto, sono sì distinti insieme, e fin-

(a) Bellon, *de aquatil.* pag. 35.

(b) Gesner, *Hist. quadrup.* pag. 674.

singolari , ch'egli è assai difficile il prendervi abbaglio: ell'è forse la sola fra tutti gli animali quadrupedi , che non abbia , come ho poc'anzi accennato , che quattro dita tanto a' piedi davanti , che a que' di dietro ; essa ha , come il tasso , un'aoerrura sotto la coda , che non penetra nell' interno del corpo : ha le orecchie lunghe , diritte , e nude : la testa più quadrata , e più corta , che quella del lupo : le gambe , soprattutto le deretane , più lunghe : gli occhi situati come quelli del cane : il pelo del corpo , e la chioma d' un color grigio oscuro , mischiato d' un poco di fulvo , e di nero , con onde trasversali , e nerice ; è della grandezza del lupo , e sembra soltanto aver il corpo più corto , e più raccolto .

Questo selvaggio , e solitario animale soggiorna nelle caverne delle montagne , nelle fessure delle rupi , o nelle tane , che si scava egli stesso sotterra : è d' un naturale feroce , e se pur si prenda giovine (a) , non si può affatto addimesticare ; vive di rapina

Tom.X.

I

co-

(a) *Hyenam marem Ispahani curiositatis causa alebat dives quidam Gabr seu ignicola , suburbii Gabristaan , captam dum ubera sugeret , in latibulis vicini montis . Ad eam spectandam progressus , bestiam eo situ depinxi , quo in fovea subdiali duarum orpyarum profunditatis (cui inclusa servabatur) cubantem inveni . Desiderio nostro possessor omni ex-*

come il lupo , ma è più forte , e sembra più ardito ; assale talvolta gli uomini , gettasi sul bestiame (a) , segue dappresso la gregge , e sovente rompe in tempo di notte le porte delle stalle , e dei ricinti degli ovili : i suoi occhi scintillano nell' oscurità , e pretendesi , ch' ei vegga meglio di notte , che di giorno . Se si vuole prestar fede a tutt' i Naturalisti , le sue grida rassomigliano ai fin-

parte satisfactus , eam educi quoque curavit in aream ; quod ut tuto fieret , demisso fune rostrum prius illaqueabat ; mox descendentes servi protracta utrinque labra , funiculo ex pilis contorto , strenue colligabant . Hoc facto educitur , laxatoque fune , qui rostrum frenabat , bestia latius discurrere permittitur , non semel apprehensa , more atletico in terram projicitur , ac variis laceffitur vexationibus ; quibus illa invito nocendi nisu oblectata , subinde mugitum edidit vitulino simillimum . Narrabant Gabri sic frenatam nuper se opposuisse duobus leonibus , quos aspeclante oculo serenissimo in fugam verterit . Kämpfer , amenitates pag. 412. & 413.

(a) Nell' Abissinia i lupi son piccoli , e molto timidi , ma vi si trova un animale chiamato *lene* estremamente ardito , e carnivoro ; esso assale le genti nel pieno giorno come nella notte , e rompe sovente le porte , e i ricinti degli ovili . *Storia dell' Abissinia* , di *Ludolf.* , pag. 41.

singhiozzi d' un uomo, che vomiti forzatamente, o piuttosto al muggito del vitello, come attesta Kæmpfer, testimonio d' udito (a) .

L' iena si difende dal leone , non teme la pantera , assale la lonza, che non le può far resistenza ; e quando le manca la preda , scava la terra co' piedi , e ne trae a pezzi i cadaveri degli uomini , e degli animali , che ne' paesi , ov' essa abita , si sepelliscono egualmente nelle campagne . La si trova in quasi tutt' i climi caldi dell' Africa , e dell' Asia , e sembra che l' animale in Madagascar (b) chiamato *sarasse* , che per la figura rassomiglia al lupo , ma è più grande , e più forte , e più crudele , potrebbe per avventura esser l' iena .

Vi sono pochi animali , su cui siano state fatte tante storie assurde , quante su questo . Gli Antichi seriamente scrissero , che

I 2

l' iena

(a) Kæmpfer , in loco supra citato .

(b) Trovansi in Madagacar alcuni animali , che gli abitanti chiamano *Farassi* , della natura del lupo , ma ancora più voraci . *Memorie per servire alla storia dell' Indie Orientali* 1702. pag. 168. Vedi parimente la storia dell' *Orenoque* , di Giuseppe Jumilla . *Avignon* 1758. Tom. III. pag. 603. , ove sembra , che l' Autore abbia copiato il passo pur or da noi citato .

l'iena era e maschio e femmina alternativamente; che quando era gravida, allattava, ed allevava i suoi parti, e restava femmina per tutto l'anno: ma che l'anno seguente ripigliava le funzioni del maschio, e faceva soffrire al suo compagno quelle della femina. Vedesi chiaramente, che questa favoletta non ha altro fondamento, che l'apertura in forma di fessura, che ha il maschio egualmente, che la femmina, indipendentemente dalle parti proprie della generazione, che pe' due sessi, sono nell'iena somiglianti a quelle di tutti gli altri animali. Si è detto, ch'essa sapea imitar la voce umana, tenere a memoria il nome dei Pastori, chiamarli, incantarli, arrestarli, renderli perfino immobili; far correr nel tempo stesso i pastori, fargli dimenticar la greggia, rendergli pazzi per amore &c. . . Tutto ciò può ben avvenire anche senza l'iena; ed io finisco, acciò non mi venga fatto il rimprovero, ch'io soglio far a Plinio, che sembra essersi dilettato di raccogliere, e di spacciare siffatte favole.

LA CIVETTA (a)

ED

IL ZIBETTO (b).

LA maggior parte de' Naturalisti han creduto esservi una sola specie dell' animale, che ne somministra il profumo, che si chiama *Zibetto*. Noi ne abbiam

I 3 ve-

(a) La Civetta. *Animal zibethi*. Caius apud Gesnerum, pag. 837.

Civette. Memorie per servire alla Storia degli Animali, prima parte, pag. 157.

(b) Il Zibetto, in Arabo, *Zebed* o *Zebet*. *Animale del Muschio*. Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze, anno 1731., pag. 443.

Nota. I Nomenclatori, che citeremo, non han distinti questi due animali, e non si sa a quale dei due debbasi applicare ciocchè essi ne dicono; poichè eglino non espongono altro, che i caratteri, che son comuni ad amendue.

Felis zibethi. Gesner, *Hist. quadrup.*, pag. 836. *Nota*. La figura, che quì dà Gesnero, non val per niente, poichè egli dice, ch' essa è stata copiata dal naturale in Milano.

veduti due di questi animali , che per verità si rassomigliavano per alcuni rapporti essenziali della struttura sì nell'interno , che nell'esterno , ma eran nondimeno l'un dall'altro diversi per tanti altri caratteri , onde debbanli riguardar come costituenti due specie realmente differenti . Al primo di questi animali abbiain conservato il nome di *civetta* , e al secondo abbiain dato quello di *zibetto* , per distinguerli l'un dall'altro . La

iano . Quella di Cajo , pag. 837. , è buona , e la descrizione n'è anche migliore . *Animal zibetbi* . Aldrov. de quadrup. digit. , pag. 340.

Meles unguibus uniformibus . Linn. *Syst. nat.* edit. IV. pag. 65. -- *Meles unguibus uniformibus* , *cinerea* . *Syst. nat.* edit. VI. , pag. 6. — *Zibetba* . *Viverra cauda annulata* , *dorso cinereo* , *nigroque undatim striato* . *Syst. nat.* edit. X. , pag. 44. Nota . 1.^o Che dal genere del tasso , in cui era la civetta nella quarta , e nella sesta edizione , ella passò in quello della *Viverra* ; che dapprima era col solo tasso , edizione IV. , indi col tasso , e coll' icneumone , edizione VI. ; e che finalmente nella decima edizione non si trova più col tasso , ma coll' icneumone , colla muffetta , colla puzzola vergata , e colla ginetta . Nota . 2.^o Che l'Autore ha cambiata la comune significazione della parola

civetta, di cui qui diamo la figura (Tav. VII. fig. 1.) c'è paruta esser la stessa, che la civetta descritta dai Socj dell' Accademia delle Scienze, nelle Memorie per servire alla storia degli animali; crediam parimente, ch' essa sia la stessa, che quella di Cajo presso Gesnero, pag. 837., e la stessa ancora che quella, di cui Fabio Colonna ha date le figure (sì del maschio, come della femmina) nell' opera di Giovanni
 I 4 Fabri,

rola *viverra*, di cui egli fa un nome generico per cinque animali, tra' quali crederebbensi di dover almen trovare il vero *viverra*, cioè il *furesso*, che non ostante non vi si trova, e cui bisogna cercare nel genere delle donnole, pag. 46. Nota. 3.º Che il tasso, ch' era solo nel suo genere colla civetta, edizione IV., e coll' icneumone, e la civetta, edizione VI., trovasi nell' edizione X. coll' orso; coll' orso bianco di Groenlandia, col lupatto della baja d' Haisson, e col rattone, o racoon d' America. Non ho citati questi tratti disparati di nomenclatura, che per far comprendere quanto questi pretesi generi siano arbitrarij, e poco stabili perfino in capo di coloro, che gli hanno immaginati.

Meles fasciis & maculis albis, nigris & rufescentibus variegata. . . . Civetta, la civetta. Brisson, Regn. animal, pag. 276.

innanzi nelle terre settentrionali: il primo Autore, che abbia fatta menzione di quest' animale è Olao (a); egli lo chiamò *gulo* per riguardo sua gran voracità: ci fu in appresso chiamato in lingua Schiavona *rosomak* (b), e *jerff* e *wildras* in Tedesco: i Viaggiatori Francesi (c) l' hanno appellato *gionton*, cioè *ghiottone*. In questa specie vi sono alcune varietà egualmente, che in quella dello Sciacal, di cui parleremo nella Storia particolare di questi animali; ma possiamo preventivamente assicurare, che tali varietà ben lungi dall' avvicinarli alla specie dell' iena, ne gli allontanano maggiormente.

Il Zibetto non ha di comune coll' iena
al-

- (a) *Inter omnia animalia, quæ immensi voracitate creduntur insatiabilia, gulo in partibus Sueciæ septentrionalis, præcipuum suscepit nomen, ubi patria sermone Jerff dicitur, & lingua Germanica Wilsstraff, Sclavonice Rosomaka, a multa comestione; latina vero non nisi fictitio gulo videlicet a gulofitate appellatur. Hist. de gent. septent. ab Olao magno. Antuerpiæ 1558. pag. 138.*
- (b) *Storia della Lapponia, di Scheffer. Parigi 1678. pag. 314. --- Rzaczynski, Auth. hist. nat. Polon. pag. 311.*
- (c) *Relazione della gran Tartaria, Amsterdam 1737. pag. 8.*

altro, che l'apertura o sacco sotto la coda, e la chioma lungo il collo, e la spina del dorso; essa n'è diversa per la figura, e per la grandezza del corpo, essendo della metà più piccola; ha le orecchie velutate, e corte, quandoche l'iena le ha lunghe, e nude; di più ha le gambe molto più corte, e cinque dita a ciascun piede; l'iena al contrario ha le gambe lunghe, e non ha che quattro dita a ciascun piede: finalmente il Zibetto non iscava la terra per trarne i cadaveri: egli è dunque facilissimo il distinguer l'una dall'altro. Quanto al Babbuino, ch'è il *papio* de' Latini, ei non è stato preso per l'iena, che per un equivoco di nome, a cui sembra aver dato luogo un passo di Leone l'Africano (a), copiato da Marmol (b). Il *dabuh*, dicono questi due Autori, è della grandezza, e della forma d'un lupo; esso cava i corpi morti dai sepolcri. La rassom-

(a) *Dabuh Arabica appellatione Africanis Seles dicitur. Animal & magnitudine. & forma lupum refert; pedes & crura hominis similes; reliquo bestiarum genere non est noxius, sed humana corpora sepulchris evellit, ac devorat.* Leon. Afric. de Afric. descript. Lugd. Bat. 1632. Tom. II. pag. 756.

(b) L'Africa di Marmol. Parigi 1667. Tom. I. pag. 57.

miglianza di questo nome *dabuh* con *dub-bah*, ch'è quello dell'iena, e siffatta avidità pe' cadaveri, comune al *dabuh*, e al *dubbah*, gli han fatti prendere per lo stesso animale, benchè nel passo pur or citato dicasi espressamente, che il *dabuh* ha mani, e piedi a foggia dell'uomo, il che conviene non già all'iena, ma al babbuino soltanto.

Gettando lo sguardo sulla figura del *lupo-marino* (a) di Bellon, copiata da Gesner (b), potrebbesi prendere anche quest'animale per l'iena, perchè la figura data-ne da Bellon rassomiglia assai a quella della nostra iena: ma la sua descrizione non s'accorda colla nostra, poichè egli chiama anfibio il suo animale, e dice, che questo nutresi di pesci, e ch'è stato talor veduto sulle coste dell'Oceano Britannico; e d'altra parte ei non fa veruna menzione dei caratteri singolari, che distinguon l'iena dagli altri animali. Forse Bellon, prevenuto, che il Zibetto era l'iena degli Antichi, avrà voluto dare la figura della vera iena sotto il nome d'un altro animale, ch'egli chiamò *lupo-marino*, e che certamente non è l'iena; poichè i caratteri dell'iena, come già ho detto, sono sì distinti insieme, e fin-

(a) Bellon, *de aquatil.* pag. 35.

(b) Gesner, *Hist. quadrup.* pag. 674.

singolari , ch'egli è assai difficile il prendervi abbaglio: ell'è forse la sola fra tutti gli animali quadrupedi , che non abbia , come ho poc'anzi accennato , che quattro dita tanto a' piedi davanti , che a que' di dietro ; essa ha , come il tasso , un'apertura sotto la coda , che non penetra nell' interno del corpo : ha le orecchie lunghe , diritte , e nude : la testa più quadrata , e più corta , che quella del lupo : le gambe , soprattutto le d'eretane , più lunghe : gli occhi situati come quelli del cane : il pelo del corpo , e la chioma d' un color grigio oscuro , mischiato d' un poco di fulvo , e di nero , con onde trasversali , e nericce ; è della grandezza del lupo , e sembra soltanto aver il corpo più corto , e più raccolto .

Questo selvaggio , e solitario animale soggiorna nelle caverne delle montagne , nelle fessure delle rupi , o nelle tane , che si scavava egli stesso sotterra : è d' un naturale feroce , e se pur si prenda giovine (a) , non si può affatto addimesticare ; vive di rapina

Tom.X.

I

co-

(a) *Hyenam marem Ispahani curiositatis causa alebat dives quidam Gabr seu ignicula , suburbii Gabristaan , captam dum ubera suggeret , in latibulis vicini montis . Ad eam spectandam progressus , bestiam eo situ depinxi , quo in fovea subdiali duarum orpyarum profunditatis (cui inclusa servabatur) cubantem inveni . Desiderio nostro possessor omni ex-*

come il lupo , ma è più forte , e sembra più ardito ; assale talvolta gli uomini , gettasi sul bestiame (a) , segue dappresso la gregge , e sovente rompe in tempo di notte le porte delle stalle , e dei ricinti degli ovili : i suoi occhi scintillano nell' oscurità , e pretendesi , ch' ei vegga meglio di notte , che di giorno . Se si vuole prestar fede a tutt' i Naturalisti , le sue grida rassomigliano ai
fin-

parte satisfactus , eam educi quoque curavit in aream ; quod ut tuto fieret , demisso fune rostrum prius illaqueabat ; mox descendentes servi protracta utrinque labra , funiculo ex pilis contorto , strenue colligabant . Hoc facto educitur , laxatoque fune , qui rostrum frenabat , bestia latius discurrere permittitur , non semel apprehensa , more athletico in terram projicitur , ac variis lacessitur vexationibus ; quibus illa irrita nocendi nisu oblectata , subinde mugitum edidit vitulino simillimum . Narrabant Gabri sic frenatam nuper se opposuisse duobus leonibus , quos asseclante oculo serenissimo in fugam verterit . Kampfer , amenitates pag. 412. & 413 .

(a) Nell' Abissinia i lupi son piccoli , e molto timidi , ma vi si trova un animale chiamato *lene* estremamente ardito , e carnivoro ; esso assale le genti nel pieno giorno come nella notte , e rompe sovente le porte , e i ricinti degli ovili . *Storia dell' Abissinia , di Ludolf. , pag. 41.*

singhiozzi d' un uomo , che vomiti forzatamente , o piuttosto al muggito del vitello , come attesta Kæmpfer , testimonio d' udito (a) .

L' iena si difende dal leone , non teme la pantera , assale la lonza , che non le può far resistenza ; e quando le manca la preda , scava la terra co' piedi , e ne trae a pezzi i cadaveri degli uomini , e degli animali , che ne' paesi , ov' essa abita , si sepelliscono egualmente nelle campagne . La si trova in quasi tutt' i climi caldi dell' Africa , e dell' Asia , e sembra che l' animale in Madagascar (b) chiamato *farasse* , che per la figura rassomiglia al lupo , ma è più grande , e più forte , e più crudele , potrebbe per avventura esser l' iena .

Vi sono pochi animali , su cui siano state fatte tante storie assurde , quante su questo . Gli Antichi seriamente scrissero , che

I 2

l' iena

(a) Kæmpfer , in loco supra citato .

(b) Trovansi in Madagascar alcuni animali , che gli abitanti chiamano *Farassi* , della natura del lupo , ma ancora più voraci . *Memorie per servire alla storia dell' Indie Orientali* 1702. pag. 168. Vedi parimente la storia dell' *Orenoque* , di Giuseppe Jumilla . Avignon 1758. Tom. III. pag. 603. , ove sembra , che l' Autore abbia copiato il passo pur or da noi citato .

l'iena era e maschio e femmina alternativamente; che quando era gravida, allattava, ed allevava i suoi parti, e restava femmina per tutto l'anno: ma che l'anno seguente ripigliava le funzioni del maschio, e faceva soffrire al suo compagno quelle della femina. Vedesi chiaramente, che questa favoletta non ha altro fondamento, che l'apertura in forma di fessura, che ha il maschio egualmente, che la femmina, indipendentemente dalle parti proprie della generazione, che pe' due sessi, sono nell'iena somiglianti a quelle di tutti gli altri animali. Si è detto, ch'essa sapea imitar la voce umana, tenere a memoria il nome dei Pastori, chiamarli, incantarli, arrestarli, renderli perfino immobili; far correr nel tempo stesso i pastori, fargli dimenticar la greggia, rendergli pazzi per amore &c. . . Tutto ciò può ben avvenire anche senza l'iena; ed io finisco, acciò non mi venga fatto il rimprovero, ch'io soglio far a Plinio, che sembra essersi dilettrato di raccogliere, e di spacciare siffatte favole.

LA CIVETTA (a)

ED

IL ZIBETTO (b).

LA maggior parte de' Naturalisti han creduto esservi una sola specie dell' animale, che ne somministra il profumo, che si chiama *Zibetto*. Noi ne abbi-
 I 3 ve-

(a) La Civetta. *Animal zibetbi*. Caius apud Gesnerum, pag. 837.

Civette. Memorie per servire alla Storia degli Animali, prima parte, pag. 157.

(b) Il Zibetto, in Arabo, *Zebed* o *Zebet*. *Animale del Muschio*. Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze, anno 1731., pag. 443.

Nota. I Nomenclatori, che citeremo, non han distinti questi due animali, e non si sa a quale dei due debbasi applicare ciò che essi ne dicono, poichè eglino non espongono altro, che i caratteri, che son comuni ad amendue.

Felis zibetbi. Gesner, *Hist. quadrup.*, pag. 836. **Nota.** La figura, che quì dà Gesnero, non val per niente, poichè egli dice, ch'essa è stata copiata dal naturale in Milano.

veduti due di questi animali, che per verità si rassomigliavano per alcuni rapporti essenziali della struttura sì nell'interno, che nell'esterno, ma eran nondimeno l'un dall'altro diversi per tanti altri caratteri, onde debbansi riguardar come costituenti due specie realmente differenti. Al primo di questi animali abbiám conservato il nome di *civetta*, e al secondo abbiám dato quello di *zibetto*, per distinguerli l'un dall'altro. La

lano. Quella di Cajo, pag. 837., è buona, e la descrizione n'è anche migliore. *Animal zibetbi*. Aldrov. de quadrup. digit., pag. 340.

Meles unguibus uniformibus. Linn. Syst. nat. edit. IV. pag. 65. -- *Meles unguibus uniformibus*, cinerea. Syst. nat. edit. VI., pag. 6. — *Zibetba*. *Viverra cauda annulata*, dorso cinereo, nigroque undatim striato. Syst. nat. edit. X., pag. 44. Nota. 1.º Che dal genere del tasso, in cui era la civetta nella quarta, e nella sesta edizione, ella passò in quello della *Viverra*; che dapprima era col solo tasso, edizione IV., indi col tasso, e coll'icneumone, edizione VI.; e che finalmente nella decima edizione non si trova più col tasso, ma coll'icneumone, colla muffetta, colla puzzola vergata, e colla ginetta. Nota. 2.º Che l'Autore ha cambiata la comune significazione della parola

civetta, di cui qui diamo la figura (Tav. VII. fig. 1.) c'è paruta esser la stessa, che la civetta descritta dai Socj dell' Accademia delle Scienze, nelle Memorie per servire alla storia degli animali; crediam parimente, ch' essa sia la stessa, che quella di Cajo presso Gesnero, pag. 837., e la stessa ancora che quella, di cui Fabio Colonna ha date le figure (sì del maschio, come della femmina) nell' opera di Giovanni I 4 Fabri,

rola *viverra*, di cui egli fa un nome generico per cinque animali, tra' quali crederebbesi di dover almen trovare il vero *viverra*, cioè il *fuscetto*, che non ostante non vi si trova, e cui bisogna cercare nel genere delle donnole, pag. 46. Nota. 3.^o Che il tasso, ch' era solo nel suo genere colla civetta, edizione IV., e coll' icneumone, e la civetta, edizione VI., trovasi nell'edizione X. coll'orso; coll'orso bianco di Groenlandia, col lupatto della baja d' Haffson, e col rattone, o racoon d'America. Non ho citati questi tratti disparati di nomenclatura, che per far comprendere quanto questi pretesi generi siano arbitrari, e poco stabili perfino in capo di coloro, che gli hanno immaginati.

Meles fasciis & maculis albis, nigris & rufescentibus variegata. . . . Civetta, la civetta. Brisson, Regn. animal, pag. 276.

Fabri , che viene dopo quella di Hernandez (a).

La seconda specie , che noi chiamiamo il zibetto , ci è sembrata lo stesso animale , che quello , che fu descritto dal Sig. de la Peyronnie , sotto il nome d' *animale del muschio* , nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze , anno 1731. tutteddue son diversi dalla civetta pe' medesimi caratteri , a tutteddue manca la chioma , o i lunghi peli sulla spina del dorso , tutteddue hanno alcuni anelli ben visibili sulla coda , quando la civetta al contrario non ha nè chioma , nè anelli visibili . Convien però confessare , che il nostro zibetto , e l'animale del muschio del Sig. de la Peyronnie , non hanno tra essi una sì perfetta rassomiglianza , che basti a toglierci ogni dubbio sulla identità della loro specie : gli anelli della coda del zibetto son più larghi di quelli dell' *animale del muschio* ; questo non ha una doppia collana , e ha la coda più corta a proporzione del corpo ; ma siffatte differenze ci pajon assai leggieri , e potrebbero anch' essere soltanto varietà accidentali , a cui le civette devono esser più soggette , che gli altri animali selvaggi , poiché

(a) Hernandez . *Hist. Mex. Romæ* , 1628. , pag. 580. , e 581.

chè in varj luoghi del Levante, e dell' Indie s' allevano, e si nutrono come animali domestici . Quel ch' è certo, si è, che il nostro zibetto rassomiglia assai più all' animale del muschio del Sig. de la Peyronnie, che alla civetta, e che per conseguenza si posson essi riguardare, come animali della medesima specie, poichè non si è assolutamente dimostrato, che la civetta, e 'l zibetto non siano varietà d' una medesima specie; imperciocchè non sappiamo se questi animali possano congiungersi, e produrre insieme; e quando diciamo, che ci pajon di due specie differenti, non ne diamo un giudizio assoluto, ma proferiamo soltanto una profunzione fortissima, poichè essa è fondata sulla costante differenza de' loro caratteri, e siffatta costanza di differenze è quella, che ordinariamente distingue le specie reali dalle semplici varietà.

L' animale, che qui chiamiamo *Civetta*, in Madagascar si nomina *Falanove* (a), nel Congo *Nzime* o *Nzfsu* (b), nell' Etiopia

(a) Viaggio di Flaccourt . Parigi 1661., pag. 150., e 154.

(b) Merolla citato dall' Abate Prevost. Storia Generale de' Viaggi . Tom. IV., pag. 585.

tiopia *Kankan* (a), nella Guinea *Kastor* (b). Essa è la civetta della Guinea, poichè sappiamo di certo, che quella, che noi abbiamo avuta, era stata mandata viva dalla Guinea a San Domingo ad un de' nostri Corrispondenti, che avendola per qualche tempo mantenuta in San Domingo, la fece ammazzare per inviarcela più facilmente.

Il zibetto è verisimilmente la civetta dell'Asia, dell'Indie orientali, e dell'Arabia, ove vien chiamata *zebet*, o *zibet*, nome Arabo, che dinota e significa anche il profumo di quest'animale, e che noi abbiamo adottato per disegnare l'animale medesimo. E esso è diverso dalla civetta, perchè ha il corpo più lungo, e men grosso, il muso più sciolto, più piatto, e alquanto concavo sulla parte superiore, quandochè il muso della civetta è più grosso, men lungo, e alquanto convesso. Egli ha parimenti le orecchie più sollevate, e più larghe, la coda più lunga, e meglio segnata di macchie, e d'anelli, il pelo molto più corto, e più tenero; non ha affat-

to

(a) Vedi *idem*, Tom. III., pag. 295., e 296. *Kankan*.

(b) Vedi *idem ibidem*; e Tom. IV., pag. 236.; Tom. V., pag. 86. e seguenti.

to chioma , cioè peli più lunghi degli altri sul collo, nè lungo la spina del dorso, non ha parte nera al di sotto degli occhi, nè sulle guance ; che sono tutti caratteri particolari , e assai rimarchevoli nella civetta . Alcuni Viaggiatori avevano già sospettato , che vi fossero due specie di civette (a) , ma nessuno le aveva conosciute tanto chiaramente da poterne fare la descrizione . Noi le abbiamo vedute amendue , e dopo averle attentamente insieme paragonate , le abbiám giudicate di specie, e forse anche di clima differenti .

Questi animali sono stati chiamati *gatti muscati*, o *gatti civette* ; essi però altro non hanno di comune col gatto , che l' agilità del corpo ; rassomiglian più tosto alla volpe , soprattutto per la testa ; hanno il mantello segnato di macchie, e di fasce, il che le ha fatte anche prendere per piccole pantere da quelli, che non le han vedute, che da lungi, ma son diverse dalle pantere per ogni riguardo . Vi ha un animale , che chiamasi la *genetta*, la quale è egualmente macchiata , ha la testa a un di presso della medesima forma , e porta , come la civetta , un sacco, in cui filtrafi un umore odoroso : la *genetta* però è più piccola del-

(a) Aldrov. de quadrup. digit., pag. 341.

le nostre civette; essa ha le gambe molto più corte, e 'l corpo assai più sottile; il suo profumo è debolissimo, e di poca durata, al contrario il profumo delle civette è fortissimo, e quello del zibetto è d' un' acutezza estrema, e più vivo anche di quello della civetta (a). Siffatto odoroso liquore trovasi nell' apertura, che questi due animali hanno vicino alle parti della generazione; esso è un umor denso, d' una consistenza simile a quella delle manteche, e 'l cui profumo, benchè fortissimo, all' uscir del corpo dell' animale riesce assai grato. Non deesi confondere l' odorosa materia, che traggesi dalle civette, col muschio, ch' è un umor sanguigno, che si cava da un animale affatto diverso dalla civetta, o dal zibetto. L' animale che produce il muschio.

(a) Malgrado tutte le cure, che si son usate già da lungo tempo di raccogliere nel Serraglio differenti animali stranieri, pure questi sono i due soli della loro specie, che vi sian comparsi, e i soli, nel numero degli animali muscati, che vi si son veduti, che abbian dato un sì gran profumo. *Memoria del Sig. de la Peyronnie inserita in quelle dell' Accademia delle Scienze, anno 1731. , pag. 444.* Parlasti in questo passo dell' animale del muschio, che crediamo esser lo stesso, che il nostro zibetto.

schio è una specie di cavriuolo, o di capra senza corna, che non ha niente di comune colle civette, se non che somministra, com'esse, un profumo acutissimo.

Dunque queste due specie di civette non eran mai state chiaramente l'una dall'altra distinte; tuttedue sono state talvolta confuse colle donnole odorifere (a), colla ginetta, e col cavriuolo del muschio; e sono state prese anche qualche volta per l'iena. Bellon, che ha data una figura, e una descrizione della civetta, ha preteso, che questa fosse l'iena degli Antichi (b); il suo errore è tanto più degno di scusa, quanto non è senza fondamento; egli è certo che la maggior parte delle favole, che gli Antichi spacciarono riguardo all'iena, furon prese dalla civetta; le bevande amorose, che traevansi da certe parti dell'iena, e la forza di tali bevande per eccitare all'amore, dinotano bastantemente la virtù stimolatrice, che scorgesi nella man-

(a) Aldrovando ha detto che la donnola odorifera, che nella Virginia chiamasi *Cassam*, era la civetta. Aldrov. *de quadrup. digit.* pag. 342. Quest' errore è stato adottato da Hans Sloane, che, nella sua Storia della Giamaica, dice che nella Virginia sonovi delle civette.

(b) Bellon, *Observ. Parigi*, 1555., fol. 93.

manteca di civetta, della quale nell'Oriente si servono anche per siffatto uso. Ciò ch'eglino dissero dell'incertezza del sesso nell'iena, dee si applicare anche più alla civetta, poichè il maschio esteriormente non ha altro, che al di fuori appare, che tre aperture del tutto simili a quelle della femmina, alla quale per tali parti esteriori esso rassomiglia tanto, che solo colla Notomia si può venir in chiaro del sesso: l'apertura, entro cui si trova il liquore, o per meglio dire l'umore denso del profumo, è in mezzo alle altre due, e in una stessa linea retta, che s'estende dall'osso sacro fino al pube.

Un' altro errore, che ha fatto molto maggiori progressi, che l'errore di Bellon, è quello di Gregorio de Bolivar riguardo a' climi, in cui trovasi la civetta: dopo d'aver detto, ch'ella è comune nell'Indie orientali, e nell'Africa, egli assicura positivamente, che la si trova altresì, ed anche in grandissimo numero, in tutte le parti dell'America meridionale. Quest'asserzione, che ci è stata trasmessa dal Fabri, è stata copiata da Aldrovando, e in appresso adottata da tutti quelli, che hanno scritto intorno alla civetta. Per altro egli è certo, che le civette sono animali de' climi i più caldi dell'antico continente, che non han potuto penetrare ne' paesi settentrionali per trasferirsi nel nuovo, e che real-

realmente , ed effettivamente non vi sono state giammai in America altre civette, che quelle , che vi furon trasportate dall' isole Filippine , e dalle coste dell' Africa . Siccome quest' asserzione di Bolivar è positiva , e la mia al contrario non è che negativa , così sono in obbligo di riferire le ragioni particolari , colle quali si può provare la falsità del fatto . Cito qui sotto tutt' interi i passi del Fabri (a) , affinché

(a) *Hoc animal (zibeticum scilicet) nascitur in multis Indiae orientalis, atque occidentalis partibus, cujusmodi in orientali sunt provinciae Bengalae, Ceylan, Sumatra, Java major & minor, Maliput, ac plures aliae. . . In nova Hispania vero sunt provinciae de Quatemala, Campege, Nicaragua, de Vera-Cruce, Florida, & magna illa insula Sancti Dominici, aut Hispaniola, Cuba, Mantalino, Guadalupa, & aliae. . . In Regno peruano animal hoc magna copia reperitur, in Paraguay, Tucuman, Chiriquanas, Sanctae-Cruce, de la Sierra, Jungas, Andes, Chiachiapoiias, Quizos, Timana, novum regnum, & in omnibus provinciis magno flumine Maragnone confinibus, quae circa hoc ferme sine numero ad duo leucarum millia sunt extensa. Multo adhuc plura ejusmodi animalia nascuntur in Brasilia, ubi mercatura, vel*

chè se ne possa fare un convenevol giudizio, e aggiungo su questo soggetto le riflessioni, che seguono: 1.° la figura data dal Fabri, pag. 538. gli era stata lasciata dal Recchi senza descrizione (a); la detta figura ha per iscrizione, *animal zibethicum Americanum*; ella non rassomiglia per verun modo nè alla civetta, nè al zibetto, e rappresenta piuttosto un tasso: 2.° il Fabri dà la descrizione, e le figure di due civette, l'una femmina, e l'altra maschio, le quali rassomigliano al nostro zibetto, ma queste civette non sono lo stesso animale (b), che quello della prima figura: e le due

cambium zibethi, sive algalia exercitatur.
 Novæ Hisc. anim. Nardi Antonii Recchi
 imagines & nomina, Joannis Fabri Lyn-
 cei expositione, pag. 539.

(a) Ecco ciò che dice il Fabri, nella sua Prefazione, riguardo a' suoi Commentarij sopra gli animali, di cui entra a trattare. *Non itaque sis nescius, hos in animalia, quos modo commentarios edimus, mera nostra conscriptos esse industria, ac conjectura, ad quas nam animantium nostrorum species illa reduci possint, cum in autographo præter nudum nomen, & exactam picturam de historia ne qui quidem reperitur, pag. 465.*

(b) Il Fabri è obbligato a dir egli stesso, che

due seconde figure non rappresentano animali d' America , ma civette dell' antico continente, che Fabio Colonna, compagno del Fabri nell' Accademia de' Lincei, aveva fatte disegnare in Napoli, e di cui gli aveva mandata la descrizione unitamente alle figure: 3.^o dopo d'aver citato Gregorio de Bolivar riguardo a' climi, in cui si trova la civetta, il Fabri finisce coll' ammirare la gran memoria di Bolivar (a), e col dire, ch' egli intese della sua bocca questo racconto con tutte le sue circostanze. Queste tre riflessioni basterebber esse sole per render sospettissimo il preteso *animal zibethicum Americanum*, egualmente che le asserzioni del Fabri prese da Bolivar ;
ma

che queste figure non si rassomigliano .
Quantum hæc icon ab illa Mexicana differat, ipsa pagina ostendit . Ego climatis, & regionis differentiam plurimum posse non nego, pag. 581.

- (a) *Miror profecto Gregorii nostri summam in animalium perquisitione industriam, & tenacissimam eorum, quæ vidit unquam memoriam. Juro tibi, mi lector, hæc omnia quæ hæcenus ipsius ab ore, & scriptis hausi, & post hæc dicturus sum, plura rarioque illius ipsam ope libri memoriter descripsisse, & per compendium quodam modo (cum inter colloquia protractiora & jam plura afferat) tantum contraxisse, pag. 540.*

ma ciò che meglio dimostra l'errore, si è che si trova in un' Operetta di Fernandez sugli animali d'America, alla fine del Tomo, che contiene la Storia Naturale del Messico di Hernandez, del Recchi, e del Fabri, che si trova, io dico, *cap. XXXIV. pag. 11.*, un passo, che formalmente contraddice a Bolivar, e in cui Fernandez (a) assicura, che la civetta non è un animal originario dell'America, ma che a' suoi tempi erasi cominciato a trasportarne alcune dalle Isole Filippine (b) nella nuova Spa-

(a) *De Æliuro, a quo Gallia vocata corraditur, c. XXXIV.*

Non me latet vulgare esse, hoc felis vocari genus Hispanis; quonquam advenam non indigenam, verum qui ex insulis Philippicis cepit jam in hanc novam Hispaniam adferri. Hist. antin. & miner. nov. Hisp. lib. I., a Francisco Fernandez, pag. 11.

(b) La civetta trovasi nell' isole Filippine sulle montagne: la sua pelle rassomiglia molto a quella della tigre, non è men selvaggia di essa, ma è assai più piccola. Gli abitanti la pigliano, la legano, e dopo d'averle tolto il zibetto, ch'è dentro a una piccola borsa, ch'ell' ha sotto la coda, la lasciano in libertà per ripigliarla un'altra volta. *Relazione di diversi viaggi, di Thevenot, Parigi, 1696. Relazione dell' I.*
fo.

Spagna. Finalmente accoppiando questa testimonianza positiva di Fernandez con quella di tutt' i Viaggiatori, che dicono, che le civette sono in fatti comunissime nell' isole Filippine, nell' Indie orientali, e nell' Africa, e niuno de' quali dice averne vedute in America, non si ha più a dubitare di ciò, che abbiamo asserito nella nostra enumerazione degli animali dei due continenti, e resterà per cosa certa, benchè tutt' i Naturalisti abbiano scritto il contrario, che la civetta non è affatto un animal originario dell' America, ma un animale particolare, e proprio dei climi caldi dell' antico continente, e che nel nuovo non se ne trovarono giammai, se non dopo che vi furon trasportate. S' io stesso non avessi usata ogni attenzione contro siffatti abbagli, che son pur troppo frequenti, avremmo data la nostra civetta per un animale Americano, essendoci stata mandata da San-Domingo; ma avendo io ricercata la memoria, e la lettera del Sig. Pagès (a), che ce l' ha trasmessa, vi ho tro-

sole Filippine, pag. 10. — Trovasi una quantità di civette sulle montagne dell' isole Filippine. Storia Generale dei Viaggi, Tom. X., pag. 397.

(a) La civetta fu trasportata dalla Guinea; ella

trovato, ch' essa era stata mandata dalla Guinea. Io insisto sopra tutti questi fatti particolari, perchè gli considero come altrettante prove del fatto generale della differenza reale, che trovasi fra tutti gli animali di ciascun continente.

La civetta, e l' zibetto adunque sono amendue animali del continente antico; nè han tra loro, che le differenze esteriori da noi sopraccennate: quelle poi, che si trovano nelle parti interiori, e nella struttura de' serbatoj, che contengono il profumo

essa si pasceva delle frutta di questo paese, ma mangiava pur assai volentieri la carne. Per tutto il tempo, ch' ell' ha vissuto, tramandava un odor insoffribile di muschio a una distanza anche grandissima. Poichè fu morta, io durava molta fatica a sostenerne l'odore nella stanza. Le ho trovata una fessura precisamente sullo scroto, ch' era un'apertura comune di due borse, ch' ella aveva, ciascuna allato dei testicoli. Tali borse eran piene d'un umor grigio, denso, e viscoso, mischiato di peli molto lunghi, ch' erano dello stesso colore di quelli, che ho trovati nelle dette borse. Questi sacchi potevano avere circa un pollice e mezzo di profondità; il lor diametro è molto maggiore all'apertura, che nel fondo. *Estratto della Memoria del Sig. Pagès, Medico del Re in San Domingo, colla data dal capo, a' 6. Settembre, 1759.*

mo, sono state sì bene additate , ed i serbatoj medesimi sì attentamente descritti dai Signori Morand (a), e de la Peyronie, ch' io non potrei, che ripetere ciò ch' eglino han detto . Quanto a quello, che ci resta d' esporre intorno a questi due animali, siccome questo consiste o in cose, che loro son comuni, o in fatti, che sarebbe molto difficile d' applicare all' uno piuttosto, che all' altro, così abbiain creduto di dover unire il tutto in un solo, e medesimo articolo .

Le civette (cioè la civetta , e 'l zibetto , poichè ora mi servirò di questa parola nel plurale per additarli tutteddue), benchè originarie e natte dei più caldi climi dell' Africa , e dell' Asia , posson non ostante vivere ne' paesi temperati , e men freddi , purchè vengano attentamente difese dalle inclemenze dell' aria , e sian loro dati alimenti scelti , e sugosi . In Olanda se ne mantengono in gran numero , e vi si fa commercio del lor profumo . La *civetta* d' Amsterdam è da' nostri Negozianti preferita a quella , che viene dal Levante , o dall' Indie , la quale d' ordinario è men pura . Quella , che tirasi dalla Guinea sarebbe

(a) Memorie della Reale Accademia delle Scienze , anno 1728. , e 1731.

rebbe di tutte la migliore (a), se i Negri
come pure gl' Indiani, e i Levantini (b)
non

(a) Nel Malabar veggonsi moltissime civette; ella è un piccol animale, che molto assomiglia al gatto, toltone il muso, ch'è più puntuto; ha le unghie men dannose, e grida diversamente. Il profumo, che produce, si genera, come una specie di grasso, in un'apertura situata sotto la sua coda; questo si cava di tanto in tanto, e vi si riproduce in gran abbondanza secondo che la civetta è meglio pasciuta. Si fa di tal profumo un gran traffico in Calicut, ma per lo più è falsificato, quando pur uno non se'l colga da se stesso. *Viaggio di Dellon*, pag. 11. --- *Optimum zibethi genus ex Guinea advehitur, sinceritate eximium.* Joannes Hugo.

(b) Il gatto, che produce il zibetto, ha la testa, e'l muso d'una volpe; è grande, e macchiato come il gatto-tigre, ed è ferocissimo: ogni due giotni se ne trae il zibetto, che non è che una certa muscosità, o sudor denso, ch'egli ha in una concavità posta sotto la coda ec. *Viaggio de la Maire*. Parigi, 1695., pag. 100. e 101. L'animale, di cui parla questo Viaggiatore, è la civetta di Guinea. --- Vidi nel Cairo, nella casa d'un Veneziano, molti animali estremamente fieri, della grandez-

non l'adulterassero, frammischiandovi de' sughi di vegetabili, come del ladano, dello storace, e d'altre droghe balsamiche, e odorose. Per raccogliere siffatto profumo, eglino metton l'animale in una stretta gabbia, ove non possa voltarsi; apron la gabbia all'estremità, tirano l'animale per la coda, procurano di farlo restare in tale situazione, mettendo un bastone attraverso ai cancelli della gabbia, per mezzo del quale gli tengon ferme le gambe di dietro, indi gli fanno entrare un piccol cucchiajo nel sacco, che contiene il profumo,

ra-

za quasi d'un cane da ferma, ma più grossolani, e in tutto simile di figura a' nostri gatti. (*Il can da ferma, è una specie di can da caccia, che si stende su'l ventre per acchiappare le pernici, le quaglie, le lepri, e ogni altra specie di cacciagione*). Essi son ivi chiamati *gatti-muscati*, e sono custoditi entro a gabbie. Per venirne a capo, e perchè non si mordano, tengonsi separati in gabbie di legno assai forti, ma sì strette, che non si possano voltare. Apresi poi la gabbia per di dietro quanto bisogna per tirarne fuori le gambe, senza ch'egli possa voltarsi per morder quello, che lo tiene; e poichè si è raccolto il zibetto, rimettesi l'animale nella gabbia, ov'è ognor tenuto ben serrato. *Viaggio di Pietro della Valle; Roano, 1745., Tom. I.,*

pag.

raschiano attentamente tutte le pareti interiori del detto sacco, e ripongono la materia estrattane in un vaso, che coprono con molta cura. Quest' operazione ripetesi due o tre volte per settimana. La quantità dell' odoroso umore dipende assai dalla qualità degli alimenti, e dall' appetito dell' animale; ei ne produce in maggior copia quando è meglio, e più delicatamente pacificato: la carne cruda, e sminuzzata, le uova, il riso, i piccoli animali, gli uccelli, il pollame ancor giovane, e i pesci soprattutto, sono i cibi, che gli si deono dare,

pag. 401. — Le Civette, che in Arabia chiamansi *Zebides*, son naturalmente selvagge, e soggiornano sulle montagne dell' Etiopia. Se ne trasportan molte in Europa, poichè si prendon piccole, e si mantengono in gabbie di legno assai forti, in cui si dà loro a mangiare latte, farina, grani cotti, riso, e alle volte carne ec. *L'Africa di Marmol*, Tom. I., pag. 57. — Vedi parimente il *Viaggio di Thevenot*, Parigi, 1664., Tom. I., pag. 476. — Le civette dell'isola di Giava producon tanto profumo quanto quelle della Guinea, ma men bianco, e non così buono. *Proseguimento della Relazione di Adamo Oleario*, Tom. II., pag. 350. *Indigena ita hoc pigmentum adulterant, ut ausim affirmare nullum ziberthum sincerum ad nos deferri*. *Prosp. Alp. Hist. Egypt.* Lugd. Bat. 1735., pag. 239.

dare, e convien variarli, perchè si conservi sano, e gli si stuzzichi l'appetito: ha bisogno di pochissima acqua, e benchè non foglia bere, che assai di rado, pure urina frequentemente, e nella maniera d'urinare non si distingue il maschio dalla femmina.

Il profumo di questi animali è sì forte, che si comunica a tutte le parti del loro corpo; il pelo n'è imbevuto, e la pelle n'è penetrata a segno, che l'odore (a) se

Tom. X.

K

ne

(a) Il serbatojo, che contiene l'odoroso liquore del zibetto, è al di sotto dell'ano, e al di sopra d'un altro orifizio cotanto somigliante nei due sessi, che senza venire alla sezione tutte le civette parrebbero femmine . . . Siccome si è notato, che le civette sono da un tal liquore incomodate, quando i vasi, che lo contengono, ne son troppo pieni, così si son in esse trovati anche de' muscoli, di cui si servono per comprimere i detti vasi per farlo uscire. Benchè questo si trovi in maggior quantità in siffatti serbatoj, e meglio vi si perfezioni, non ostante vi ha luogo a credere, che si spanda altresì in sudore per tutta la pelle; in fatti il pelo dell'e due civette era molto odorifero, e soprattutto quello del maschio era sì profumato, che passandovi sopra la mano, questa ne conservava lungamente un aggradevole odore. *Storia dell'Accademia delle Scienze dal suo stabilimento. Parigi, 1733, Tom. I. pag. 82 e 83.*

ne conserva lungo tempo anche dopo la morte , e mentr' essi vivono , la violenza del lor odore è insopportabile , soprattutto stando con essi in qualche luogo rinchiuso. Quando irritandoli vengon ad esser riscaldati , l' odore si esalta anche più , e se si tormentano a segno di farli sudare , se ne raccoglie il sudore , ch' è parimente profumatissimo , e serve ad adulterare il vero profumo , o per lo meno ad accrescerne il volume .

Le civette son naturalmente selvagge , ed anche alquanto feroci ; nondimeno facilmente s' addimesticano , o almeno si riducono a segno di potersele accostare , e di maneggiarle senza gran pericolo ; hanno i denti forti , e taglienti , ma le unghie deboli , e spuntate ; sono agili e leggiere , quantunque sian di grossa corporatura ; saltano come i gatti , e posson correre eziandio come i cani ; vivono di caccia , sorprendono , e inseguono i piccoli animali , e gli uccelli ; tentano , come le volpi , di entrare nei cortili rustici per predarne il pollame ; i loro occhj di notte risplendono , e si crede , che veggano al bujo . Quando mancano gli animali , esse si pascono di radici , e di frutta ; beono poco , non abitano in terre umide , e amano di soggiornare fra le sabbie cocenti , e sulle aride montagne . Nel loro clima esse partoriscono abbondantemente , ma nelle re-
gio-

gioni temperate , sebben possano vivervi , e vi rendano , come nel loro natìo paese , il lor profumo , pure non possono propagarsi . Hanno la voce più forte , e la lingua men ruvida del gatto , e le loro grida rassomiglianò a quelle d' un cane in collera .

L'umor untuoso , e profumato , che si cava da questi animali , in francese si chiama *civette* , e nell' Arabia , nell' Indie , e nel Levante , ove se ne fa un maggior uso che in Europa , appellasi *zibetto* , o *algallia* . Nella nostra medicina il zibetto non serve quasi più niente ; i profumieri però , e i confettieri ne adoperano ancora nel miscuglio de' lor profumi : l'odore , benchè violento , è nondimeno più soave di quello del muschio ; amendue cessarono d' essere di moda quando fu conosciuta l'ambra , o per meglio dire , quando si seppe prepararla ; ma l'ambra istessa , la quale , non ha gran tempo , passava per l'odore più eccellente , pel più squisito , e nobile profumo , ha già perduto del suo pregio , e più non alletta le nostre genti delicate .

LA GINETTA (a).

LA ginetta è un animale più piccolo delle civette: ha il corpo allungato, le gambe corte, il muso puntuto, la testa sfilata, il pelo tenero e molle, d'un grigio-cinerino, lustro, e segnato di macchie nere, rotonde, e separate su i lati del corpo, ma sul dorso uniscono sì da vicino, che sembrano

(a) La Ginetta; in Francese *Genette*; in Spagnuolo *Genetta*.

Genette. Bellon; *Observ.* fol. 73.

Genetta. Gesner; *Hist. quadrup.* pag. 549.

Genetta, vel *Ginetta*. Ray, *Synops. quadrup.* pag. 201.

Mustela cauda annulis nigris, albidisque cincta.

Genetta. Linn. *Syst. nat.* Edit. VI. pag. 5.

Genetta. *Viverra cauda annulata, corpore*

fulvo-nigricante, maculato. *Syst. nat. edit. X.*

pag. 45. *Nota*. Che dal genere delle *Mustele*

è passato a quello delle *Viverre*, e che

lo stesso si trova della maggior parte degli

altri animali, che quell' Autore in ciascuna

edizione cambia di genere senza darne

veruna ragione.

Mustela cauda ex annulis alternatim albidis, &

nigris variegata ... *Genetta*. La *Genette*.

Brillon; *Regn. animal.* pag. 252.

no formar alcune fasce continuate , che s' estendono, lungo tutto il corpo . Ella ha parimente sul collo, e lungo la spina del dorso una specie di chioma , o di pelo più lungo, che forma una fascia nera , e continuata dalla testa sino alla coda , la quale è lunga quanto il corpo , ed è segnata sopra tutta la sua lunghezza di sette o otto anelli alternativamente neri , e bianchi . Le macchie nere del collo sono in forma di fasce , e al disotto di ciascun occhio vedesi una bianca macchia molto apparente . La ginetta ha sotto la coda , e nel medesimo sito , che le civette , un' apertura o sacco , in cui filtrafi una specie di profumo , ma debole , e 'l cui odor è di poca durata . Ella è un pò più grande della faina , che molto le rassomiglia per la forma del corpo egualmente , che pel naturale , e per le inclinazioni ; sembra soltanto che la ginetta s' addimestichi più facilmente . Bellon dice d' averne vedute nelle case in Costantinopoli , ch' erano famigliari al par de' gatti , e si lasciavan correre , e andar per ogni dove , senza che vi facessero nè guasto , nè male : onde sono state chiamate *gatti di Costantinopoli* , *gatti di Spagna* , *gatti-ginette* ; non han però altro comune co i gatti , che l' arte di spiare , e prendere i sorci . Siccome non si soglion queste trovare , che nel Levante , e nella Spagna , così forse per questo motivo se gli è dato il so-

prannome del lor paese ; imperciocchè il nome di *ginetta* non deriva da alcuno degli antichi linguaggi, e probabilmente non è che un nuovo nome preso da qualche luogo abbondante di ginestra, che, com'è noto, è assai comune nella Spagna, ove chiamansi pure *ginetti* i cavalli d'una certa razza. I Naturalisti pretendono, che la ginetta non soggiorni, che in luoghi umidi, e lungo i ruscelli, e che non trovisi nè su i monti, nè nelle terre aride. La specie non è numerosa, o per lo meno non è molto diffusa: in Francia non ve ne sono affatto, nè in verun'altra provincia d'Europa, trattane la Spagna, e la Turchia. Ella ha dunque bisogno d'un clima caldo per sussistere, e per moltiplicarsi; e pure non si trova ella ne' più caldi paesi dell'Africa, e dell'Indie; poichè la fossana, che chiamasi *ginetta di Madagascar*, è una specie differente, della quale parleremo altrove.

La pelle di quest'animale serve a far leggiere, e vaghe pellicce: i manicotti di ginetta erano, alcuni anni sono, alla moda, e si vendevan molto cari; ma dappoi ch'è si conobbe, che se ne facevano di contraffatti, col dipigner di nere macchie le pelli di coniglio grigio, il prezzo se n'è abbassato di tre quarti, e la moda n'è cessata.

IL LUPO NERO.

LA descrizione di quest' animale non è che un supplemento di quella del lupo, poichè li crediamo amendue della medesima specie. Nella storia del lupo (a) abbiain detto, che nelle terre settentrionali dell' Europa se ne trovan alcuni bianchi affatto, e altri interamente neri, e che siffatti lupi neri son più grandi degli altri. Questo lupo è venuto dal Canada; era nero sopra tutto il corpo, ma più piccolo del nostro; avea le orecchie alquanto più grandi, più diritte, e più distanti l'una dall' altra, gli occhi un po' più piccoli, e che sembravan parimente più allontanati, che nel lupo comune. Tali differenze non sono per quanto ci sembra, che varietà sì poco considerevoli, che non bastano per distinguere quest' animale dalla specie del lupo: la più sensibil differenza è quella della grandezza; ma come già più volte abbiain detto, gli animali che son comuni ai due continenti, cioè, quelli del Nord dell' Europa, e quelli dell' America settentrionale, tutti differiscon nella grandezza, e questo Lupo nero del Canada, più piccolo di

K 4

quel-

(a) Vedi nel Tomo VIII. di questa Storia Naturale, l' articolo del lupo, pag. 285.

quelli dell' Europa, ci sembra soltanto confermare un tal fatto generale: ma d'altra parte, essendo stato presso assai piccolo, e indi allevato alla catena, questa sola ristrazione bastò forse per impedirgli di prendere il suo intero accrescimento. I nostri lupi ordinarij son parimente più piccoli, e men comuni nel Canadà, che nell' Europa, e i Selvaggi ne hanno in gran preggio la pelle (a). I lupi neri, i lupi-cervieri, e le volpi vi sono in maggior numero: per altro la volpe nera vi è pure molto rara; ella ha il pelo infinitamente più bello di quello del lupo nero, della cui pelle non può farsi, che una pelliccia assai grossolana.

Non aggiugneremo niente di più alla descrizione, che il Sig. Daubenton ha fatta di quest' animale, che ci fu mandato vivo, e che ci è sembrato rassomigliare al lupo non solo per la figura, ma anche pel naturale, non essendo questi divenuto rapace, che coll'età (b): e non avea, come il lupo, che una ferocia senza coraggio, che lo rendea vile al combattimento, benchè vi fosse esercitato.

L'

(a) Viaggio di Sagard Theodat. *parigi* 1632. pag. 307.

(b) Vedi nel Tomo VII. di questa Storia Naturale, l'articolo del lupo. pag. 287.

L' ONDATRA (a).

ED

IL DESMAN (b).

L' Ondatra, e'l Desman son due animali, che non s'hanno a confonder insieme.

K 5

(a) *Ondatra* presso i Selvaggi dell' America settentrionale. *Ratto muscato del Canada*. *Ratto muscato*. Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze anno 1726. pag. 323.

(b) *Desman* in Isvezia. *Ratto muscato di Moscovia*.

Mus aquaticus Clusii exotic. auct. pag. 373.

Mus aquaticus Clusii. Aldrovand. de quadrup. digit. pag. 448.

Mus aquaticus exoticus Clusii. Ray. *Synops. quadrup.* pag. 217.

Mus aquaticus Clusii. *Museum Wormianum* pag. 334.

Animal ex Moscovia. Ruper, Besser, Gazophyl. Tab. XV.

Castor cauda verticaliter plana, digitis omnibus membranis inter se connexis. . . . *Mus moschiferus*. Le rat musqué. Brisson, *Rogn. animal.* pag. 135.

sieme, quantunque tutti e due sieno stati chiamati *ratti muscati*, e abbiano alcuni caratteri comuni. Bisogna eziandio distinguerli dal Pilori, o ratto muscato delle Antille. Questi tre animali sono di specie, e di clima differenti: l'Ondatra si trova nel Canada, il Desman nella Lapponia e nella Moscovia, e'l Pilori nella Martinica, e nelle altre isole Antille.

L'ondatra, o ratto muscato del Canada è diverso dal desman, perchè ha le dita de' piedi tutte separate, gli occhi molto visibili, il muso assai corto; dove che il desman o ratto di Moscovia ha i piedi di dietro insieme uniti per via d'una membrana (a), gli occhi estremamente piccoli, il muso allungato, come il topo-ragno. Tuttedue hanno la coda piatta, e son diversi dal pilori, o ratto muscato delle Antille, per questa figura, e per altri diversi caratteri (b). Il pilori ha la coda molto corta, e ci-

(a) *Oculi exigui & vix conspicui . . . Digiti majores membranis connexi ad commodius natandum rostri pars superior firma, prominula & pene unciam longa, nigricans, eaque forma praeformata, ut inflat suis, aut talpa terram vertere possit. Clusii exotic. auct. pag. 375.*

(b) I ratti muscati delle Antille, che i Francesi

e cilindrica (a) come quella degli altri ratti, dove che l'ondatra, e 'l desman l'hanno amendue molto lunga. L'ondatra nella testa rassomiglia al ratto d'acqua, e il desman al topo-ragno.

Nelle Memorie dell' Accademia dell' anno 1725., trovasi un'ottima, e diffusa descrizione dell'ondatra sotto il nome di *ratto muscato*. Il Sig. Sarrafin, Medico del Re in Quebec, e Corrispondente dell' Accademia si trattenne in notomizzare un gran numero di questi animali, in cui osservò delle cose singolari. Paragonando la sua descrizione colla nostra, non possiam dubitare, che il ratto muscato del Canada, di

K 6 cui

cessi chiamano *Piloris*, fanno per le più il lor soggiorno nelle buche sotterra, come i conigli; sono parimenti quasi della medesima grossezza, ma in quanto alla figura non han cosa, che somigli ai grossi ratti, che veggonfi altrove, se non che la maggior parte han bianco il pelo del ventre come i ghiri, e quello del resto del corpo, nero o color di cannella. Essi tramandano un odor muscato, che soffoca il cuore, e che profuma tanto il sito del lor soggiorno, ch'è molto facile lo scoprirlo: *Storia Naturale delle Antille. Rotterdam 1658. pag. 124.*

(a) I pilori sono una specie di ratti di bosco due o tre volte più grossi dei ratti ordina-

176

cui egli ha data la descrizione, non sia il nostro ondatra, cioè quell' animale, di cui quì diamo la figura (*tav. IX. fig. 1.*).
 L'ondatra è della grossezza d'un piccolo coniglio, e della figura d'un ratto; ha la testa corta, e simile a quella del ratto d'acqua, il pelo lutto e morbido, con una lanugine molto fitta sotto il primo pelo, a un di presso come il castoreo; ha la coda lunga, e coverta di piccole scaglie come quelle degli altri ratti, essa però è d'una
 figu-

ri; son quasi bianchi, hanno la coda assai corta, e tramandano uno straordinario odore di muschio: *Nuovo viaggio alle isole dell' America. Parigi 1722. Tom. I. pag. 438.*
 ... I pilori trovansi nella Martinica, e in alcune altre isole delle Antille. Essi son ratti muscati della stessa figura dei ratti d'Europa, ma d'una sì prodigiosa grandezza, che quattro de' nostri ratti non pesano un pilori. . . . Fanno i loro nidi perfino nelle case, ma non si propagano in sì gran numero, come gli altri ratti comuni. . . . Questi pilori son naturali dell' isola di Martinica, ma non già gli altri ratti comuni, che non vi son comparsi, che da alcuni anni in quà, dopo che vi frequentano assai le navi ec. *Storia generale delle Antille, del Padre du Tertre. Parigi 1667. Tom. II. pag. 302.*

figura diversa; la coda dei ratti comuni è pressappoco cilindrica, e si diminuisce di grossezza dall' origine fino all' estremità; quella del ratto muscato è molto piatta verso il mezzo fino all' estremità, e nel principio, cioè nell' origine alquanto più rionda: le facce appianate non sono orizzontali, ma verticali, di maniera che sembra, che la coda sia stata serrata, e dai due lati compressa in tutta la sua lunghezza. Le dita de' piedi non sono insieme unite per via di membrane; ma fornite di lunghi peli molto folti, che in parte suppliscono all' effetto della membrana, onde riceve l' animale maggior facilità per nuotare. Le orecchie sono cortissime, non però nude, come quelle del ratto domestico, ma ben coperte di pelo al di dentro, e al di fuori: gli occhi grandi, la cui apertura è di tre linee; due denti incisivi, lunghi circa un pollice, vi sono nella mascella inferiore, ed altri due più corti nella mascella superiore: i detti quattro denti sono fortissimi, e gli servono per rosicchiare, e per tagliare il legno.

Le cose singolari, che il Sig. Sarrafin ha osservate in quest' animale sono, 1.º la forza, e il gran dilatamento del muscolo della cute, il quale fa che l' animale, raggrinzando la sua pelle, può ristringere il corpo, e ridurlo ad un più piccol volume: 2.º la pieghevolezza delle coste false, per
cui

cui fassi questa contrazione di corpo, la qual è sì grande, che il ratto muscato passa fra buchi, in cui entrar non possono animali molto più piccoli di lui: 3.° la maniera, con cui nella femmina escono le urine, poichè l'uretra non mette capo, come negli altri quadrupedi, al disotto della clitoride, ma ad una pelosa prominenza situata sopra l'osso pube; e questa prominenza ha un orifizio particolare, che serve all'uscita delle urine; organizzazione singolare, che non trovasi, che in alcune specie d'animali, come nei ratti, e nelle scimie, le cui femmine hanno tre aperture. Si è osservato, che il castoreo è il solo fra i quadrupedi, nel quale le urine, e gli escrementi metton capo egualmente ad un ricettacolo comune, che paragonar si potrebbe alla cloaca degli uccelli. Le femmine dei ratti, e delle scimie sono forse le sole, che abbiano il condotto delle urine, e l'orifizio, per cui esse scolano, assolutamente separato dalle parti della generazione: siffatta singolarità trovasi nelle femmine soltanto, poichè ne' maschi di questa medesima specie l'uretra mette capo all'estremità della verga, come in tutte le altre specie di quadrupedi: 4.° il Sig. Sarrafin ha osservato, che i testicoli, che, come negli altri ratti, son situati dai due lati dell'ano, quando l'animale va in amore, divengono grossissimi rispettivamente alla sua mol-

molta piccolezza; *grossi*, dic'egli, *come noci moscade*; ma che dopo un tal tempo diminuiscono all'assissimo, e si riducono a segno di non aver più d'una linea di diametro; ch'essi cangian non solo di volume, di consistenza, e di colore, ma di situazione eziandio d'una maniera notabile; lo stesso avviene delle vescichette seminali, dei vasi deferenti, ec.: passata la stagione d'amore, tutte queste parti della generazione si cancellano quasi del tutto; i testicoli, che in siffatto tempo erano assai prominenti, e sporgevan molto infuori, rientrano nell'interno del corpo; essi sono attaccati alla membrana pingue, o per meglio dire, vi sono inchiusi, egualmente che le altre parti, che abbiamo accennate: tale membrana si estende, e s'augmenta per la soprabbondanza del nutrimento fino al tempo dell'amore; le parti della generazione, che pajon essere appendici della detta membrana, si sviluppano allora, si estendono si gonfiano, ed acquistano tutte le loro dimensioni; ma dapoichè siffatta soprabbondanza di nutrimento rimane esauستا per via di coiti replicati, la pingue membrana, che dimagrisce, si restringe, si raggrinza, e a poco a poco ritira dal lato dei reni, ritirandosi trascina seco i vasi deferenti, le vescichette seminali, gli epididimi, e i testicoli, che divengon leggieri, vuoti, e aggrinzati a segno da non potersi più distinguere.

guere: lo stesso accade delle vescichette femminali, che nel tempo del lor gonfiamento hanno un pollice e mezzo di lunghezza, e poi si riducono, come pure i testicoli, ad una o due linee di diametro: 5.^o le piccole borse, che contengono il muschio o il profumo di quest' animale sotto la figura d' un umor lattiginoso, e che son vicine alle parti della generazione, provano altresì gli stessi cambiamenti; nel tempo degli amori son grossissime, e assai gonfiate, e il lor profumo è fortissimo: sommamente esaltato, e sensibilissimo, anche a notabil distanza; poi si raggrinzano, si restringono, e finalmente si cancellano affatto. Questo cambiamento delle borse, che contengono il profumo faasi più prontamente, e più compiutamente, che quello delle parti della generazione; queste borse, che son comuni ai due sessi, contengono nel tempo degli amori un latte molto abbondante; queste hanno vasi escretori, che nel maschio metton capo all' estremità della verga, e verso la clitoride nella femmina, e tale separazione si fa, e si evacua presso a poco allo stesso sito, che l' urina negli altri quadrupedi.

Tutte queste singolarità, che ci sono state disegnate dal Sig. Sarrafin, eran degne dell' attenzione d' un valente Anatomico, e non si può abbastanza lodarlo per le replicate cure, ch' egli ha usate per avvera-
re

re queste specie di fenomeni della Natura, e per vedere tai cambiamenti in tutt' i loro periodi. Noi abbiain già parlato di cambiamenti, e d' alterazioni presso a poco somiglianti a questi nelle parti della generazione del ratto d' acqua, del campagnuolo, e della talpa. Ecco dunque animali quadrupedi, che per tutto il rimanente della struttura rassomigliano agli altri quadrupedi, ne' quali però le parti della generazione si rinnovano, e si cancellano ogni anno a un di presso come il latte dei pesci, e come i vasi feminali del pesce calamajo, del quale abbiain già descritti i cambiamenti, l'annichilamento, e la riproduzione (a): questi sono quelle mescolanze, per le quali la Natura segretamente avvicina le sostanze, che ci pajono le più remote; questi sono i rari esempli, e le conseguenze poco usate, che non si debbon giammai perder di vista, poichè son collegate col sistema generale dell'organizzazione delle sostanze, e ne riuniscono insieme i punti più lontani. Ma questo non è il luogo di estenderci sopra le conseguenze generali, che tirar si possono dai detti fatti singolari, e nè anche sulle relazioni immediate, ch' essi hanno colla nostra teoria della generazione: un

(a) Vedi il Tomo III. di questa Storia Naturale pag. 269. e seguenti.

un ingegno perspicace le potrà anticipatamente comprendere, e a noi s'offrirà ben presto occasione di presentarle più vantaggiosamente, riunendole alla massa totale degli altri fatti, che v'hanno rapporto.

L'ondata è dello stesso paese di cui è il castoro; abita com'esso presso le acque, ed è in piccolo presso a poco della medesima figura, dello stesso colore, e dello stesso pelo; perciò si è spesso paragonato l'uno all'altro. Assicurasi eziandio, che al primo colpo di vista un vecchio ondata prenderebbsi per un castoro d'un mese di età; essi peraltro nella forma della coda sono bastantemente diversi, perchè non vi si possa prendere abbaglio; nel castoro essa è ovale, e piatta orizzontalmente; nell'ondata però è lunghissima, e piatta verticalmente: del resto questi animali si rassomiglian molto per l'istinto, e pel naturale: le ondatre durante l'inverno vivono, come i castori, in società; si fabbricano alcune piccole capanne di due piedi e mezzo in circa di diametro, e talvolta più grandi, ove più famiglie s'uniscono insieme; non fanno già questo per dormirvi, come le marmotte, cinque o sei mesi in fila; ma soltanto per mettersi in salvo dal rigor dell'aria: queste capanne son rotonde, e coperte d'un tetto della grossezza d'un piede; i materiali consistono in erbe, e giunchi intrecciati, mischiati con terra grassa, che

che questi animali impastano co' loro piedi. La struttura dell' edificio è impenetrabile alle acque piovane , e per mettersi in sicuro dalle inondazioni delle acque della terra , essi vi soglion fare interiormente degli scalini. Siffatte capanne , che servono loro di ricovero , son coperte durante l' inverno di più piedi di ghiaccio , e di neve , senza che ne risentano verun incomodo. Essi non fanno provvisione alcuna per mantenersi , come i castori , ma scavano de' pozzi , e certe specie di condotti a foggia di budelli al disotto , e all' intorno del lor soggiorno per cercarvi dell' acqua , e delle radici : passan così l' inverno con molta noja , quantunque in società , poichè quella non è la stagione de' loro amori ; per tutto quel tempo son privi della luce del cielo ; quando poi il soffio della primavera comincia a discioglier le nevi , e a scoprire la sommità delle loro abitazioni , i Cacciatori aprendone il tetto , gli offuscano aspramente colla luce del giorno , ed uccidono , o prendono tutti quelli , che non hanno avuto tempo di ricoverarsi ne' sotterranei condotti , che s' hanno fabbricati , e che servono loro di ultimo rifugio , fino a' quali son tuttavia inseguiti , poichè la loro pelle è preziosa , e la carne non n' è cattiva a mangiare .
Quelli che sfuggono alla mano del Cacciatore , abbandonano circa questo tempo la loro abitazione , e sen vanno erranti duran-
te

te la state, ma sempre accoppiati a due a due, perchè quello è il tempo degli amori: vivono d'erbe, e si nutron largamente delle nuove produzioni; che loro offre la superficie dellà terra; la pingue membrana s'estende, s'aumenta, e riempiesi per la sovrabbondanza de' buoni alimenti: le piccole borse si rinnovano, e si riempiono del pari; le parti della generazione perdon le grinze, e si gonfiano; e allora questi animali acquistano un odor sì forte di muschio che riesce insoffribile: quest'odore si fa sentir da lungi, e benchè soave (a) per gli Euro-

(a) Il ratto muscato dell' America Settentrionale è alquanto più grosso, e un po' più lungo del ratto d'acqua di Francia. Il suo elemento è l'acqua, ma non lascia di portarsi talvolta a terra: ha la coda piatta, lunga otto o dieci pollici, larga d'un dito, e coverta di piccole staglie nere; ha la pelle rossa, che inclina al bruno; il suo pelo è finissimo, e molto lungo; porta de' rognoni vicino ai testicoli, che hanno un soavissimo odor di muschio, che non reca verun incomodo a tutti quelli, a cui il muschio riesce molesto. Se vien egli ammazzato d'inverno mentre la pelle è buona per esser lavorata da' pelliciai, i rognoni non mandano nessun odore; di primavera essi cominciano ad essere odoriferi. e

Europei, riesce ai Selvaggi sì spiacevole e ingrato, ch' eglino han chiamato puzzolente un fiume, sulle cui rive abitano in gran numero i detti ratti muscati, ch' eglino chiaman pure *ratti puzzolenti*.

Questi animali partoriscono una volta l'anno, e cinque o sei rattini per volta. La durata della loro gravidanza non è lunga, poichè essi non entrano in amore, che al principio della state, e i lor figliuoli son già grandi in Ottobre, quando devono seguire i lor genitori alla capanna, che si fabbrican di nuovo tutti gli anni; poichè si è osservato, che non ritornano mai alle vecchie abitazioni. La loro voce è una specie

continuano ad esserlo fino all'autunno . .

Riguardo alla carne, essa non fa affatto di muschio, ed è eccellente a mangiarsi. *Descrizione dell' America settentrionale, di Denys. Parigi 1672. Tom. II. pag. 258.*

I ratti muscati del Canada tramandano un odore gratissimo; quello della civetta, e della gazzella non è nè sì forte, nè sì soave.

Viaggio de la Fontan. Haja 1706. Tom. I. pag. 95. ...

I Selvaggi Americani non aman affatto l'odore, che tramanda il ratto muscato; eglino gli han dato perfino il nome di *puzzolente*, tanto gli spiace un tale odore.

Memorie dell' Accademia Reale delle Scienze anno 1725. pag. 327.

cie di gemito, che i cacciatori imitano per ingannarli, e per farseli avvicinare. I denti anteriori sono sì forti, e sì propri per rosicchiare, che quando rinchiudesi uno di questi animali in una cassa anche di legno duro, vi fa in pochissimo tempo un buco molto grande per uscirne; e questa è pure una delle facoltà naturali, ch'egli ha comune col castoreo, che rinchiuso noi non abbiain potuto custodire, che raddoppiando di latta la porta della sua prigione. L'ondatra non nuota nè sì presto, nè sì a lungo come il castoreo, ci va più spesso a terra, non corre bene, e cammina anche peggio, dimenandosi come un'oca. La sua pelle conserva un odor di muschio, per cui non se ne fa grand'uso per le pellicce, ma se ne adopera assai il suo secondo pelo, o lanugine nelle fabbriche de' cappelli.

Questi animali son poco feroci, e se si piglian piccoli si possan facilmente addimesticare; quando son giovani son anche molto graziosi; la coda lunga, e quasi nuda, che rende spiacevole la lor figura, è nella prima età molto corta; essi scherzano innocentemente, e con lestezza a guisa di piccoli gatti; non mordono affatto (a), e
fa-

(a) I ratti muscati del Canada, che gli Uroni chiamano *Ondatre*, pascono l'erba sopra
ter-

facilmente verrebbero allevati, se il lor odore non riuscisse molesto. Del resto l'ondatra, e'l desman sono i soli animali dei paesi settentrionali, che producono il profumo; imperciocchè l'odor *castoreo* è spiacevolissimo, e nei soli climi caldi trovansi gli animali, che somministrano il vero muschio, il zibetto, e gli altri profumi.

Il desman, o ratto muscato di Moscovia ci offrirebbe forse delle singolarità rimarchevoli, e analoghe a quelle dell'ondatra, ma sembra, che nissun Naturalista siasi trovato in caso di esaminarlo vivo, nè di notomizzarlo: noi stessi non ne possiam parlare, che della sua forma esteriore, poichè quello, che trovasi nel Gabinetto del Re, fu mandato dalla Lapponia in istato d'esser

terra, ed il bianco dei giunchi all'intorno de' laghi, e de' fiumi. Egli è un piacere a vederli mangiare, e a saltellare finchè son giovani. Io ne aveva uno graziosissimo; lo manteneva col bianco de' giunchi, e con una cert'erba somigliante al *dente-di-cane*; faceva di questo animaletto tutto ciò che ne voleva senza che punto mi mordesse. *Viaggio di Sagard Theodat. Parigi 1632. pag. 322. e 323.* Nota che la pianta, di cui il Sig. Sarrafin dice, che il ratto muscato si pasce più volentieri, è il *Calatrus aromatisans*.

ser. disseccato, il che non permise di farne la notomia: Per lo che a ciò che ne ho già detto non aggiugnerò, che il dispiace. re di non saperne più oltre.



IL PECARI

O

IL TAJACU (a).

LA specie del pecari è una delle più numerose, e delle più rimarchevoli fra gli animali del nuovo Mondo. Il pecari rassomiglia a prima vista al cignale, o più tosto al porco di Siam, che siccome noi abbiain detto, non è altro, che una varietà del cignale, o porco selvaggio, com'è anche il nostro porco domestico; onde il pecari è stato chiamato *cinghiale*, o *porco d'America*: ciò non ostante è d'una specie particolare, e che non si può accoppiare con quella de'nostri cignali, o porci.

Tom.X.

L

ci,

-
- (a) Il *pecari*, il *cinghiale pecari*, nomi, che i Francesi abitanti nell'America meridionale hanno dato a quest'animale. . . Cignale chiamato *pecari*. Voyage de Desmarchais Tom.III. pag.312. Porco, che si chiama *pecari*. Viaggio di Waser impresso in seguito di quello di Dampier. Rouen 1715. Tom. IV. pag. 222. . . *Pecaris*, specie di porco sel-

ci, come ce ne siamo assicurati con replicate osservazioni, avendo allevato e custodito per più di due anni un pecari insieme con alcune troje, senza averne potuto vedere un prodotto. E' differente ancora dal porco per molti altri caratteri essenziali tanto esteriormente, che interiormente: è meno corpulento, e più basso di gambe. Ha lo stomaco, e le intestina diversamente formate, e non ha coda affatto; le setole sono molto più ruvide di quelle del cinghiale, e finalmente sopra il dorso vicino alla groppa ha

selvaggio. Voyage de Dampier. Tom. IV. pag. 69.

Nota. Vi sono pochi animali, a' quali siano stati dati tanti nomi, come a questo. I Selvaggi del Brasile lo chiamavano *Tajassou* secondo de Lery; *Tajacu* secondo Pison, e Marcgrave: *Caaiguara* pure secondo Marcgrave: *Tajoussou* secondo Cereal. (Voyage aux Indes Orientales. Paris 1722. Tom. I. pag. 173.): I Messicani lo chiamavano *Quaubila Coymatl*, ovvero *Quapizotl*, o *Coyameitl*. I Viaggiatori parimente l'anno indicato con diversi nomi. Si chiama *Pelas* alla baja di tutt' i Santi, secondo Dampier (Tom. IV. pag. 69.) *Javari*, o *Paquire* all' isola di Tabago, secondo Rochefort (Relation de l' isle de Tabago. Paris 1666. pag. 31.). *Paquirá* nel Paese delle Amazioni, secondo Ju-

ha una fessura larga due o tre linee, dalla quale stilla un umore fieroso, e acre, molto abbondante, e d'un odor ingrattissimo. Questo fra tutti gli animali è il solo, che abbia un'apertura in questa parte del corpo; il zibetto, il tasso, la ginetta hanno il serbatojo dell'odore sotto le parti della generazione; l'ondata, o sia il ratto muscato del Canada, il muschio, o cavriuolo del muschio l'hanno sotto il ventre. Il liquore, ch' esce da quest' apertura, che ha il pecari sul dorso, vien sommini-

L 2

stra-

Jumilla (*Avignon* 1758. *Tom. II* pag. 6.)
 Saino, o Zaino in più parti dell' America,
 secondo Giuseppe Acosta (*Paris* 1600.
 pag. 196.) Chuchie secondo Oviedo (*Ved.*
Hernand Hist. Mex. pag. 649.) Coscui,
 secondo Coreal (*Voyage de Coreal*, *Tom.*
I. pag. 84.)

Aper Mexicanus. Faber, *apud* *Hernand. Hist.*
Mex. pag. 637.

Sus umbilicum in dorso habens. Aldrov. *de*
quadrup. bisul. pag. 929.

Tajacu. Pison, *Hist. Brasil.* pag. 98 Marc-
 grave. *Hist. Nat. Brasil.* pag. 229.

Tajacu, seu aper Mexicanus moschiferus. Ray.
Synops. quadrup. pag. 97.

Sus minor umbilico in dorso. Porco nero. Bar-
 rère. *Hist. Franc. équin.* pag. 161.

Sus

strato da grosse grandole, che il Sig. Daubenton ha descritte con diligenza, come anche tutte le altre singolarità della struttura di quest' animale. Se ne vede ancora una buona descrizione fatta da Tyson nelle Transazioni Filosofiche num. 153. Io non mi fermerò qui ad esporre circostanziatamente le osservazioni di questi due abili Anatomici, noterò solamente, che il Sig. Dott. Tyson si è ingannato, assicurando che quest' animale aveva tre stomachi, o, come dice Ray (a), un ventricolo, e due stomachi. Il Sig. Daubenton chiaramente mostra, ch'egli non ha un solo stomaco, ma diviso da due contrazioni, che ne fanno comparire tre: che un solo di questi tre sacchetti ha una sortita, o piloro, e che per conseguenza non si devono riguardare gli altri due sacchetti, che come appendici, o porzioni del medesimo stomaco, e non come stomachi diversi.

Il pecari potrebbe divenir domestico, come

Sus dorso cystifero, cauda nulla. Linn. *Syst. nat.* edit. iv. pag. 69., & edit. vi. pag. 12. ... *Tajacu, Sus dorso cystifero, cauda nulla,* edit. x. pag. 50.

Sus ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens. *Aper Mexicanus.* Il Cinghiale del Messico. *Regn. animal.* pag. 111.

(a) Ray, *Synops. quadrup.* pag. 99.

me il porco; è a un di presso del medesimo naturale, e si nutrice co i medesimi cibi: la sua carne, quantunque più secca, e men carica di lardo di quella del porco, non è però cattiva a mangiarsi: e diverrebbe migliore, se fusse castrato. Quando si voglia mangiare di questa carne, bisogna aver molta cura di togliere al maschio non solo le parti della generazione, come si fa al cignale, ma ancora tutte le glandole, che confinano coll'apertura del dorso nel maschio, e nelle femmine; e bisogna parimenti far queste operazioni nello stesso momento, in cui si uccide l'animale, perchè se si aspetta una sola mezz'ora, la carne prende un odore sì gagliardo, che più non si può mangiare.

I pecari sono numerosissimi in tutti i climi caldi dell'America meridionale: vanno ordinariamente in truppa, e sono alle volte dugento, o trecento insieme: hanno il medesimo istinto, che i porci per difendersi, e per assalire principalmente quei, che vogliono rapirgli i loro figli; s'ajutano vicendevolmente, circondano i loro nemici, e sovente feriscono i cani, e i cacciatori. Nei loro paesi nativi stanno più tosto sulle montagne, che ne' luoghi bassi; non cercano le paludi e i fanghi, come i nostri cignali; stanno ne' boschi, ove vivono di frutti selvaggi, di radici, e di semi:

mangiano ancora i serpenti , i rospi , le lucerte , a cui prima cavan la pelle co' piedi : producono in gran numero , e forse più d'una volta l'anno ; i figli seguono subito la madre, nè se ne separano, che quando sono già grandi ; facilmente si rendono domestici , prendendogli giovani ; perdono la ferocia naturale , ma senza spogliarsi della loro grossezza , poichè non conoscono alcuno , nè si affezionano giammai a quei che ne hanno la cura , solamente non fanno alcun male , e si può lasciarli andare , e venire con libertà senza temer di danno alcuno ; non s'allontanano molto , e ritornano da se stessi al proprio albergo , nè fanno liti , che vicino all'abbeveratojo , e alla scodella , quando vien loro presentata in comune : essi hanno un grugnire collerico più forte , e più aspro di quello del cinghiale , ma assai di rado si sentono gridare : somian parimente come il cinghiale , quando sono sorpresi , e spaventati con asprezza : la respirazione è fortissima ; il pelo s'arriccia , e quando sono irritati , è così rigido , che somiglia più tosto alle spine del riccio , che alle setole del cinghiale .

La specie del pecari si è conservata senz'alterazione , nè si è accoppiata con quella del *porco maron* ; così si chiama il porco trasportato d'Europa , e divenuto selvatico in America . Questi animali s'incontrano ne' boschi , e vanno pure in compagnia ,
sen-

senza che ne risulti cosa veruna: lo stesso è del porco della Guinea, che si è tanto moltiplicato nell' America, dopo esservi stato trasportato dall' Affrica. Il porco d' Europa, quello della Guinea, e l' pecari sono tre specie, che sembrano essere molto vicine, poichè tutte tre sussistono nel medesimo clima senza mescolamento, e senz' alterazione, e tuttavia sono distinte, e fra loro separate: il nostro cinghiale è il più forte, il più robusto, e il più formidabile di tutti tre: il pecari sebbene assai feroce, è più debole, più greve, e meno armato: que' gran denti falciati, che si chiamano *guardie*, sono molto più corti, che nel cinghiale: teme il freddo, e non potrebbe sussistere nel nostro clima temperato senza detrimento, come il nostro cinghiale non può sussistere ne' climi troppo freddi: nè l' uno, nè l' altro han potuto affatto passare da un continente all' altro per le terre del Nord; dunque non si dee risguardare il pecari, come un porco d' Europa degenerato, o disnaturato sotto il clima d' America, ma come un animale proprio, o particolare delle regioni meridionali di quel nuovo continente.

Ray, e molti altri Autori han preteso, che il liquore del pecari, che stilla dall' apertura del dorso, sia una specie di muschio, o un grato profumo anche nell'uscir dal corpo dell' animale: che questo soave

odore si faccia sentire molto da lungi , e profumi le parri , per dove passa , e i luoghi , ove si ferma . Io confesso d'aver provato mille volte tutto il contrario ; l'odore di fissatto liquore all'uscire dal corpo dell' animale è così ingrato , che noi non potevamo soffrirlo , nè farlo raccogliere senza un estremo disgusto ; sembra solo , che divenga men puzzolente seccandosi all'aria , ma non prende mai il grato odore del mulchio , nè il profumo del zibetto , e i Naturalisti avrebbero parlato più ragionevolmente , se l'avessero paragonato a quello del Castore .



IL CAN-VOLANTE (a),

IL ROSSETTO,

o S'IA

IL CAN-VOLANTE DAL COLLO

ROSSO (b),

E 'L VAMPIRO (c).

A Noi sembra , che il can volante , e il can-volante dal collo rosso facciano due specie distinte , ma che sono così vicine l'una all' altra , e si somiglian per

L 5

tan-

(a) I Francesi lo chiamano la *Rouffette* , e volgarmente le *Chien-volans* .

Vespertilio ingens . Clusii , *Exotic.* pag. 94.

Vespertilio . Geln. *Hist. avium.* pag. 772.

Canis volans ternatanus orientalis . Seba , Vol.

1. pag. 91. Tab. 57. fig. num. 1. e 2.

Vespertilio cauda nulla . Linn. *Syst. nat.* edit.

vi. pag. 66. , & edit. vi. pag. 7. ... *Vam-*

pirus . *Vespertilio ecandatus naso simplici* ,

membrana inter fœmora divisa , edit. x.

pag. 31.

Ves-

tanti rapporti , che noi stimiamo doverli qui presentare insieme . La seconda non è diversa dalla prima , che per la grandezza del corpo , e pe' colori del pelo ; il can-volante , che ha il pelo di color rosso bruno , ha nove pollici di lunghezza , dall' estre-

mi-

Vespertilio cynocephalus ternatanus . Klein, de quadrup. pag. 61.

Pteropus rufus , aut *niger* , *auriculis brevibus acutiusculis* Il Rossotto . Brisson . *Regn. anim.* pag. 216.

The Great bat , from *Madagascar* . Edwards , *Hist. of Birds* , part. iv. pag. 180.

(b) I Francesi lo chiamano *Rougette* .

Pteropus fuscus , *auriculis brevibus acutiusculis* , collo superiore rubro Il Rossotto dal collo rosso . Brisson . *Regn. animal.* pag. 217.

Nota . Che il Sig. Brisson con ragione ha separato il genere del can volante , e del can volante dal collo rosso da quello dei pipistrelli ; e che il Sig. Linneo si è ingannato , quando dice , che i pipistrelli , e i cani volanti hanno egualmente quattro denti incisivi nella mascella superiore , e altrettanti nell' inferiore : ciò è vero nei cani volanti , e non già nei pipistrelli : questi hanno veramente quattro denti incisivi nella mascella superiore , ma nello stesso tempo ne hanno sei nella inferiore ; perciò non possono essere del medesimo genere in

un

mità del muso fino all'estremità del corpo, e tre piedi di larghezza, quando sono estese le membrane, che gli servono di ale: il can-volante dal collo rosso, il cui pelo è di color cinericcio-bruno, non ha che cinque pollici, e mezzo di lunghezza, e due piedi di estensione; porta sul collo un mezzo collare d'un rosso vivo, mischiato d'a-

L. 6

ran-

un sistema, che (come quello di questo Autore) è fondato sul numero, e sull'ordine dei denti.

(c) Il Vampiro animale dell' America, che non è stato indicato, se non se coi nomi ambigui di *gran pipistrello d' America*, o di *Can-volante della nuova Spagna*.

Nota. Che il Sig. Linneo ha dato questo medesimo nome *Vampyrus*, al can-volante; non applica però questo nome di *Vampyrus* al can-volante dell' Indie Orientali; ma all' animale di America, di cui qui si ragiona, e del quale han detto i Viaggiatori, che succhia il sangue degli uomini senza svegliarli; si può dunque dare il nome di *Vampiro* a questa terza specie, e non già a la prima.

Canis volans maximus, auritus ex nova Hispania. Seba Vol. 1. pag. 92. Tab. 58. fig. num. 1.

Vespertilio cynocephalus maximus auritus, ex

86.

rancio, del quale non si vede alcun vestigio sul collo del can-volante. Questi animali sono tutti e due pressappoco dei medesimi climi caldi nell'antico continente; si trovano a Madagascar (a), nell'Isole di Borbone, a Ternate, nelle Filippine, e nell'altre Isole dell'Arcipelago Indiano, dove par, che sieno più comuni, che nella terra ferma dei vicini continenti.

Si trova ancora nei paesi più caldi del nuovo mondo un'altro quadrupede volante, di cui non ci è stato trasmesso il nome Americano, e che noi chiameremo Vampiro, perchè succhia il sangue degli uomini, e degli animali che dormono, senza cagionar loro tanto dolore, che basti a destarli.

Quan-

novæ Hispaniæ. Klein, de quadrup. pag. 62. Spēstrum, v. spertilio ecandatus naso infundibuliformi lanceolato. Linn. Syst. nat. edit. x. pag. 31.

Pteropus auriculis longis patulis, naso membrana antrosum inflexa aucto. Brisson, Regn. animal. pag. 217.

(a) Nelle Isole di Mascareigne, e di Madagascar i pipistrelli son grossi quanto le galline; e sì comuni, che talvolta ne ho veduta l'aria offuscata. Il loro grido è spaventevole. *Viaggio di Madagascar, di V. Paris. 1722. pag. 83. e 245.*

Quest' animale Americano è d' una specie diversa da quelle del can-volante, e del can-volante dal collo rosso, che tutti due si trovan solo nell' Africa, e nell' Asia meridionale. Il vampiro è più piccolo del can-volante dal collo rosso, il qual è anche più piccolo del can volante: il primo quando vola, sembra esser grosso, quanto un piccione: il secondo grande quanto un corvo: il terzo, quanto una gallina. Il can-volante, e il can-volante dal collo rosso hanno tutti e due la testa ben fatta, le orecchie corte, il muso ben rotondo, e pressappoco, come quello del cane. Il vampiro al contrario ha il muso più lungo, l' aspetto orrido, come il più brutto pipistrello, e la testa deforme, e sorpassata da grandi orecchie molto aperte, e molto ritte: ha il naso deforme, le narici a guisa d' imbuto, con una membrana al disopra, che si alza in forma di corno, e di cresta a punta, e che accresce assai la deformità della faccia. Perciò non vi è dubbio, che questa specie non sia affatto diversa da quella del can-volante, e del can-volante dal collo rosso. Il vampiro quanto è deforme, altrettanto è nocivo, inquieta l' uomo, tormenta, e distrugge gli animali. Noi non possiamo citare un testimonio più autentico, e più recente di quello del Sig. de la Condamine. „ I pipistrelli, ei
„ di-

„ dice (a) i quali succhiano il sangue de'
 „ cavalli, de' muli, ed anche degli uomi-
 „ ni; quando non se ne difendono, dor-
 „ mendo al covertò d' un padiglione, so-
 „ no un flagello comune alla maggior par-
 „ te dei paesi caldi dell' America: ve ne so-
 „ no dei mostruosi per la grossezza; essi
 „ hanno interamente distrutti a *Borja*, e
 „ in diverse altre parti il grosso bestiame,
 „ che i Missionarj vi avean introdotto, e
 „ che vi cominciava a moltiplicarsi. Que-
 „ sti fatti sono confermati da molti altri sto-
 „ rici, e Viaggiatori. Pietro Martire (b) che
 „ scrisse poco tempo dopo la conquista dell'
 „ America meridionale, dice, esservi nelle
 „ terre dell' istmo di Darien dei pipistrelli,
 „ che succhiano il sangue degli uomini, e
 „ degli animali, mentre dormono, fino a dis-
 „ seccarli, e finanche a farli morire; Jumil-
 „ la

(a) Vedi Viaggio della Riviera delle Ama-
 zoni, di Mr. la Condamine. Parigi 1745.
 pag. 171.

(b) In Darien: nova orbis regione Hispani no-
 ctu vespertilionum morsibus torquebantur, quae
 si dormientem forte mormorderint quempiam,
 exhausto sanguine rrahunt in vitæ disetimen,
 & mortuos fuisse nonnullos ex catate comper-
 tum est. Petrus Martyr, Oceani decadio
 scriptæ lib. vi.

la (a) ci assicura della medesima cosa, come anche D. Giorgio Juan, e D. Antonio de

(a) I pipistrelli nell' America meridionale sono ancora un flagello sì crudele, e sì funesto, che per crederlo bisogna averlo provato: ve ne sono di due sorte, alcuni sono grossi, come quelli, che vediamo nella Spagna; altri sono sì grossi, che hanno tre quarti di braccio di lunghezza dall' estremità d' un' ala all' altra. Ambedue sono industriosissime sanguisughe, che girano tutta la notte per bere il sangue degli uomini, e delle bestie; se quelli, che dal proprio stato sono costretti a dormire per terra, non hanno il pensiero di coprirsi dai piedi sino alla testa (la qual cosa è estremamente incomoda in paesi così caldi) devono aspettarli di essere beccati dai pipistrelli. Riguardo poi a quei, che dormono nelle case sotto i *mosquiteros*, quando non avessero, che la fronte scoperta, sono infallibilmente morsi, e se per mala fortuna questi uccelli pungono una vena, passano dalle braccia del sonno in quelle della morte, a cagione della quantità di sangue, che perdono senz' accorgersi, tanto è sottile la loro puntura; oltre di che sbattendo l' aria colle loro ali, rinfrescano quel dormiente, a cui hanno disegnato di togliere la vita. *Histoire Naturelle de l' Ore-*

de Ulloa (a). Paragonando insieme queste testimonianze, sembra che la specie de' pipistrelli, che succhiano il sangue, sia numerosa, e comunissima in tutta l'America meridionale, pure fin ad ora non c'è riuscito d'averne uno di questi individui; ma si può vedere presso Seba la figura, e la descrizione di quest' animale, il cui naso è sì straordinario, che io resto maravigliatissimo, che i Viaggiatori non l'abbiano notato, e che non sieno accorti di questa deformità, che ferisce gli occhi, e di cui tuttavia non hanno fatta menzione alcuna. Pertanto si potrebbe dire, che quello strano animale, di cui Seba ci ha data la figura non sia quello, che noi qui indichiamo col nome di vampiro, cioè a dire quello, che succhia il sangue; si potrebbe anche dire, che la detta figura di Seba sia in-

noque, par le Pere Jumilla, traduite de l'espagnol, par M. Eidous. Avignon 1758. Tom. III. pag. 100.

- (a) I pipistrelli sono comuni in Cartagena: essi ammazzano molto destramente gli abitanti, cavandogli tanto sangue, che rimangono inievoliti all'estremo. *Extrait de la Relation historique du voyage de l'Amérique meridionale, de D. Giorgio Juan, & D. Antonio de Ulloa, &c. Biblioteca ragionata Tom. XLIV. pag. 409.*

infedele , o caricata ; e finalmente potrebbe dirsi , che questo naso deforme sia una mostruosità , o una varietà accidentale ; benchè vi sieno esempj di siffatte costanti deformità in alcune altre specie di pipistrelli : il tempo rischiarerà questa oscurità , e toglierà le nostre incertezze .

Per ciò che riguarda il can-volante , e il can-volante dal collo-rosso , sono tutti due nel Gabinetto del Re , e vi sono stati portati dall' isola di Borbone ; queste due specie non si trovano , che nell' antico continente , o non sono almeno così numerosi nell' Africa , o nell' Asia , com' è quella del vampiro nell' America . Questi animali sono più grandi , più forti , e forse più maligni del vampiro ; e a forza scoperta , tanto a chiaro giorno , come di notte fanno una desolazione ; ammazzano i volatili , e i piccioli animali , ed anche si gettano sopra gli uomini , gl' insultano , gli feriscono nel viso con morsi crudeli ; e niuno de' Viaggiatori dice , che succhiano il sangue degli uomini , e degli animali addormentati .

Gli Antichi avevano una cognizione imperfetta di questi quadrupedi alati , che sono una specie di moltri ; ed è verisimile , che da questi bizzarri modelli della Natura abbiano formato nella loro immaginazione il ritratto delle arpie ; le ali , i denti , gli artigli , la crudeltà , la voracità , la suc-
ci-

cidezza ; tutti gli attributi deformi , tutte le facoltà nocive delle arpie convengono affai bene ai cani-volanti . Sembra che gli abbia indicati Erodoto (a) quando dice , che vi erano alcuni grossi pipistrelli , che molto disturbavano gli uomini , che andavano a raccogliere la cassia intorno alle paludi dell' Asia , che eran costretti a ricoprirsì il corpo , ed il viso di cuojo per difendersi dai loro morsi perniciosi . Strabone (b) parla di tre grandi pipistrelli nella Mesopotamia , la cui carne è buona a mangiarsi . Tra i moderni Alberto , Isidoro , Scaligero han fatta menzione , ma in termini incerti , di questi gran pipistrelli . Linscot ,

Ni-

(a) *Herodot. Lib. III. Nofa.* E' cosa singolare , che Plinio il quale ci ha tramandati come veri tanti fatti apocrifi , e insieme maravigliosi , accusa quel Erodoto di menzogna , e dice che questo fatto dei pipistrelli , che si gettano addosso agli uomini , non è che un racconto della vecchia , e favolosa antichità .

(b) *In Mesopotamia inter Euphratis convesationes , est maxima vespertilionum multitudo , qui longe majores sunt , quam in ceteris locis . Capiuntur , & in esum conduntur.* Strabo Lib. XVI.

Nicola Mathias (a), Francesco Pyrrard (b) ne han parlato con maggior precisione: e Oligier Jacobeus (c) ne ha data una breve descrizione con la figura; finalmente si trovano descrizioni, e figure ben fatte presso Seba, ed Edward, le quali s' accordano colle nostre.

I ca-

(a) Nicola Mathias nel suo viaggio, impresso a Visurgbourg in lingua Svezzeze dice pag. 123. che questi grandi pipistrelli volano la notte in truppa, che beono del sugo di palme in quantità sì grande, che s' ubbriacano, e cadono come morti ai piedi delle piante; ch' egli stesso ne aveva preso uno in questo stato, e che avendolo con de' chiodi appicato al muro, esso rodeva i chiodi, e li faceva rotondi coi denti, come se gli avesse limati; dice ancora, che il suo muso affomigliava a quello d'una volpe.

(b) Si vedono nell' Isola di S. Lorenzo, e nelle Maldive, dei pipistrelli più grossi de' corvi. *Vaggio di Pyrrard. Parigi 1619. Tom. I. pag. 38. e 132.* ... I pipistrelli volano a giorno chiaro nel Malabar, sono grossi come gatti, e si mangiano senz' al una ripugnanza. *Estratto della Relazione delle Missioni del Tranguebar. Biblioteca ragionata. Tom. XXXII. pag. 194.*

(c) Vi sono due di questi pipistrelli nel *Museum*

I cani-volanti sono animali carnivori, divoratori, e che mangian di tutto; perchè quando gli manca la carne, o il pesce, si nutrifcano di vegetabili, e di frutti di tutte le specie (a). Beono il sugo delle palme, ed è facile di ubbriacarli, e prenderli; mettendo all'ingresso delle loro tane vasi pieni d'acqua di palma, o di qualche altro liquore fermentato: essi s'attaccano, e si sospendono agli alberi colle unghie; vanno ordinariamente in truppa, e più la notte che il giorno; sfuggono i

luo-

seum regium Hoffma 1966. pag. 12. Tab. 5. fig. 3. Egli dice, che ciascuno di essi era grande, quanto un grosso corvo: ch' erano lunghi un piede dalla testa in giù, e che il membro genitale aveva due pollici di lunghezza: e aggiugne dopo *Linscot*, che gl' Indiani li mangiano, e li trovano buoni, come le pernici.

(a) Nelle Isole Manille si vede sugli alberi un' infinità di grossi pipistrelli, che pendono appiccati l'un coll' altro agli alberi, che intraprendono il volo sul principio della notte per andare in cerca di nutrirsi ne' boschi molto lontani: essi volano alcune volte in sì gran numero, e sì uniti, che offuscano l'aria colle loro grande ali, che hanno talvolta sei palmi di estensione: fanno distinguere nella densità de' boschi gli al-

luoghi troppo frequentati, e dimorano nei deserti, e particolarmente nelle Isole disabitate. Sono portati al coito con ardore; il sesso nel maschio è tutto visibile; la verga non è involta in una guaina, come quella de' quadrupedi, ma è fuori del corpo, quasi come quella dell' uomo e della scimia (a), il sesso pure delle femmine è visibile, come quello del maschio; hanno due sole mammelle sul petto, e producono in poco numero, ma più d'una volta l'anno. La carne di questi animali, soprattutto quando sono giovani, non è cattiva a mangiarsi; agl' Indiani la piace assai,

alberi, che hanno i frutti maturi; li divorano per tutta la notte con un romore, che si fa sentire lungi ben due miglia, e verso il giorno tornano ai loro ritiri. Gl' Indiani, che si veggono mangiare i migliori frutti da questi animali, gli fanno guerra, e non solo per vendicarsi, ma per nutrirsi della loro carne, in cui pretendono di trovare il gusto del coniglio. *Historia generale dei Viaggi del Sig. Abate Prevost, Tom. X. pag. 389.*

(a) *In hoc animali uterque sexus dignoscebatur: nam eorum aliquot, qui mihi conspecti sunt, satis longum, exertumque penem habebant, qualis fere simiarum est. Carol. Cluth; Exercit. Raphelingiae 1605. Tom. II. pag. 94.*

sai, e la paragonano al gusto della pernice, o del coniglio.

I Viaggiatori dell' America dicono concordemente, che i grossi pipistrelli di questo continente succhiano il sangue degli uomini, e degli animali, mentre dormono, senza destarli. Quei dell' Asia, e dell' Africa, che fanno menzione del can-volante, e del can-volante dal collo rosso, non parlano di questo fatto particolare; ciò nondimeno il loro silenzio non è una prova adeguata, essendovi particolarmente tanta conformità, e tanta somiglianza tra i cani-volanti, e questi grandi pipistrelli; che abbiamo chiamati *vampiri*; noi dunque abbiam creduto di dover esaminare, come sia possibile, che questi animali possano succhiare il sangue, senza cagionare nel tempo stesso un dolore almeno capace di svegliare una persona addormentata. Se incidono la carne co' i denti, che sono fortissimi e grossi, come quelli degli altri quadrupedi della loro statura, l' uomo sepolto nel più profondo sonno, e gli animali particolarmente, che hanno il sonno più leggiero dell' uomo, sarebbero risvegliati dal dolore di siffatto morso: accaderebbe lo stesso se ferissero colle unghie; dunque solo colla lingua possono fare aperture tanto sottili nella pelle, da poterne cavare il sangue, e aprire le vene, senza cagionare un vivo dolore. Noi non siamo stati a por-

tata

tata di vedere la lingua del vampiro; ma quella de' cani-volanti, che il Sig. Daubenton ha esaminata con diligenza, sembra indicare la possibilità del fatto: questa lingua è acuta, e armata di papille dure, finissime, acutissime, e rivolte all'indietro: siffatte punte finissime possono insinuarsi nei pori della pelle, allargarli, e penetrarli tanto avanti, che il sangue obbedisca, al succhiare continuo della lingua. Ma basti questo raziocinio sopra un fatto, di cui non sappiamo bene tutte le circostanze, e alcune delle quali forse sono esaggerate, o non ben riferite da quegli Scrittori, che ce l'hanno trasmesso.



male d'una specie particolare, che si accosta solamente per alcuni caratteri alle specie dello scojattolo, del ghio, e del ratto; è simile allo scojattolo solo per la grossezza degli occhi, e per la forma della coda, la quale ciò non ostante non è nè così lunga, nè fornita di sì lunghi peli: s'accosta più al ghio, per la figura del corpo, per quella delle orecchie, che sono corte e nude, e pe' peli della coda, che sono della medesima forma, e della medesima grandezza di quei del ghio; ma non è come questo, soggetto allo stramortimento per l'

Tom.X.

M

azio-

Flying Squirrel. *Transact. Philos. ann.* 1733. pag. 35.

Eureuil volant. Catesby, *Historia Naturale de la Caroline*, Tom. II. pag. 76. 77.

Sciurus volans. Seba, *Vol. I.* pag. 67. Tab. 41. fig. 3.

Sciurus hypocondrii prolaxis volitans. Linn. *Syst. nat.* edit. 1v. pag. 67. Edit. vi. pag. 9. Edit. x. pag. 64.

Sciurus obscure cinereus, aut rufescens, cute ab anticis cruribus ad postica, membrana in modum extensa, volans . . . Sciurus volans.

Lo scojattolo volante. Brisson, *Regn. animal.* pag. 157.

The Flying Squirrel, Edwards *Hist. of Birds part. IV.* pag. 191., ove se ne vede una figura molto ben fatta.

azione del freddo. La polatuca non è dunque nè scojattolo, nè ratto, nè ghio, sebbene partecipi un poco della natura di tutti tre.

Il Sig. Klein è il primo, che abbia data una descrizione esatta di quest'animale nelle Transazioni Filosofiche an. 1739. Era ciò non ostante conosciuto molto prima; si trova parimenti nelle parti settentrionali dell'antico, e del nuovo Mondo (a), è soltanto

(a) Gli Huroni del Canadà hanno tre sorte di scojattoli I più stimati sono gli scojattoli volanti, chiamati *Sabouesquanta*, che sono di colore cinericcio, hanno la testa un poco grossa, e sono coverti d'una pelle, che prende da due parti d'una zampa di dietro a quella d'avanti, che essi stendono per volare Producono tre, o quattro feti ec. *Viaggio del paese degli Uroni*, di *Sagard Theodat*, pag. 305. & 306. . . . Si trova un altro piccolo animale, che gl' Indiani della Virginia chiamano *Affamick*, e gl' Inglesi *Esfourien-volant*, il quale allargando le gambe, e stendendo la pelle, come se fossero ali, vola per ogni volta trenta o quaranta pertiche lunghe dieci piedi. *Historia del nuovo Mondo di Gio: de Laet*, Leyde 1640. lib. III. pag. 88. . . . Gli scojattoli volanti sono della grossezza d'un

tanto più comune in America, che in Europa, dove non si trova che di rado, ed in alcune provincie del Nord, come nella Lituania, e nella Ruffia. Questo piccolo animale abita sugli alberi, come lo scojattolo, va di ramo in ramo, e quando salta per passare da un albero all'altro, e per trapassare uno spazio considerabile, la sua pelle, ch'è molle, e piegata su i lati del corpo, si tira al di fuori, si stende e si allarga in una direzione contraria alle zampe d'avanti, che si stendono innanzi, e a quelle di dietro, che si stendono all'indietro nel moto del saltare. La pelle così tesa, e tirata al di fuori più d'un pollice, accresce altrettanto la superficie del corpo, senza accrescerne la massa, e per conseguenza ritarda l'accelerazione della caduta,

M. 2. in

ratto grosso, e di colore bianco grigio: questi sono tali dormendo, come gli altri vegliando: si chiamano *volanti*, perchè volano da un albero all'altro per mezzo d'una certa pelle, che si stende in forma d'ale, quando fanno questi piccoli voli. *Viaggio della Hontan. Tom. II. pag. 42.* Gli scojattoli volanti vengono dal Nord dell'America, ma da poco tempo in quà se ne sono trovati in Polonia. *Leggasi Edward Ist. nat. degli uccelli, pag. 191., e Gatesby, Ist. nat. della Carolina Tom. II. pag. 76.*
 C. 77.

in maniera che in un salto solo l'animale arriva ad una distanza assai grande: dunque questo moto non è un volo, come quello degli uccelli, nè un volteggiare, come fanno i pipittrelli, i quali due moti si fanno battendo l'aria per mezzo di reiterate vibrazioni: questo è un semplice salto, che tutto dipende dal primo impulso, il cui moto solamente viene prolungato, e sussiste più lungo tempo, perchè il corpo dell'animale, opponendo all'aria una superficie maggiore, prova una resistenza anche maggiore, e cade più lentamente. Si può vedere la descrizione della meccanica e del giuoco di questa singolare distensione della pelle (a), ch'è propria della sola polatuca, e che non si trova in alcun' altro animale: basterebbe dunque questo solo carattere per distinguerlo da tutti gli altri scojattoli, ratti, o ghiri; ma le stesse cose più singolari della Natura sono elleno mai uniche? Si dovrebbe usare attenzione per rinvenire nel medesimo genere un altro animale dotato d'una pelle simile, che prolungata si distenda non solo da una gamba all'altra, ma fino dalla testa alla coda. Quest'animale, di cui Seba ci ha data la figura, e la descrizione (b) sotto il nome di

sco-

(a) Nella descrizione della Polatuca, che ne dà il Sig. Daubenton.

(b) Seba, Vol. 1. pag. 72. tab. 44. fig. n. 3.

scotatolo volante della Virginia, sembra abbastanza differente dalla polatuca, per costituirne un' altra specie; ciò non ostante noi non ci affretteremo a pronunziar sentenza sopra la sua natura; è probabile, che questo sia un animale di una specie, che realmente esista, e differente da quella della polatuca: ma potrebbe anch' esser una semplice varietà nella stessa specie: e finalmente può essere, che altro non sia, che una produzione accidentale, ovvero una mostruosità, giacchè niun Viaggiatore, o Naturalista ha fatta menzione di quest' animale: Seba è il solo, che l' ha veduto nel Gabinetto di *Vincent*, e io non mi fido mai di queste descrizioni fatte nei Gabinetti sopra animali, a cui spesso l' arte dona qualche singolarità, per renderli più straordinarij.

Noi abbiamo veduta, e lungo tempo osservata la polatuca viva; ella è stata ben indicata dai Viaggiatori: Sagard (a), Theodat, Giovanni de Laet (b), Fernandez (c), la Hon-

M 3

tan

(a) *Viaggio al paese degli Uroni*, di Sagard Theodat. pag. 305.

(b) *Historia del nuovo Mondo*, di Gio: de Laet, pag. 88.

(c) *Quimichpatim*, seu mus volans fusco pile, nigroque promiscue tigitur, qui prope brachia, & crura est proluxior, ac parvarum alarum forma. . . . Est autem ceteris minor, parvo,

tan (a), Denys (b), tutti ne han fatta Du-menzione; ed i Signori Catesby (c), mont (d), il Page de Pratz (e), e i Signori Klein, Seba, ed Edward ne han da-
te

☉ *murino capite, magnis auriculis* ☉. Fer-
nand. *Hist. Nov. Hisp. pag. 9.* Nota. Che
questo Autore si è ingannato, dicendo,
che i peli lunghi fanno in questo animale
le veci delle ale; quando che questi sono
in realtà, che prolungamenti della pelle.

(d) Viaggio della Hontan, Tom. II. pag. 42.

(e) Gli scoiattoli volanti hanno il pelo un
poco più nero di que' della Francia; han-
no le ale, che prendono dalla zampa di
dietro fino a quella davanti, le quali si
aprono per una larghezza di due grosse di-
ta: questa è una piccola tela molto sottile,
coperta al di sopra d'un piccol pelo, o sia
lanugine: tutto il suo volo si può stendere
a trenta o quaranta passi, ma se volano
da un albero all' altro, voleranno bene il
doppio. *Descrizione Geografica dell' America
settentrionale, Denys. Parigi 1672. Tom.
II. pag. 331., ☉ 332.*

(f) Catesby, *Istoria nat. della Carolina* p. 76.

(g) Gli scoiattoli sono molto comuni nellà
Lunigiana, dove ne distinguono due sorte;
alcuni sono affatto simili a quei di Fran-
cia, altri sono d'un colore un poco più
cinericcio, ed hanno alle due zampe da-
van-

te delle buone descrizioni con la figura. Ciò che abbiamo osservato noi stessi sopra quest' animale, perfettamente s'accorda con quello, ch' essi ne dicono; comunemente è più piccolo dello scojattolo; quello che noi abbiamo veduto, non pesa più di due onces, cioè a dire, quanto un pipistrello della specie mezzana, e lo scojattolo pesa otto, o nove onces. Ve ne sono però dei più grandi; e noi abbiamo una pelle di polatuca, che non può essere, che di un animale più grande della polatuca ordinaria. La polatuca s'assomiglia in qualche maniera al pipistrello in questa distensione del-

M 4 la

vanti una specie di pelle, o di membrana, per mezzo di cui possono slanciarsi da un albero a un altro, per una distanza non piccola, ec. *Memorie sulla Lunigiana di Dumont pag. 81. & 82.*

- (a) Gli scojattoli volanti sono così chiamati, perchè saltano da un albero all' altro in distanza di venticinque, o trenta piedi e più: il loro pelo è di color cinericcio oscuro; quest' animale è grande quanto un ratto, le zampe di dietro sono unite con quelle davanti per mezzo di due membrane, che lo sostengono per aria, quando salta; di modo che sembra volare, ma va sempre abbassandosi. *Historia della Lunigiana di Mr. le Page du Pratz. Tom. II. pag. 98.*

la pelle, che nel salto unisce le gambe davanti a quelle di dietro, e delle quali si serve per sostenersi in aria: pare ancora, che a lui si rassomigli nell' indole naturale, perchè è tranquilla, e per così dire addormentata tutto il giorno; nè mostra attività, che verso la sera. Si rende facilissimamente domestica, ma è ancora nel medesimo tempo soggetta a fuggirsene, e bisogna custodirla in una gabbia, o legarla con una piccola catena; si nutrice di pane, di frutti, e di semi; ama soprattutto i bottoni de' fiori, e i giovani rampolli del pino, e della bietola; non cerca le noci, e le mandorle, come fanno gli scoiattoli; si fa un letto di foglie, in cui si seppelisce, e vi dimora tutto il giorno, e non ne esce, che la notte, e quando è stimolata dalla fame. Siccome ha poca vivacità, così diviene facilmente la preda delle martore, e degli altri animali, che s'arrampicano su' pegli alberi; perciò la specie sussiste in piccolissimo numero, benchè ordinariamente partorisca tre, o quattro feti per volta.

 IL PETIT-GRIS (a).

Quest' animale che qui chiamamo *petit-gris* si trova nelle parti settentrionale d' ambedue i continenti: egli s' assomiglia molto allo scojattolo, e nell' esterno non è da quello differente, che pe' seguenti caratteri: non ha il pelo rosso, ma bensì d' un color grigio più o men carico; le orecchie sono nude, laddove lo scojattolo le ha ricoperte di peli fino all' estremità. Essendo costanti queste differenze, sembrano sufficienti per costituire una specie particolare, alla quale noi abbiamo ritenuto il nome di *petit-gris*, perchè sotto questa medesimo nome è conosciuta la pelliccia di quest' animale. Molti autori pretendono, che questi animali d' Europa sieno diversi da quei d' America, e che quei d'

M. 5

Eu-

(a) *Piccol grigio*, nome che noi abbiamo dato a quest' animale, che chiamasi *Scojattolo grigio*, *grande Scojattolo grigio*, *Scojattolo del Canada*, *Scojattolo della Virginia*. *Sciurus Virginianus cinereus major*. R. & Y. Hist. naturelle de la Caroline. Tom. II. pag. 74. *Sciurus cinereus, aurulentus ex alba strigatus*. *Sciurus Virginianus*. L. scojattolo della Virginia: Brissón, Règ. animat. pag. 153.

Europa sieno scojattoli della specie comune, la quale, secondo la stagione, cangia solamente di colore nel clima del Nord di Francia. Senza voler assolutamente negare quell'ultimo fatto, benchè non ci sembri bastantemente comprovato, noi riguardiamo il *petit-gris* d'Europa, e quello d'America, come il medesimo animale, e come una specie distinta, e separata da quella dello scojattolo comune; perchè si trovano i nostri scojattoli nell'America settentrionale, e nel Nord dell'Europa, e vi sono della medesima grossezza, e del medesimo colore, cioè a dire d'un rosso, o rosseggiante più o men vivo, secondo la temperie del paese; e nel medesimo tempo vi si veggono altri scojattoli, che sono più grandi, e che hanno il pelo grigio; o nericcio in tutte le stagioni. In oltre la pelliccia di questi animali è molto più fina, e più delicata di quella de' nostri scojattoli; perciò noi crediamo di poter assicurare, ch'essendo costanti le differenze di questi animali, le specie sebbene assai prossime, non si fiano mai frammischiate, e ciascuna per conseguenza debba avere il suo nome. Il Sig. Regnard (a) afferma, che questi animali della Lapponia sono gli scojattoli di Francia; e ciò afferma con tanta sicurezza, che la sua

(a) Quelli *petit gris* sono quei, che si chiama-

testimonianza per se sola basterebbe, se non fosse contrastata da altri; ma il Sig. Regnard, che ci ha dato opere eccellenti pe'l Teatro, non si è molto impegnato nella

M 6 Sto-

no in Francia *Ecureuils* (Scojartoli), i quali cangiano il loro color rosso, quando l'inverno, e le nevi gli fanno prendere un color grigio: quanto più s'accostano al Nord, tanto più essi sono grigi. I Lapponesi fanno a questi animali molta guerra nell'inverno, e i loro cani sono sì ben addestrati a questa caccia, che non ne passa uno, che non lo scoprano anche sugli alberi i più alti: e ne avvissavano col loro abbajare i Lapponesi, ch'erano in nostra compagnia. Noi ne ammazzammo alcuni a colpi di fucile, poichè i Lapponesi allora non avevano le loro frecce rotonde, colle quali gli uccidono, e noi avemmo il piacere di vederli scorticare con una velocità sorprendente. Cominciammo a fare la caccia a questi animali verso la festa di S. Michele, e tutt'i Lapponesi comunemente s'occupano in questo impiego: perciò quegli animali sono a buon mercato, e se ne dà un fagotto per uno scudo: questo fagotto è composto di quaranta pelli d'essi. Ma non v'è mercanzia più soggetta all'inganno, con e quella del *petit-gris*, e degli armellini: perchè voi acquistare la mercanzia senza vederla, e perchè la pelle è rav-

vol-

Storia Naturale, nè ha dimorato lungo tempo in Lapponia per vedere co' propri occhi gli scojattoli cangiar di colore. E' vero, che alcuni Naturalisti, fra' quali il Sig. Linneo, hanno scritto, che nel Nord

volta in maniera, che il pelo resta tutto al dentro. Non si fa alcuna distinzione, tutte le pelli si vendono al medesimo prezzo, e bisogna prendere sì le cattive, come le belle, nè queste costano più di quelle. Ci fu detta da' nostri Lapponesi una particolarità sorprendente intorno a questi animali, e la quale è stata confermata dalla nostra stessa esperienza: non s' incontrano sempre questi animali nella medesima quantità, cangiano spesso paese: e non se ne troverà nemmeno uno in tutto l'inverno, dove nell'anno precedente ne saranno stati trovati a migliaja. Questi animali mutano abitudine: e quando vogliono andare in altra parte, e fa loro duopo passare qualche lago, o qualche fiume che s' incontrano ad ogni passo nella Lapponia, questi piccoli animali pigliano una scorza di pino, o di bietola, che tirano alla riva dell'acque, si sopra di cui si pongono, e si abbandonano all'arbitrio del vento, alzano le loro code in forma di vele, finchè il vento crescendo in vigore, e alzandosi le onde, rovescia pel tempo stesso e 'l vascello, e 'l pilota. Questo naufragio, che spesso è di

tre

il pelo dello scojattolo si cangia di colore nell' inverno (a). Questo può esser vero, perchè le lepri, i lupi, le donnole mutano parimente di colore in questo clima; ma, siffatta mutazione succede dal fulvo, o dal rosso al bianco, e non già dal fulvo, o dal rosso nel grigio cinericcio: e per parlare soltanto dello scojattolo, il Sig. Linneo nel suo libro intitolato *Fauna Suecica*, dice *æstate ruber, hyeme incanus*: egli dunque

tre, o quattro mila vele, arricchisce ordinariamente alcuni Lapponesi, che trovano questi avanzi sulle rive, e se ne servono pe' loro usi ordinarij, purchè questi piccoli animali non sieno stati troppo lungo tempo sull' arena. Ve ne sono molti ancora, che fanno una felice navigazione, e che arrivano a buon porto, quando il vento sia stato favorevole, e non sieno nate tempeste nell' acqua, la quale non è necessario, che sia molto violenta per inghiottire tutti questi piccoli bastimenti. Questa particolarità potrebbe passare per una favola, se io non la sapessi per propria esperienza. *Oeuvres de M. Regnard. Paris 1742. Tom. I. pag. 163.*

- (a) *Sciurus vulgaris* *habitat in arboribus frequens, æstate ruber, hyeme incanus.*
Fauna Suecica. Stockholm 1746. pag. 9. ...
Sciurus vulgaris . . . *Æstate ruber, hyeme cinereus.* *Syst. nat. edit. X. pag. 63.*

que cangia di rosso in bianco, o piuttosto di rosso in bianchiccio; e noi non crediamo, che abbia avute forti ragioni per sostituire, come ha fatto alla parola *incanus*, quella di *cinereus*, che si legge nella sua ultima edizione del *Systema natura*: al contrario il Sig. Klein (a) assicura, che gli scojattoli intorno a Danzica sono rossi nell'inverno, egualmente che nell'estate, e che in Polonia comunemente ve ne sono de' grigi, e nericci, che come i rossi non mutano mai colore; questi scojattoli grigi, e nericci si trovano nel Canada (b), e in tutte le parti settentrionali dell'America: onde noi stimiamo di poter asserire con fondamento, che il *petit-gris*, o se si vuole, lo scojattolo grigio, sia un animale comune ai due continenti, e sia una specie diversa da quella dello scojattolo ordinario.

Di

(a) *Sciurus vulgaris rubicundus* *Nostrates tam in sylvis, quam in caveis vulgares, & hyeme, & aestate rubre . . . in Polonia utique vulgares cinerei non mutantem pellem . . . haud rari quoque vulgares nigricantes*. Klein, de quadrup. pag. 53. In Ukraina inter sciuros coloris rufi, nigricantes spectantur. Rzaczynski, auct. Hist. nat. Polon. pag. 321.

(b) Gli scojattoli della Virginia molto s'accostano nella grandezza ai nostri conigli; sono neri, o misti di nero, e di bianco: però la maggior parte sono nericci. *Descrizioni dell'Indie occidentali di Gio: de Luet* p. 88.

Di più noi non vediamo, che gli scojattoli, i quali sono assai numerosi nelle nostre foreste, si uniscano in truppe, nè vegghiamo, che viaggino in compagnia, che s'accollino alle acque, o che s'azzardino di traversate i fiumi sopra scorze d'alberi: sono dunque diversi dai *petit-gris* non solo per la grandezza, e pel colore, ma ancora per le inclinazioni naturali; perciocchè sebbene queste navigazioni di tai animali pajano poco credibili, esse però sono confermate da un sì gran numero di testimoni, che (a) noi non le possiamo negare.

Del

La più fina pellicceria del Paese degl'Irochesi è la pelle degli scojattoli neri. Quest'animale è grosso come un gatto di tre mesi, è molto vivace, e docile, e facile a renderli domestico. Gl'Irochesi ne fanno delle vesti, che vendono fino al prezzo di sette, o otto doppie. *Istoria della nuova Francia del P. Charlevoix, Parigi 1744. T. I. pag. 273.*

(a) *Rei veritati nititur, quod Gesnerus ex Vincensio Beluacensi, & Oïao M. refert: sciuros, quando aquam transire cupiunt, lignum levissimum aqua imponere, eique insidentes, & cauda, non tamen ut vult, erecta, sed continuo mota, velificantes, neque flante vento, sed tranquillo aequore transibis, quod fide dignus, fidusque meus emissarius ad insulas* Cot.

Del resto fra tutti gli animali quadrupedi non domestici, lo scojattolo è forse il più soggetto alle varietà, o almeno è quello, che ha più specie d'animali prossime alla sua. Lo scojattolo bianco della Siberia (a) altro non sembra, che una varietà del nostro scojattolo comune. Lo scojattolo nero (b), e lo scojattolo grigio carico (c), tutti e due dell' America, forse sono anch'essi varietà della specie del nostro *petit-gris*. Lo scojattolo di Barberia, il Palmita, e lo scojattolo Svizzero, de' quali noi parleremo nell' articolo seguente, sono tre specie molto vicine. Vi sono pochi altri fatti

Gosblandia plus simplici vice observavit, & cum spoliis in littoribus ibidem collectis redux, mirabundus mihi retulit: Dissertatio de Sciuro volante. Transact. Anglic. n. 427. pag. 38. Klein, de quadr. pag. 52. Cor- sice interdum sciurus navigat. Linn. Syst. nat. edit. X. pag. 63.

(b) *Sciurus albus Sibericus*. Lo scojattolo bianco della Siberia, Brisson. *Regn. animal.* pag. 151.

(c) *Sciurus Mexicanus*. Hernandez. *Hist. Mex.* pag. 582. *Sciurus niger*. Lo scojattolo nero. Brisson, *Regn. animal.* pag. 151.

(d) Lo scojattolo nero. Seba. *Vol. I. pag. 78. pl. XLVIII. fig. 3.* ... *Sciurus obscurus cinereus*. ... *Sciurus Americanus*. Lo scojattolo d' America. Brisson. *Regn. animal.* p. 152.

risguardanti la storia de' *petit-gris*. Fernandes (a) dice, che lo scojattolo grigio, o nericcio d'America sta ordinariamente sopra gli alberi, e particolarmente sopra i pini, che si nutrice di frutti, e di semi, che ne fa la provvisione per l'inverno, che li depone nelle cavità di qualche albero, dove si ritira anch' egli per passarvi la cattiva stagione, e che ivi pure genera i suoi figli. Queste inclinazioni del detto animale sono anch' esse differenti da quelle dello scojattolo, il quale si fabbrica un nido sopra gli alberi, come fanno gli uccelli: ciò non ostante noi non pretendiamo di affermare assolutamente, che questo scojattolo nericcio di Fernandes sia il medesimo, che lo scojattolo grigio della Virginia, e che tutti e due parimente sieno i medesimi, che il *petit-gris* del Nord dell' Europa: noi il diciamo solamente, come una cosa, che ci sembra esser verisimile, perchè questi tre animali sono pressappoco della medesima grandezza, del medesimo colore, del medesimo clima freddo, perchè sono precisamente della stessa forma, e perchè egualmente s'impiegano le loro pelli nelle pellicce, che si chiamano *petit-gris*.

IL

(a) Francis Fernandez. *Hist. animal. nov. orbis cap. 8.*

IL PALMISTA (a).

IL BARBARESCO (b).

E LO SVIZZERO (c).

IL palmista è della grossezza di un ratto, o d' un piccolo scojattolo : questi vive sotto le palme, onde ne trae il nome : alcuni lo chiamano *ratto-palmista*, altri *scojattolo delle palme*; ma siccome non è nè sco-

(a) Il *Palmista*. Ratto-palmista. Scojattolo delle palme).

Mustela Africana. Clusii, *Exotic.* pag. 112.

Mustela Lybica. Nieremberg. *Hist. nat. Antwerp.* 1635. pag. 172.

Sciurus colonis ex rufo, & nigro mixti, teniis in dorso flavicantibus. . . . *Sciurus palmarum vulgo*. Lo scojattolo palmista, volgarmente Ratto palmista. Brisson, *Regn. animal.* pag. 156.

(b) Il *BarbareSCO*, o Scojattolo di Barberia.

Sciurus Getulus. Cajus apud Gesnerum. *Hist. quadrup.* pag. 847. --- Gesner, *Icon. quadrup.* pag. 112.

Sciurus Getulus. Aldrov. *de quadrup. digit. vivip.* pag. 105. & 106.

Ge.

scojattolo, nè ratto, noi gli daremo il nome semplicemente di *palmista*. Egli ha la testa quasi della forma stessa del campagnuolo, ed è parimente vestita d'ispidi peli: non istrafcina la coda, come il ratto, ma la tiene dritta, e sollevata verticalmente, senza però ripiegarla sul corpo come fa lo scojattolo: questa è coverta d'un pelo più lungo di quello delle altre membra, ma assai più corto del pelo della coda del-

Getulus. *Sciurus fuscus*. *Striis quatuor albidis longitudinalibus*. Linn. *Syst. nat.* edit. x. pag. 64.

The Barbary Squirrel, Edwards of *Birds* p. 198. *Sciurus coloris ex rufo, & nigro mixti, tenuis in lateribus alternatim albis, & fuscis, aut nigris*. . . . *Sciurus Getulus*. *Ecoreuil de Barbarie*. Briffon, *Regn. animal.* pag. 157.

(c) Lo Scojattolo Svizzero, lo Scojattolo di terra. *Obiboïn* presso gli Huroni.

La seconda specie degli Scojattoli, che gli Huroni chiamano *Obiboïn*, e noi lo denominamo *Svizzero*, accagione della bellezza, e varietà del pelo, sono quegli, che sono vergati, e fasciati dinanzi, e di dietro da una lista, o striscia bianca, e d'una rossa-grigia, e nericcia ec. *Voyage du pays des Hurons, par Sagard Theodat*. Paris 1632. pages 305. & 306.

Scojattolo Svizzero. Gli Scojattoli Svizzeri
10.

dello scojattolo: ha quest'animale, sul mezzo del dorso lungo la spina dal collo fino alla coda, una litta bianchiccia; accompagnata da una parte, e dall'altra da una

sono piccoli animalletti come i ratti. Si chiamano *Svizzeri*, poichè il lor pelo è vergato, e sparso di macchie nere, e bianche, che rassomiglia a certi giupponi, che colà si lavorano. *Voyage de la Honan*, Tom. II. pag. 43.

Vi na una specie di Scojattoli nell' America settentrionale, che sono più piccoli de' nostri. Si appella *Svizzer* questo piccolo scojattolo, perchè è tinto dalla testa fino alla coda di macchie bianche, rosse, e nere tutte della lunghezza medesima della metà incirca del traverso d'un dito. *Descrizione dell' America settentrionale*, di Denys. Parigi, 1692. Tom. II. pag. 331. & 332.

Sciurus Listeri, Ray, *Synops. quadrup.* p. 216.
Scojattolo di terra. Catesby, *Hist. de la Caroline*, Tom. II. pag. 75.

Piccolo Scojattolo della Carolina, che si chiama anche *Scojattolo di terra*, perchè non dimora sugli alberi, come gli altri, ma scavati come i conigli nella terra il suo covile. Edwards, *Hist. degli uccelli*, pag. 181.

Sciurus rufus, tenuis in dorso nigris; tenuis ex albo flavicantibus intermixtis. . . . *Sciurus Carolinensis*. Scojattolo della Carolina. Brisson, *Regn. animal.* pag. 155.

fascia bruna, e poi da un' altra fascia bian-
chiccia. Questo segno così distinto, onde
può distinguerfi il palmista da tutti gli al-
tri animali, scorgesi quasi lo stesso nello sco-
jattolo Barburesco, e nello Svizzero; che fu
altresì denominato scojattolo di terra. Que-
sti tre animali si rassomigliano per tanti
caratteri, che Mr. Ray (a) pensò, che forse
formassero una sola specie: ma se ri-
flettasi, che i due primi, cioè il palmista,
e lo scojattolo di Barberia, che noi chia-
mamo *Barburesco*, non si trovano, che nei
climi caldi dell' antico continente: e che
per lo contrario lo Svizzero, o sia lo sco-
jattolo Svizzero descritto da Lister, da Ca-
tesby (b), e da Edward (c) non si trova,
che ne' paesi freddi, e temperati del nuovo
Mondo, si giudicherà che sono di diversa
specie. E in fatti, osservandoli più dappres-
so, si vede che le liste brune, e bianche
del-

(a) *Sciurus Getulus* Cail, *mustela Africana* Clu-
sii, eadem nobis videtur . . . Descriptio mu-
stela Africanae cum sciuri Getuli descriptione
satis bene convenit, ut non dubitem id m
animal esse: huic similis est sciurus a clavis-
simo Dom. Lister observatus, & descriptus.
Ray, *Synops. quadrup.* pag. 216.

(b) Catesby, *Historia nat. della Carolina* Tom.
II. pag. 75.

(c) Edwards, *Istoria Nat. degli uccelli*. Lon-
don 1741. part. IV. pag. 181.

dello Svizzero sono disposte in diverso ordine da quelle del palmista; la lista bianca, che nel palmista si distende lungo la spina del dorso, è nera o bruna nello Svizzero: le liste bianche sono allato alla nera, come le nere sono allato alla bianca nel palmista: e inoltre non ci sono che tre liste bianche sopra il palmista, laddove ce ne son quattro sopra lo Svizzero; quegli ripiega la coda sul corpo; non così il palmista; questi non abita, che su gli alberi, e lo Svizzero ama di star a terra, onde fu chiamato *scojattolo di terra*; e finalmente è più piccolo del palmista: Onde non può dubitarsi, che non sieno due animali diversi.

Quanto al barbaresco, siccom' egli è del medesimo continente, clima, grossezza, e quasi della forma medesima del palmista, potrebbe qualcheduno credere; ch'entrambi sieno della medesima specie, e solo variino in essa. Tuttavia paragonando la descrizione, e la forma del barbaresco, o sia *scojattolo di Barberia*, pubblicato da Cajo (a), e copiata da Aldrovando (b), e da Jonston (c), colla descrizione, e colla figura, che

(a) *Sciurus. Getulus*. Caili apud Gesnerum, *Histor. quadrup.* pag. 847.

(b) Aldrov. *de quadrup. digit.* pag. 405.

(c) Jonst. *de quadrup.* pag. 113.

che noi qui porgiamo del palmista: e paragonando poi la figura, e la deteriorazione di questo medesimo scojattolo di Barberia fatta da Edward, vi si rileveranno differenze assai rimarchevoli, che bastantemente dichiarano, che sono animali diversi: conservansi entrambi nel Gabinetto del Re, come pure lo Svizzero. Il barbaresco ha la testa, e la fronte più inarcata, le orecchie più grandi, la coda vestita di peli più folti, e più lunghi di quegli del palmista: egli è più scojattolo, che ratto; laddove il palmista è più ratto, che scojattolo in quanto alla forma del corpo, e della testa. Il barbaresco ha quattro fasce bianche, e tre sole il palmista; la fascia bianca del mezzo è nel palmista sulla spina del dorso, laddove nel Barbaresco sulla medesima parte si trova una fascia nera mista di rosso, ec. Del rimanente questi animali hanno il naturale, e l'indole dello scojattolo comune; il palmista, e l'barbaresco vivon di frutta, come lo scojattolo, e servono de' piè davanti per prenderle, e portarle alla bocca: hanno la voce, il grido, l'istinto, e l'agilità stessa: sono vivacissimi, ed amorosissimi: si addimesticano assai facilmente, e tanto s'innamorano del loro soggiorno, che uscirne per ricrearsi, vi ritornano da se stessi, senza esservi chiamati, nè stimolati: sono entrambi di una graziosissima figura, il loro mantov vergato di bianco è più vago di quello
del

dello scojattolo: sono più piccoli di lui, più agili, e ne' movimenti anche più pronti. Il palmista, e 'l barbaresco tengonfi come lo scojattolo sugli alberi, ma lo Svizzero se ne sta a terra, e scavasi, come il topo campestre, un nido impenetrabile all'acqua; è pure men docile, e meno amoroso degli altri due: morde facilmente (a) se non è perfettamente addimesticato. Rassomiglia adunque più ai ratti, o ai topi campestri, che agli scojattoli nell'indole, e ne' costumi.



(a) Viaggio del paese degli Uroni, di Sagard
Theodat. *Paris*. 1632. pag. 306.

IL TAMANOIR (a).

IL TAMANDUA (b).

E

IL FORMICHIERE (c).

Nell' America Meridionale si trovano tre specie d'animali, che hanno il muso lungo, la bocca stretta, e senza denti, la lingua rotonda, e lunga, ch'essi insinuano nelle formicaje, le quali sono il loro principale nutrimento. Il primo di questi mangiatori di formiche, è quello,
Tom. IX. N che

(a) Il Tamanoir, il Formichiere tamanoir, il grosso mangiatore di Formiche. I Brasiliani chiamano quest' animale *Tamandua-guacu*; i Nativi della Guiana lo chiamano *Ovariri*. Il nome *Tamanoir*, che gli hanno dato i Francesi abitanti in America sembra derivare da *Tamandua*.

Tamandua-guacu, sive major. Pison., *Hist. Brasil.* pag. 320.

Tamandua guacu Brasiliensibus. Marcgrav. *Hist. nat. Brasil.* pag. 225.

Man-

che da' Brasiliani è chiamato *tamandua-guacu*, cioè a dire *gran tamandua*, e a cui i Francesi abitanti in America hanno dato il nome di *tamanoir*; è un animale lungo incirca quattro piedi, misurandolo dall'estremità del muso fino al principio della coda, la testa è lunga quattordici, o quindici pollici, il muso lunghissimo, la coda lunga due piedi e mezzo, coperta di peli ruvidi, e lunghi più d'un piede, il collo corto, la testa stretta, gli occhi piccoli, e neri, le orecchie rotonde, la lingua minuta, lunga più di due piedi, cui l'animale pie-

Mangia formiche, o volpe Americana, Voyages de Desmarchais. Tom. III. pag. 307.

Tamandua major cauda panniculata. Barrere, Hist. Franc. equin. pag. 162.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. Linn. Syst. nat. edit. iv. pag. 63. --- Myrmecophaga palmis tridactylis, plantis pentadactylis, edit. vi. pag. 8. ---

Tridactyla. Myrmecophaga palmis tridactylis, plantis pentadactylis, edit. x. pag. 35. Nota.

Che vi è un errore in tutte queste frasi, perchè quest' animale ha quattro dita, o piuttosto quattro unghie, e non già tre ai piedi davanti. Quest' errore proviene da Seba, come da prima origine; pare ancora, che il Sig. Linneo si sia rapportato alle imperfette descrizioni di quest' Autore, ed ha creduto, che gli animali, di cui

piega in bocca, quando la ritira tutta intera. Le sue gambe non sono alte, che un piede, quelle d'avanti sono un poco più alte, e sottili di quelle di dietro: i piedi son rotondi; quei davanti sono armati di quattro unghie, e quei di dietro ne hanno cinque. I peli della coda siccome anche quelli del corpo sono mescolati di nero, e di bianchiccio, e sono disposti sulla coda in forma di pennacchio: cui l'animale rivolta sul dorso, se ne cuopre tutto il corpo, quando vuol dormire, o difendersi dalla

N 2

piog-

cui Seba dà le figure (tavola XXXVII. n. 2., e tav. XL. n. 1. Vol. I.) fossero il *Tamandua guacu*; basti però consultare Marcgrave, Pison, Desmarchais ec. per assicurarsi del contrario.

Tamandua-guacu, idest *myrmecophaga ontium maxima*. Klein *de quadrup.* pag. 45. Tab. 5. fig. n. 1. Nota. Il Sig. Brisson con tutta ragione avverte, che questa figura data dal Sig. Klein è difettosa, perchè suppone la testa, il collo, e 'l muso dell'animale troppo lunghi, e perchè l'estremità del muso v'è troppo informe.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissimis pilis vestita *Myrmecophaga Tamanoir* dicta. Il formichiere Tamanoir. Brisson, *Regn. animal.* pag. 24.

(b) Il *Tamandua*, nome di quest'animale nel

pioggia, e dall'ardore del Sole: i lunghi peli della coda, e del corpo non sono già rotondi in tutta la loro estensione, ma sono bensì piatti all'estremità, e secchi al toccarli, come l'erba inaridita; l'animale agita frequentemente, e bruscamente la coda, quando è irritato, ma la lascia strascinare nel camminare, quando è tranquillo, e scopre le vie per dove passa. I peli delle parti anteriori del suo corpo sono men lunghi di quelli delle parti posteriori; questi sono rivolti all'indietro, e quelli per avanti. Egli ha più bianco sopra le parti anteriori, e più nero sulle posteriori: ed ha

nel Brasile, e che noi abbiamo adottato. *Tamandua i Brasiliensibus*. Pison, *Hist. Brasiliens.* pag. 321. --- Marcgrave, *Hist. nat. Brasiliens.* pag. 225.

Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. Linn. *Syst. nat.* edit. vi. pag. 10. *Tetradactylas. Myrmecophaga palmis tetradactylis, plantis pentadactylis*, edit. x. pag. 35.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda *Myrmecophaga*. Il formichiere. Brisson, *Regn. animal.* pag. 26.

(c) Il Formichiere, il più piccolo Formichiere, il piccolo mangiatore di formiche, animale Americano, che i nativi della Guiana chiamano *Ouatitiquagu*.

Ta.

ha pure una fascia nera sul petto, che si stende sopra le parti del corpo, e termina sul dorso vicino ai lombi; le gambe di dietro sono quasi nere, quelle d'avanti quasi bianche con una gran macchia nera verso il mezzo. Il tamanoir cammina così lentamente, che un uomo può facilmente giugnerlo quando corre: i suoi piedi sembran meno fatti per camminare, che per arrampicarsi, e per afferrare corpi rotondi; ond' egli afferra con una forza sì grande un ramo, un bastone, che non è possibile di toglierglielo.

N.° 3. 11

Tamandua minor flavescens. Barrere. *Hist. Franc. equin.* pag. 163.

Tamandua, seu *Coati Americana alba altera.* Seba Vol. I. pag. 60. Tab. 27. fig. n. 3.

Myrmecophaga manibus monodactylis, plantis tetradactylis. Linn. *Syst. nat.*, edit. 1v. pag. 63. Nota, che v'è un errore in questa frase, perchè quest'animale ha due dita, o piuttosto due unghie, e non già un sol dito, o una sola unghia ai piedi davanti: solamente il secondo, ch'è l'interno, è molto più piccolo del primo, ch'è l'esterno. Il Sig. Linneo avea probabilmente formata questa frase indicativa, come quella del Tamanoir, sopra le figure di Seba, il quale in fatti dice pag. 60. del suo *Tbesaurus*, che l'animale, di cui parliamo, ha un dito solo ai piedi davanti: questo Tesoro di Seba è un magazzino male ordinato, e
pie

Il secondo di questi animali è quello, che gli Amerigiani chiamano semplicemente *tamandua*; e a cui noi conserveremo questo nome: egli è assai più piccolo del *tamanoir*: è lungo soltanto diciotto pollici in circa dall' estremità del muso fino al principio della coda: la testa è lunga cinque pollici, il muso è lungo, e curvo al di sotto; ha la coda lunga dieci pollici, e nell' estremità spogliata di peli, le orecchie diritte, e lunghe un pollice: la lingua rotonda, lunga otto pollici, collocata in una specie di doccia, o di canale incavato al di dentro della mascella inferiore; le gambe non son alte, che quattro pollici; i piedi hanno la medesima forma, e l' medesimo numero di unghie, che quelli del *tamanoir*, cioè a dire, quattro unghie a quei d' avanti, e cinque a quei di dietro. S' arrampica, e af-

pieno di simili errori. Il Sig. Linneo lo ha conosciuto, e corregge questo nelle posteriori edizioni della sua opera. *Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradaactylis*. Linnæi *Syst. nat.* edit. vi. pag. 8., & edit. x. pag. 35.

Myrmecophaga rostris brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradaactylis. . . . *Myrmecophaga minima*: Il piccolo Formichiere. Brisson, *Regn. animal.* pag. 28.

The little ant-eater. Edwards *Gleanures*. London 1758. pag. 20.

afferra così bene, come il tamanoir, nè cammina molto meglio: non si cuopre colla sua coda, poichè non gli potrebbe servire di difesa, essendo in parte spogliata del pelo, il qual ancora è molto più corto di quello della coda del tamanoir: quando dorme, nasconde la testa sotto il collo, e sotto le gambe d'avanti.

Il terzo di questi animali è quello, che i Nazionali della Guinea chiamano *ouatirionau*. I Francesi gli danno il nome di *fourmiller*, o sia *formichiere* per distinguerlo dal tamanoir, e dal tamandua, poichè è lungo solamente sette pollici dall'estremità del muso sino al principio della coda; ha la testa lunga due pollici, il muso a proporzione molto men lungo di quello del tamanoir, e del tamandua: la coda lunga sette pollici, e ricurva al di sotto nell'estremità, che non è fornita di peli: la lingua è stretta, un poco piatta, e assai lunga: il collo è quasi nudo, la testa è assai grossa a proporzione del corpo; gli occhi son collocati a basso, e poco lontani dagli angoli della bocca, le orecchie sono piccole, e nascoste nel pelo: le gambe hanno solo tre pollici d'altezza; i piedi d'avanti non hanno, che due unghie, l'esteriore delle quali è ben più grossa, e più lunga dell'interiore; i piedi di dietro ne hanno quattro; il pelo del corpo è lungo circa nove linee, è molle a toccarsi, ed è

d'un color brillante , cioè d'un rosso mischiato di un giallo vivace : i piedi non son fatti per camminare , ma per arrampicare , e per afferrare ; sale sugli alberi , e si sospende ai rami per l'estremità della coda.

Noi non conosciamo in questo genere di animali altro , che le tre specie , che ora abbiain accennate. Il Sig. Briffon , dopo Seba , fa menzione d'una quarta specie , sotto il nome di *somichieri dalle orecchie lunghe* ; ma noi crediamo questa specie dubbia ; perchè nella enumerazione , che fa Seba degli animali di questo genere , ci sembra , che abbia detto più d'un errore . Ei dice espressamente : *noi conserviamo nel nostro Gabinetto sei specie di questi animali mangiatori di formiche* ; e poi non ne fa la descrizione , che di cinque , e fra questi cinque animali vi novera l'*ysquiepath* , o *muffetta* , ch'è un animale non solo d'una specie , ma anche d'un genere lontanissimo da quello de' mangiatori di formiche , poichè questo ha i denti (a) , e la lingua piatta , e corta come

(a) *Vapulavit aliquando optimus auctor de nominibus propriis , si ysquiepath , seu vulpeculam Mexicanam , tamandam dixit , pag. 66. Quasi aliquam omnino speciem , canis septen-*

me quella degli altri quadrupedi, e perchè molto s'accolta al genere delle donnole, e delle martore. Perciò di queste sei specie pretese, e conservate nel Gabinetto di Seba, non ne rimangono, che quattro, poichè l'*ysquiepatl*, che faceva la quinta, non è un mangia formiche, e perchè non v'è alcuna questione del sesto, se almeno l'Aut. non abbia inteso di comprendere fra quei animali il *pangolino* (a); ma nella descrizione, che fa di questo animale non lo dice. Il pangolino si ciba di formiche, ha il muso lungo, la bocca stretta, e senz'alcun dente visibile, e la lingua rotonda; caratteri tutti, che a lui sono comuni co' mangiatori delle formiche: ma è da essi differente, come da tutti gli altri quadrupedi per un carattere unico, ch'è di avere il corpo coperto di grosse squame in vece di pelo. Inoltre quest'animale appartiene: ai più caldi climi dell'antico continente laddove i mangiatori di formiche, che hanno il corpo coperto di peli, non si trovano che nelle parti meridionali del nuovo Mondo.

N 5

do.

Septentrionalis feræ æmulam, maxilla inferiore crassa & rotunda, brachijs insignibus dentibus armata, cum tamen de sex diversis speciebus sit professus, quod omnes dentibus careant. Klein, de quadrup. pag. 43.

(a) Questo è il nome, che noi daremo alla lucerta squamosa.

do. Non vi restano dunque che quattro specie in cambio di sei, numerate da Seba: e di queste quattro specie non ve n'ha che una sola, che si possa riconoscere dalle sue descrizioni: questa è la terza di quelle, che noi qui descriviamo, cioè a dire quella del *formichiere*, al quale per verità Seba non dà che un solo dito a ciascun piede d'avanti (a), benchè ne abbia due:

(a) Num. 3. *Tamandua*, o sia *Coati d'America* bianco differente. Quest' animale è affatto diverso dal precedente (egli intende quello della Tavola XXXVII. fig. num. 2. Leggasi la Nota seguente). La testa è molto più corta, e le orecchie assai più piccole, gli occhi un poco più grandi, e la parte inferiore del muso è poco più lunga. Le loro lingue si assomigliano molto; ambedue sono lunghe, e strette, e proprie per prendere, ed inghiottire le formiche. Le spalle sono larghe, il corpo corto e grosso, i piedi davanti presentano un dito armato d'un' unghia larga, e curva. Le gambe, e i piedi di dietro sono simili a quei della scimia. Il pelo bianchiccio, e lanoso è più corto di quello del sopradetto animale; dicasi lo stesso della sua coda increspata; quest' animale è stimato uno de' più rari nella sua specie. Gli Etiopi di Surinam li chiamano *Coati*, e raccontano, che quan-

due: ma che, posta anche la mancanza di questo carattere, non può esser altro che il nostro formichiere. I tre altri sono sì malamente descritti, che non è possibile di richiamarli alle loro proprie specie. Io ho creduto di dover qui citare interamente queste descrizioni, non solo per provare quanto ho detto, ma per dare ancora un'idea di questa grossolana opera di Seba, acciò si giudichi quale credenza si debba prestare a quest' Autore. L'animale, che ci disegna col nome di *tamandua murmecophage* di *America* Tom. 1. pag. 60., e di cui dà la figura *tav. XXXVII. num. 2.* non si può riferire ad alcuno dei tre, di cui parliamo; per esserne convinti, basta leggere la descrizione dell' Autore (a). Il secondo, ch'

N 6 egli

quando s'accorgono d'esser presi, piegano il loro corpo in figura rotonda, attaccando sì fortemente i piedi l'uno contro l'altro, che se non si raddrizzano da se stessi, sarebbe impossibile di superare la loro forza. Essi muojono in un momento se vengano attuffati nello spirito di vino, o nel liquore *kilaivel*. Seba, *Vol. 1. pag. 60. 61. tav. XXXVII. fig. num. 3.*

(a) Num. 2. *Tamandua murmecophage* d'*America*. Quest'animale è comunissimo nelle Indie occidentali, ma noi non abbiamo mai veduto, che se ne fossero trasportati dal-

egli indica sotto il nome di *tamanduagura* del Brasile, ovvero di orso, che mangia le

dalle Indie orientali, nè inteso dire, che ve ne si ritrovino. Alcuni dotti si sono fatte delle idee maravigliose di quest' animale; alcuni lo prendono pel leone *formicarius*, altri pel formica leo, alcuni per la formica vulpes, e altri per la formica lupus. Il Sig. Poupert, pag. 235. delle Memorie dell' Accademia reale delle Scienze an. 1704. notò, che quest' animale era grigio, simile ad un ragno, e che parimente tendeva le reti alle formiche. Questa comparazione a noi non sembra molto giusta. Bastamantanus, che ha composto un intero libro sopra i rettili, de' quali si fa menzione nei libri sacri, riguarda il *Murmeca-leo* (nome che gli hanno dato alcune persone) per una specie di scarafaggio, che appellasi scarafaggio cornuto, e che i Tedeschi chiamano *cervo-volante* (tutto ciò come si vede, è molto importante per la descrizione d' un animale quadrupede) ma, continua l' Autore, tutte queste descrizioni, e molte altre non esprimono affatto la natura di quest' animale, di cui noi presentiamo la figura presa dall' originale; quello che poi si vede, è di colore incarnato, coperto d' un pelo molle, come la lana, ha il collo corto, le spalle larghe, la

*le formiche (a) pag. 65. e 66 tav. XL.
fig. n. 1. è indicato in una maniera dub-
bia,*

la testa, e'l muso lungo, e stretto, da cui esce una lunga lingua atra a prendere, ed inghiottire le formiche, che gli servono di nutrimento. La sapienza del Creatore ha dati a questi animali gli organi necessari per provvedersi del nutrimento a lor piacere, e volontà. Le zampe davanti, a guisa di quelle d'un orso, hanno ciascuna, *oltre le dita ordinarie, tre altre dita*; che spuntano sopra le altre, e che sono armate d'un unghia adunca, la quale principalmente è grandissima nel dito di mezzo; e questa è quella, con cui scavano la terra e ne traggono i nidi delle formiche. Le narici vicinissime alla bocca sono strette, ruvide, e fornite di peli, delle quali si servono per odorare, ove si trovi il lor cibo. Le orecchie sono lunghe, e pendenti: i piedi di dietro in questa specie di tamandua, come negli orsi, sono divisi in cinque dita fornite d'unghie lunghe, e adunche, e sono oltre di ciò sostenuti da talloni larghissimi. La lunga coda, e velutata finisce in punta, e si servono di essa come le scimie, per tenersi gagliardamente attaccati agli alberi. La parte propria della generazione nel maschio è notabile; portano i testicoli nascosti sotto la pelle, e in.

bia, ed equivoca; ciò nondimeno io penserei co i Signori Klein (*) e Linneo, che que-

indentro. Le formiche tanto grandi, che piccole divengono la preda di questi animali, che a vicenda servono agli uomini, e principalmente nella medicina. Seba Vol. I. pag. 60. tav. XXXVII. fig. n. 2. Bisogna ben essere cieccamente creduli per istabilire cosa alcuna sopra d'una tale descrizione, e per riferirla al tamanoir, o tamandua guacu, come ha fatto il Sig. Linneo, e di non dare nel medesimo tempo a quest' animale se non tre dita ai piedi davanti, quando che in questa medesima descrizione ve ne sono tre, oltre le dita ordinarie, tre dice che spuntano per di sopra le altre, cosa assurda, e che avrebbe dovuto fare dubitare di tutto il restante.

(a) Num. 2. *Tamandua guacu del Brasile*, o sia l'orso, che mangia le formiche. Questa è la più grande di tutte le specie d'animali, che noi abbiamo veduti. Marcgrave la nomina *tamandua guacu*, e Cardona *ursus formicarius*, cioè l'orso, che mangia le formiche. Quest' animale ha il corpo lungo, le spalle alte, e larghe, la testa molto estesa, il muso che va diminuendosi insensibilmente, e le narici ampie, ed aperte. La lingua, che può metter fuori per una ortava di braccio (la qual cosa è per lui van-

questo potrebbe essere il vero *tamandua-*
guatu, o sia *tamanoir*, ma così mal de-
scrit-

vantaggiosissima per prendere le formiche) finisce in una punta, la cui estremità forma un piccolo rotondo; le orecchie sono lunghe, e *pendenti*, gli occhi assai grandi sono difesi da dense pupille, il muso è lungo, tutto aggrinzato, e coperto da poco pelo; la testa, ch'è piana, e piccola, e coverta di peli molto densi; tutto il restante del corpo di quest'animale è fornito di lunghi peli, e grossi, molto simili alle setole del porco, ma che tuttavia vicino alla pelle diventano più fini anche della bambagia; son eglino d'un colore castagnino chiaro, e sotto il ventre d'un bruno più carico. Il disopra della coda, ch'è lungo, e finisce in punta, è d'un colore fulvo chiaro. La sua femmina quì dipinta ha otto mammelle, ch'escano fuori del ventre; cioè tre per ciascuna parte, e due fra i piedi davanti. Testimoni degni di fede riferiscono, che la femmina in ciascun parto fa tanti figli quante mammelle ha, e in questo si potrebbe rassomigliare alle troje, le quali non partoriscono molti feti in un parto, se non quando hanno molte mammelle. I piedi davanti, e di dietro non sono diversi da quei, che vengon descritti al num. 2. della tavola precedente (ci avrebbe do-

vuto

scritto, e mal rappresentato, che il Sig. Linneo (a) ha uniti sotto una specie sola il primo, e l' secondo di questi animali di Seba, cioè quello della *tav. XXXVII. fig. num. 2* e quello della *tav. XL. fig. num. 1*. Il Sig. Brisson ha stimato quest' ultimo,

vuto dire della tavola XXXVII., perchè la tavola precedente a questa, è la XXXIX., ove non si parla de' mangiatori di formiche) se non che sono più grandi; le formiche più grosse gli servono di nutrimento. Noi conserviamo nel nostro Gabinetto sei specie di questi animali mangiatori di formiche, che sono fra loro diversi, o per una forma particolare, o per la testa, pe' piedi, e per l'unghie. La tamandua rappresentata al n. 2. che segue (Nota. Che qui si parla dell' *ysquiepat*, ch' è più differente dal tamandua di quello che sia un gatto da un cane) è un quarto più piccola di questa, ed ha similmente la testa, le orecchie, e gli occhi più piccoli: il suo piede davanti ha un' unghia sola, forte, e adunca, e quello di dietro ha tre dita, e tre unghie, quando le altre quattro specie hanno cinque dita armate di altrettante unghie. Il loro pelo è morbido come una bambagia, e di colore simile a quello d'una lepre giovane. La quinta specie di tamandua ha la medesima figura; ha il pelo rosso pallido, che sopra il dorso è biancargentino, e di sot-

mo, come una specie particolare, ma io credo, che lo stabilimento di questa specie non

sotto cinerino gialliccio : questa specie ha quattro mammelle, e quattro capezzoli, due sotto le gambe davanti, e due sotto quelle di dietro (questa quinta specie, che ha la medesima figura della precedente, è dunque ancora una specie di *ysquiepatl*, e non già di *tamandua*.) La sesta specie ha il muso più lungo, e le orecchie diritte come quelle della volpe : tutte queste specie non hanno alcun dente. Seba Vol. 1 pag. 65. e 66. Tan. 40. fig. n. 1. Non si fa cosa voglia quì dirsi, l'Autore, nè cosa possa essere questa sesta specie : si vede soltanto, che manifestamente si contraddice, quando riferisce, che tutte queste specie non hanno denti : poichè l'*ysquiepatl*, che vien nominata-mente compreso nelle sei, ha i denti, ed anche in gran numero. Ecco quì più di quello, che fa bisogno per giudicare dell'Opera, e dell'Autore. E' cosa dunque da fare stizza, che la maggior parte di quelli, che formano Gabinetti di Storia Naturale, non sieno abbastanza istruiti, e che per soddisfare alla propria piccola vanità, e far valere la loro raccolta, intraprendono di pubblicarne descrizioni sempre piene di esaggerazioni, e d'errori, che richieggono più tempo per esser riformate, che non fu necessario per iscriverele.

(*) Klein, de quadrup. pag. 45.

(a) Linnæus, Syst. nat. edit. X. pag. 35.

non abbia maggior fondamento, che il rimprovero, che fa al Sig Klein, di averla confusa con quella del tamanoir: sembra solo che il rimprovero, che possa farfi al Sig. Klein sia d' avere aggiunte le cattive indicazioni di Seba alla buona descrizione, che ci dà di quest' animale, la cui pelle ripiena di borra si conserva nel Gabinetto di Dresda. Finalmente il terzo di questi animali, del quale abbiamo la figura nella detta Opera Vol. II. pag. 48. tav. XLVII. *fig. 2.*, è sì mal descritta, che io non mi posso persuadere, malgrado la fede, che ho ai Sig. Linneo, e Brisson, che attenendoci noi alla descrizione, e alla figura dell' Autore, si possa riferire, com' essi han fatto, quest' animale al *tamandua-i*, che io chiamo semplicemente *tamandua*: io domando solamente, che si legga ancora questa descrizione, e se ne dia il giudizio (a). Per dispiacevoli, e noiose, che sieno le discussioni

(a) *Tamandua piccolo d' America*, o il *Mangiatore di formiche* dipinto con un nido di questi insetti: ecco come abbraccia colle unghie dei piedi d' avanti il nido delle formiche, di cui unicamente si ciba. Vedere la sua testa lunga, sottile, stretta, le orecchie corte, il muso a punta, in cui nasconde la sua lingua grande, e sottile, colla quale attrappa le formiche, e le inghiotte.

ni di questa specie, non si possono però evitare ne' dettagli d'una Storia Naturale; avanti di scrivere sopra un soggetto alle volte poco bene conosciuto egli è necessario bandirne, quanto sia possibile, tutte le oscu-rità, e notare di passaggio gli errori, che sempre si trovano in buon numero sul cam-mino della verità, alla quale spesso con somma difficoltà si arriva, non per man- canza della natura, ma per quella de' Na- turalisti.

Ciò che risulta di più certo da questa critica, si è, che realmente esistono tre spe- cie

risce, come noi ci siamo proposti di me- terla sotto l'occhio nelle tavole seguenti (*nulla dimostra in queste tavole.*) la sua testa, le gambe, i piedi, la coda, e le parti anteriori del corpo sono di color gial- lo pallido, le parti posteriori d'un color rosso-bruno: esso porta sul petto a forma di bandoliera una fascia di peli morbidi, come la seta, che verso il mezzo del dor- so si confondono colle altre setole, che di là cominciano a coprirlo: la sua coda è corta, quasi rassa, e ricurva indentro. *Seba, Vol. II. pag. 48. tav. 4^a. fig. n. 2. Nota.* Gli ultimi caratteri di questa descrizione mol- to convergono al *tamandua*, ma generalmen- te parlando, è troppo poco esatta, per poterla asserire.

cie d'animali, a' quali si è dato il nome comune di *mangiatori di formiche*: che queste tre specie sono il *tamanoir*, il *tamandua*, il *formichiere*: che la quarta specie dataci col nome di *formichieri dalle lunghe orecchie* del Sig. Brisson, è incerta, come le altre specie indicate da Seba. Noi abbiamo veduto il *tamanoir*, e 'l *formichiere*, noi ne abbiamo le spoglie nel Gabinetto del Re: quelle specie sono certamente diversissime fra loro, e come le abbiamo descritte, ma noi non abbiamo veduto il *tamandua*, e non ne parliamo, che coll'autorità di Pison, e Marcgrave, che sono i soli autori, che si possano consultare intorno a quest'animale, poichè tutti gli altri non han fatto, che copiare i sopradetti Scrittori.

Il *tamandua* fa, per così dire, la mezza proporzionale fra 'l *tamanoir*, e 'l *formichiere* riguardo alla grandezza del corpo; ha il muso molto lungo, come il *tamanoir*, e quattro dita ai piedi d'avanti, ma poi ha, come il *formichiere*, la coda sforata di pelo nell'estremità, colla quale si sospende ai rami delle piante. Il *formichiere* ha pure la stessa inclinazione: in questa postura essi bilanciano il corpo, accostano il muso ai buchi degli alberi, vi insinuano la lunga lingua, e la ritirano poi bruscamente per inghiottire gl'insetti, ch'essa ha ammassati.

Del

Del resto, questi tre animali, che tanto sono differenti per la grandezza, e per le proporzioni del corpo, hanno tuttavia molte cose comuni, tanto per la forma, quanto per le inclinazioni naturali: tutti e tre si nutrono di formiche, e intingono la lingua nel mele, e nelle altre sostanze liquide, e viscosi, ammassano con molta prontezza le miche del pane, o i piccoli pezzi delle vivande sminuzzate: finalmente si allevano, e si addimesticano facilmente; soffrono per molto tempo la privazione di qualunque nutrimento, non inghiottiscono tutto il liquore, che prendono nel bere, ma ne cade una parte, che passa per le narici: dormono ordinariamente tutta la giornata, e mutano luogo la notte; camminano sì lentamente, che un uomo può facilmente sorprenderli, anche in luogo scoperto. I selvaggi ne mangiano la carne, benchè sia di un pessimo sapore.

Da lontano si prenderebbe il tamanoir per una grossa volpe, e perciò alcuni Viaggiatori l'hanno chiamato *volpe americana*; è bastantemente forte per difendersi da un grosso cane, ed anche da un jaguar; quando ne viene assalito, si rizza subito in piedi, e, a guisa dell'orso, si difende colle mani, le cui unghie sono micidiali; poi si corica sul dorso per servirsi dei piedi, come delle mani, e in questa situazione è quasi invincibile, e combatte ostinatamente
fino

fino agli estremi, ed anche dopo aver ucciso l'inimico, non lo lascia, che moltissimo tempo dopo; resiste più che ogni altro al combattimento, perchè è coperto d'un pelo assai folto, d'una pelle molto dura, e perchè ha la carne poco sensibile, e la vita durissima.

Il tamanoir, il tamandua, e l'formichiere sono animali originarj dei climi più caldi dell'America, cioè a dire del Brasile della Guiana, dei paesi delle Amazoni ec. Non si trovano nel Canada, nè nelle altre regioni fredde del nuovo Mondo; perciò non si devono ritrovare nell'antico continente: tuttavia Kolbe (a) e Desmarchais (b) hanno scritto, che v'erano di questi animali in Africa, ma io son di parere, che abbiano confuso il pangolino, e la lucerta squamosa coi nostri formichieri. Forse Kolbe, e Desmarchais sono caduti in questo errore a cagione di un passo di Marcgrave, ove dice: *Tamandua-gurucu Brasiliensis, Congensibus*, (*ubi & frequens est*) *umbulu dictus*: e infatti se Marcgrave per *Congensibus* intende i Nazionali del Congo, sarà stato il primo a dire, che il tamanoir si trova in Africa, la qual cosa pa-

(a) Vedi la descrizione del Capo di Buona Speranza, di Kolbe. *Tom. III. pag. 43.*

(b) Viaggio di Desmarchais. *Tom. III. p. 307.*

però non è stata confermata da alcun testimonio degno di fede: Marcgrave medesimo non aveva egli certamente veduto quest' animale in Africa, poichè confessa di non averne veduto anche in America altro, che le spoglie. Desmarchais ne parla molto dubiosamente; dice soltanto, che quest' animale trovasi tanto in Africa, quanto in America, ma non aggiugne alcuna circostanza, che possa provare il fatto; e perciò che riguarda Kolbe, noi non facciamo alcun conto della sua testimonianza perchè un uomo, che ha veduto al Capo di buona speranza degli alci, e de' lupi cervieri simili in tutto a quei di Prussia, può avervi anche veduti dei tamandua. Fra gli autori, che hanno scritto delle produzioni dell' Africa, e dell' Asia, niuno ha parlato del tamandua; ed al contrario tutti i Viaggiatori, e quasi tutti gli Storici dell' America ne fanno precisa ricordanza, de Lery, de Laet (a), il P. Abbeville (b), Maffeo (c), Faber, Nieremberg (d), e l' Sig. della

Con-

(a) Description des Indes Occidentales, par Jean de Laet, pag. 485., & 156.

(b) Missioni nell' Isola Maragnon, del P. d' Abbeville. Paris 1614. pag. 248.

(c) Historia dell' Indie di Maffeo tradotta da Pure. Paris 1665, pag. 71.

(d) Euseb. Nieremberg. Hist. nat. Antuerpie 1635. pag. 190. & 191.

Condamine (a) sono d'accordo con Pison, Barrere ec. nel dire, che questi sono animali originarj dei paesi caldi d'America; perlochè noi siamo persuasi, che Desmarchais, e Kolbe si sieno ingannati, e crediamo di poter nuovamente assicurare, che queste tre specie d'animali non si trovano affatto nell'antico continente.

Fine del Decimo Tomo.

605434




(a) Viaggio della riviere delle Amazoni, di M. de la Condamine pag. 167.




LA TIGRE







LA PANTERA MASCHIO




LA PANTERA FEMMINA






LA LONZA




IL LEOPARDO . Cimarelli Incep.








IL JAGUAR




IL CUGUAR

Canavelli Incise






LA LINCE, o LUPO CERVIERO



IL CARACAL

Caracal Luc. 36






Tomo. X.

Tav. VI.




LJENA.



IL ZIBETTO

Simarctis Tigris





LA CIVETTA FEMINA



LA GENETTA



Tomo X.



Tav. VIII.



IL LUPO NERO







L'ONDATRA



IL DESMAN








IL PECARI







Tom. X.

Tav. XI



IL CAN UOLATE




IL CAN UOLANTE DAL COLLO ROSSO





IL PIPISTRELLO STRANIERO



PIPISTRELLI STRANIERI








Tomo. X.

Tav. XIII.




ALTRI PIPISTRELLI STRANIERI





LA POLATUCA DISTESA, *Conarelli inc. sc.* VEDUTA DI DIETRO





Cimicelli Sc.
LA POLATUCA VEDUTA DAVANTI



Tomo. X.




Tav. XVI.



LA POLATUCA




IL PETIT GRIS *Guarcello Inrisc.*





IL PALMISTA



LO SCOIATTOLO BARBARESCO *G. Marcelli Insc.*






Tomo. X.

Tav. XVIII




LO SCIATTOLO SVIZZERO



IL TAMANOIR


Amorelli Inc.





IL FORMICHIERE

Linnaeus, Linn. 30



Esposizione d'Arte

1884

Digitized by Google

